

# MINISTÉRIO DA SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO

CARGO:

**MÉDICO**

Especialidade 6:

**CIRURGIA DE CABEÇA  
E PESCOÇO**

**CADERNO DE PROVAS – PARTE II**  
**Conhecimentos Específicos**

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.**

- 1 Nesta parte II do seu caderno de provas, confira atentamente se os seus dados pessoais e os dados identificadores do seu cargo/especialidade transcritos acima estão corretos e coincidem com o que está registrado em sua folha de respostas. Confira também o seu nome e o nome de seu cargo/especialidade em cada página numerada desta parte de seu caderno de provas. Em seguida, verifique se o seu caderno de provas (partes I e II) contém a quantidade de itens indicada em sua folha de respostas, correspondentes às **provas objetivas**. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência quanto aos seus dados pessoais ou quanto aos dados identificadores do seu cargo/especialidade, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- 2 Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da **folha de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

*A não-violência é a lei suprema.*

**OBSERVAÇÕES:**

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido em edital.
- Informações adicionais: telefone 0(XX)61 3448-0100; Internet — [www.cespe.unb.br](http://www.cespe.unb.br).
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Em relação às traqueostomias e cricoidostomias, julgue os itens a seguir.

- 51** As intubações prolongadas em UTI são as principais indicações de traqueostomias.
- 52** A cricotireoidostomia apresenta mínimo risco de estenose infraglótica em crianças.

Acerca de leucoplasias e líquens orais, julgue os itens a seguir.

- 53** A maioria das leucoplasias bucais é benigna, ocorrendo sua transformação maligna em uma faixa de 1% a 17% ao longo da vida do indivíduo.
- 54** O líquen plano pode apresentar-se em forma de placa, diferenciando-se, em geral, da leucoplasia devido ao fato de esta ser simétrica e de distribuição bilateral.

Acerca dos tumores benignos que ocorrem na cavidade nasal, julgue os seguintes itens.

- 55** O potencial vascular e fibroso do angiofibroma juvenil septal é invariável.
- 56** A maioria dos papilomas invertidos surge da parede lateral da cavidade nasal, sendo comum um envolvimento secundário dos seios maxilar e etmoidal.
- 57** Quando não se resseca o papiloma invertido adequadamente, sua taxa de recidiva é alta, podendo chegar a mais de 40%.

Com relação aos tumores malignos da cavidade nasal, julgue os itens que se seguem.

- 58** O tipo histológico mais comum desses tumores é o adenocarcinoma.
- 59** Paciente com melanoma, diagnosticado e tratado cirurgicamente, não necessita de acompanhamento médico constante, devido à baixa taxa de recorrência dessa doença.

Quanto à fasciíte cervical, julgue os itens subsequentes.

- 60** A etiologia da fasciíte cervical está ligada às infecções dentárias e faríngeas.
- 61** A taxa de mortalidade associada a essa doença pode ser tão alta quanto a taxa de mortalidade associada à mediastinite.
- 62** Os principais agentes infecciosos dessa patologia são bactérias gram-positivas.

Com relação às técnicas cirúrgicas de Caldwell-Luc e de Linch, julgue os itens seguintes.

- 63** A cirurgia de Caldwell-Luc é o acesso ao seio maxilar, via fossa canina, por meio de uma incisão na mucosa do sulco gengivolabial.
- 64** A cirurgia de Linch é o acesso ao seio esfenoidal por meio de uma incisão cutânea entre o canto interno da órbita e a sobrancelha.

Considere que um paciente com 60 anos de idade, com história de dor na face à esquerda, apresente obstrução nasal e dor em região do segundo molar superior ipsilateral, epistaxe esporádica, trismo e epifora constante. Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

- 65** Trata-se de tumor de boca, com grande extensão lateral, que atingiu o masseter.
- 66** É necessário que se realize, imediatamente, uma ressonância nuclear magnética de face, a fim de que sejam localizadas as estruturas adjacentes.
- 67** O lacrimejamento constante pode ser devido à extensão nasal anterior do tumor.
- 68** Nesse caso, a realização de tomografia computadorizada não favorece o estadiamento.

Em relação às neoplasias malignas da boca e dos lábios, julgue os itens que se seguem.

- 69** A maioria dos cânceres de lábio está relacionada à exposição solar, sendo o carcinoma basocelular o tipo histológico mais comum.
- 70** O tipo morfológico exofítico tende a evoluir para metástases tardiamente.
- 71** O câncer de lábio tende a ter uma história lenta: o paciente pode apresentar crostas recorrentes em área leucoplásica por alguns anos, antes de evidência de infiltração.
- 72** Chega a mais de 90% a taxa de cura para T1 e T2 de lábio, sem evidência de pescoço comprometido, quando tratados adequadamente com cirurgia.
- 73** O trígono retromolar é o local mais comum dos tumores malignos da cavidade oral.

As alterações genéticas relacionadas aos carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço incluem a hiperexpressão de oncogenes ou a diminuição da expressão de genes supressores de tumor. Com relação a esse assunto, julgue os próximos itens.

- 74 O aumento da expressão do receptor de fator de crescimento epidérmico (EGFR) está associado ao melhor prognóstico do carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço.
- 75 Alterações em genes supressores como o p16 e TP53 são consideradas eventos iniciais no processo de tumorigênese de cabeça e pescoço.
- 76 O gene *erbB2*, também denominado *neu* ou *Her-2*, com expressão aumentada, é fator de proteção para o desenvolvimento de tumores de cabeça e pescoço.

Considere que um paciente se queixe de dor esporádica na face esquerda, durante os últimos 2 anos, e história antiga de rinopatia; e que, ao exame de tomografia computadorizada de seios paranasais, sejam obtidas imagens sólidas ou, aparentemente, metálicas no interior do seio maxilar esquerdo. Com relação ao diagnóstico desse paciente, julgue os itens que se seguem.

- 77 Trata-se de caso de carcinoma de seio paranasal, provavelmente do tipo espinocefaloide.
- 78 Trata-se de processo infeccioso causado por fungo.

Quanto à otalgia reflexa nos tumores da hipofaringe, julgue os seguintes itens.

- 79 A otalgia reflexa tem relação com ramos sensitivos do nervo glossofaríngeo.
- 80 A otalgia reflexa tem relação com o ramo interno do nervo laríngeo superior, gânglio jugular e nervo auricular.
- 81 A otalgia reflexa tem relação com o ramo do nervo recorrente, gânglio petroso e corda do tímpano.

Com relação à cirurgia craniofacial, julgue os itens a seguir.

- 82 Em casos de cirurgia craniofacial, a radioterapia é contraindicada, devido ao alto risco de necrose óssea.
- 83 A invasão da dura-máter não é contraindicada nesse tipo de cirurgia.
- 84 A fistula líquórica pode ser diagnosticada por meio da dosagem da betatransferrina no líquido suspeito.

Entre as laringectomias parciais, a laringectomia parcial supracricóideia é bastante viável também em situações de resgate. Quanto a esse tipo de laringectomia, julgue os itens que se seguem.

- 85 Para a indicação desse tipo de laringectomia, é condição que as duas aritenóides sejam preservadas.
- 86 São pontos de reparo para a reconstrução a cartilagem cricoideia e o osso hioide.
- 87 A invasão maciça do espaço pré-epiglótico não contraindica esse procedimento cirúrgico.

Em relação ao carcinoma epidermoide e à hipótese de campo de cancerização de Slaughter, julgue os próximos itens.

- 88 Essa hipótese baseia-se na ocorrência de tumores múltiplos, que é mais frequente em áreas expostas ao tabaco.
- 89 Essa hipótese baseia-se na origem clonal e na possibilidade de metástases dos tumores de boca.

Com o maior controle locorregional do carcinoma epidermoide das vias aerodigestivas superiores, o surgimento de múltiplos tumores primários apresenta impacto na sobrevida dos doentes. Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir.

- 90 A pan-endoscopia periódica encontra poucos achados positivos, e seu custo-benefício é questionável.
- 91 Os tumores primários de laringe não estão associados a um segundo tumor primário no pulmão.

O cirurgião de cabeça e pescoço deve conhecer os conceitos básicos de radiobiologia. A respeito desse assunto, julgue os itens seguintes.

- 92 Os raios X são exemplo de onda eletromagnética; o feixe de elétrons é exemplo de radiação corpuscular.
- 93 O efeito da radiação decorre, totalmente, de sua interação direta com o RNA da célula tumoral.
- 94 O princípio dos quatro Rs que fundamenta o fracionamento refere-se ao reparo, redistribuição, repopulação e reoxigenação.

Quanto ao tumor parotídeo de Warthin, julgue os próximos itens.

- 95 É denominado nódulo quente da parótida, devido à sua reconhecida capacidade de captar intensamente o tecnécio.
- 96 Responde por cerca de 10% a 15% dos tumores da parótida, sendo o quarto tipo mais frequente entre as neoplasias benignas das glândulas salivares.
- 97 É bilateral em 10% dos casos, sendo a multifocalidade um achado frequente; é caracteristicamente assintomático, ocorrendo, geralmente, em homens caucasianos e, raramente, em indivíduos da raça negra.

Quanto à embriologia da glândula tireoide, julgue os itens a seguir.

- 98 O lobo piramidal representa resquíio do ducto tireoglosso, o qual, normalmente, desaparece por volta da 10.<sup>a</sup> semana de gestação.
- 99 Em torno da 7.<sup>a</sup> semana de gestação, a tireoide adota sua posição anterior à traqueia, começando a funcionar por volta do terceiro mês, quando são achados os primeiros folículos que contêm coloide.
- 100 A tireoide adota a forma bilobada em torno da 26.<sup>a</sup> semana de gestação, recebendo, em sua constituição, células do tubo intestinal primitivo.