

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal Fundação Universidade de Brasília

RESIDÊNCIA MÉDICA UNIFICADA 2013

CADERNO DE PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno de prova, confira inicialmente se os seus dados pessoais, transcritos acima, estão corretos e coincidem com os que estão registrados em sua folha de respostas da prova objetiva, no seu caderno de textos definitivos da prova discursiva de respostas curtas e em cada página numerada deste caderno. Confira também o nome do programa de residência para o qual você concorre. Em seguida, verifique se ele contém a quantidade de itens indicada em sua folha de respostas da prova objetiva, correspondentes à prova objetiva, e dez questões correspondentes à prova discursiva de respostas curtas, acompanhadas de espaços para rascunho. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência quanto aos seus dados pessoais ou quanto ao nome do programa de residência para o qual você concorre, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- 2 Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da sua folha de respostas da prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

Conforme previsto em edital, o descumprimento dessa instrução implicará a anulação das suas provas e a sua eliminação do processo seletivo.
- 3 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização de fiscal de sala.
- 4 Não serão distribuídas folhas suplementares para rascunho nem para texto definitivo da prova discursiva de respostas curtas.
- 5 Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas —, ao preenchimento da folha de respostas da prova objetiva e à transcrição dos textos para o caderno de textos definitivos da prova discursiva de respostas curtas.
- 6 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas da prova objetiva e o seu caderno de textos definitivos da prova discursiva de respostas curtas e deixe o local de provas.
- 7 Nenhuma folha deste caderno pode ser destacada.
- 8 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na folha de respostas da prova objetiva ou no caderno de textos definitivos da prova discursiva de respostas curtas poderá implicar a anulação das suas provas.

PROCESSO SELETIVO



Universidade de Brasília



OBSERVAÇÕES

Não serão conhecidos recursos em desacordo com o estabelecido em edital. É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

0(XX) 61 3448-0100
www.cespe.unb.br
sac@cespe.unb.br

PROVA OBJETIVA

De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na **folha de respostas** da prova objetiva, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas** da prova objetiva, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.

A psicopatologia, ferramenta fundamental da avaliação psiquiátrica, é uma das ciências básicas da psiquiatria. A respeito das diversas manifestações psicopatológicas, julgue os itens a seguir.

- 1 A catalepsia, fenômeno comum na narcolepsia, caracteriza-se pela perda temporária do tônus muscular, o que causa fraqueza e imobilização.
- 2 Pacientes esquizofrênicos podem apresentar negativismo, fenômeno caracterizado por oposição ou recusa a cooperar, sem razão aparente.
- 3 A palilalia, repetição automática e estereotipada da última ou últimas palavras que o próprio paciente emitiu em sua fala, está associada a quadros demenciais.

No que se refere aos transtornos por uso de substâncias, julgue os itens que se seguem.

- 4 A cafeína é a substância psicoativa mais consumida no mundo e, segundo o DSM-IV-TR, doses acima de 250 mg podem causar intoxicação em pessoas que não costumam fazer uso de bebidas cafeinadas.
- 5 Não existem evidências científicas de que o uso de maconha esteja associado ao aparecimento de sintomas psicóticos em indivíduos sem esquizofrenia.
- 6 Os sintomas da abstinência de cocaína incluem, de acordo com o DSM-IV-TR, humor disfórico, fadiga, sonhos vívidos, insônia ou hipersonia, diminuição do apetite e retardo ou agitação psicomotora.

O *delirium* é uma síndrome complexa associada a declínio funcional e aumento da morbimortalidade. Em relação aos aspectos clínicos, fisiopatológicos e farmacoterapêuticos do *delirium*, julgue os itens seguintes.

- 7 Pacientes com *delirium* apresentam alteração dos níveis de consciência e de atenção, acompanhados de distúrbios cognitivos relacionados à memória, à orientação e à linguagem.
- 8 Entre os diversos mecanismos fisiopatológicos implicados na etiologia do *delirium*, destacam-se o excesso de atividade da acetilcolina e do glutamato, bem como a diminuição da transmissão dopaminérgica.
- 9 O tratamento farmacológico do *delirium* inclui a utilização de antipsicóticos, preferencialmente os de baixa potência e com baixo efeito anticolinérgico, como o haloperidol.

A esquizofrenia, problema de saúde pública de elevado custo pessoal e social, acomete aproximadamente 1% da população. Acerca das características clínicas dessa doença, julgue os itens subsecutivos.

- 10 A esquizofrenia costuma iniciar-se no final da adolescência, com tendência a apresentar um curso desfavorável a longo prazo. São considerados fatores de bom prognóstico ser do sexo masculino, demonstrar ausência de sintomas afetivos, apresentar um início súbito dos sintomas psicóticos, entre outros.
- 11 Familiares de pacientes com esquizofrenia possuem risco aumentado de apresentarem a doença. Estudos recentes demonstram que a agregação familiar dessa doença deve-se, principalmente, a fatores genéticos, sendo que estudos com genes candidatos, tais como DTNBP1 e NRG1, têm sido replicados em diversas populações.
- 12 A mortalidade dos pacientes esquizofrênicos é mais elevada que a da população em geral. As taxas de tentativas de suicídio entre esquizofrênicos variam de 20% a 50%, sendo que até 10% dos pacientes se matam.

Os transtornos de humor são doenças comuns associadas a elevado nível de morbidade e comprometimento funcional. Julgue os próximos itens relativos aos aspectos fisiopatológicos e clínicos do transtorno bipolar e da depressão.

- 13 Os achados de neuroimagem estrutural mais consistentes relacionados ao transtorno bipolar e ao transtorno depressivo maior são as hiperintensidades na substância branca subcortical.
- 14 Estudos recentes encontraram uma associação entre história de trauma na infância e diminuição da atividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal em pacientes com transtorno depressivo maior.
- 15 Pacientes com distímia crônica apresentam menores taxas de resposta aos tratamentos com medicações antidepressivas do que pacientes com transtorno depressivo maior.

Com referência aos transtornos de ansiedade, julgue os itens a seguir.

- 16 A inserção de 5% de CO₂ no ar ambiente é capaz de induzir ataques de pânico, tanto em pacientes com transtorno do pânico, quanto em indivíduos com transtorno de ansiedade generalizada, indicando o papel significativo das disfunções do controle respiratório nessas doenças.
- 17 Existem evidências consistentes de eficácia do uso dos antidepressivos tricíclicos e dos inibidores seletivos da recaptção de serotonina, no tratamento do transtorno do pânico e do transtorno de ansiedade social.
- 18 O componente principal da terapia comportamental do transtorno obsessivo-compulsivo é a exposição e prevenção de resposta, apesar de não apresentar benefício no tratamento das obsessões.

A característica principal dos transtornos somatoformes é a presença de sintomas físicos inexplicáveis. Acerca desses transtornos, julgue os itens que se seguem.

- 19 A maioria dos pacientes com transtorno de somatização apresenta início dos sintomas antes dos vinte e cinco anos de idade, havendo, assim como na hipocondria, uma maior prevalência de pacientes do sexo feminino.
- 20 A comorbidade entre os transtornos somatoformes é comum, sendo que até 40% dos pacientes hipocondríacos são diagnosticados com transtorno de somatização.

O comportamento suicida é frequente em indivíduos com transtornos mentais e está associado a diferentes fatores de risco, dependendo do diagnóstico do paciente. A respeito dos fatores de risco para suicídio, julgue os itens subsequentes.

- 21 Personalidade antissocial e transtornos de ansiedade são fatores de risco para suicídio em pacientes com episódio depressivo maior.
- 22 Tentativas de suicídio prévias constituem, em ambos os sexos, um dos maiores fatores de risco para morte por suicídio.

Os tratamentos somáticos constituem parte importante da terapia dos transtornos mentais. A respeito dos psicofármacos e da eletroconvulsoterapia, julgue os itens consecutivos.

- 23 A conversão de amitriptilina (amina terciária) em nortriptilina (amina secundária) por meio de desmetilação resulta em um composto com maior atividade noradrenérgica.
- 24 O uso da clozapina está associado a reações adversas potencialmente graves, tais como agranulocitose e convulsões.
- 25 A eletroconvulsoterapia é um dos tratamentos mais eficazes da psiquiatria. Entre os fatores associados à menor incidência de efeitos adversos cognitivos destacam-se a aplicação unilateral à direita e o uso de pulsos breves e de estímulo próximo ao limiar convulsivo.

Acerca da esquizofrenia, julgue os itens a seguir.

- 26 Os indivíduos nascidos no inverno e no início da primavera têm mais chance de desenvolver a doença.
- 27 Diversos estudos mostram diferenças na ativação do córtex sensorio-motor entre pacientes com esquizofrenia e sujeitos a controles normais, bem como aumento do fluxo sanguíneo para os lobos occipitais, usando a ressonância nuclear magnética funcional.
- 28 A prevalência da doença entre gêmeos monozigóticos de paciente com esquizofrenia é de cerca de 20%.
- 29 A ausência de fatores precipitantes é um fator de mau prognóstico.

Julgue os itens subsequentes, que versam a respeito da depressão.

- 30 A depressão é, aproximadamente, duas vezes mais prevalente em mulheres do que em homens.
- 31 Não foi encontrada correlação entre o estado socioeconômico do paciente e o transtorno depressivo maior.
- 32 Há uma redução na latência do sono REM em indivíduos deprimidos.
- 33 Pelos critérios atuais do DSM-IV-TR, é necessário um período mínimo de 4 semanas de sintomas para se fazer o diagnóstico.
- 34 A trazodona é um antidepressivo com ação peculiar. Seu uso por um longo período aumenta o número de receptores de serotonina do tipo 2 A (5-HT_{2A}).
- 35 Entre os ISRS, a fluvoxamina apresenta o maior risco de interações medicamentosas.

Um paciente de sessenta anos de idade, do sexo masculino, portador de transtorno bipolar do humor, está em uso de carbonato de lítio, 900 mg/dia, com boa resposta, estando assintomático no momento.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

- 36 Para esse paciente, a litemia deve ser solicitada de dois a seis meses de forma rotineira.
- 37 Se esse paciente passar a usar diclofenaco de sódio, espera-se que os seus níveis séricos do lítio diminuam, caso mantenha a mesma dosagem de 900 mg/dia.
- 38 Se o paciente parar de usar diclofenaco de sódio e começar a utilizar um diurético tiazídico para tratar a hipertensão, espera-se que os seus níveis séricos do lítio diminuam, caso mantenha a mesma dosagem de 900 mg/dia.
- 39 Os efeitos renais mais graves, que são raros e associados à administração continuada por mais de 10 anos do medicamento citado, envolvem o aparecimento de fibrose intersticial não específica.

Com relação aos transtornos de ansiedade, julgue os itens a seguir.

- 40 Mais de 90% dos pacientes com transtorno de pânico tem pelo menos um outro transtorno psiquiátrico.
- 41 A fobia específica é o segundo transtorno mental mais comum entre os homens.
- 42 A amígdala apresenta um papel fundamental na gênese do transtorno obsessivo compulsivo.
- 43 A taxa de resposta ao placebo no transtorno obsessivo compulsivo é comparada à da depressão.
- 44 Os inibidores seletivos de recaptção de serotonina são considerados os tratamentos de primeira linha para o transtorno do estresse pós-traumático.

Acerca das terapias não biológicas na psiquiatria, julgue os itens subsequentes.

- 45 Para a realização da eletroconvulsoterapia, podem-se colocar eletrodos tanto na forma bilateral quanto unilateral. Na forma unilateral, em geral, a resposta é mais rápida.
- 46 Na estimulação magnética transcraniana, utiliza-se bobina em forma de 8 para estimular uma área mais delimitada, e bobina circular para estimular uma área mais ampla.
- 47 Com a estimulação magnética transcraniana, é possível tratar a depressão utilizando alta frequência aplicada no córtex pré-frontal direito ou utilizando baixa frequência no córtex pré-frontal esquerdo.

Julgue os itens a seguir, que versam a respeito de neurociências.

- 48 Por meio da memória operacional, o ser humano armazena temporariamente informações que serão úteis apenas para o raciocínio imediato e para a resolução de problemas, ou para a elaboração de comportamentos, podendo ser descartadas em seguida.
 - 49 O sistema límbico não tem uma localização anatômica tão delimitada como outras partes cerebrais. Ele possui componentes corticais e subcorticais.
 - 50 O córtex frontal, especialmente a área pré-frontal, é um córtex de associação unimodal.
-

PROVA DISCURSIVA DE RESPOSTAS CURTAS

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso queira, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos para as respectivas folhas do **CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA DE RESPOSTAS CURTAS**, nos locais apropriados, pois **não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos**.
- Em cada questão, qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será também desconsiderado o texto que não for escrito no devido local da folha de texto definitivo correspondente.
- No **caderno de textos definitivos**, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois **não será avaliada** a prova que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
- Na avaliação de cada questão, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até **5,00 pontos**, dos quais, até **4,50 pontos** serão atribuídos ao domínio do tema e até **0,50 ponto** será atribuído à capacidade de expressão na modalidade escrita e ao uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa.

Questão	1
---------	----------

O termo bulimia deriva de *bou* (grande quantidade de) ou *boul* (boi) e *limos* (fome), designando fome raivosa ou fome tão grande a ponto de levar alguém a comer um boi. Pacientes com bulimia nervosa apresentam uma síndrome clínica composta por um conjunto de três sintomas fundamentais: um impulso irresistível de comer excessivamente, evitação dos efeitos engordurantes da comida induzindo vômitos e purgação e medo mórbido de engordar.

Maria Angélica Nunes e Cols. **Transtornos alimentares e obesidade**, 2.ª edição, 2006 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando que o sintoma principal da bulimia nervosa e do transtorno de compulsão periódica são os episódios de comer compulsivamente que se repetem ao longo do tempo, associados a comportamentos compensatórios, elabore um texto abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

- conceito de compulsão alimentar; [valor: 3,00 pontos]
- frequência em que essa compulsão deve ocorrer para que se possa diagnosticar a bulimia nervosa, segundo os critérios do DSM-IV-TR. [valor: 1,50 ponto]

Rascunho

1	
2	
3	
4	
5	

Questão 2

Os transtornos primários do sono podem ser divididos em dissonias e parassonias. A respeito das parassonias, elabore um texto apresentando, necessariamente, os seguintes aspectos:

- conceito de parassonia; [valor: 1,50 ponto]
- três exemplos deste transtorno. [valor: 3,00 pontos]

Rascunho

1	
2	
3	
4	
5	

Questão 3

Os transtornos globais do desenvolvimento constituem um grupo de condições biologicamente diferentes, caracterizados por déficits em muitas áreas de funcionamento que levam a uma interrupção invasiva de forma notável, mas difusa, dos processos do desenvolvimento.

Hales e Yudofski. *Tratado de Psiquiatria Clínica*, 4.ª edição, 2006 (com adaptações).

A partir do texto acima, cite as três características essenciais do transtorno autista, de acordo com o DSM-IV-TR. [valor: 4,50 pontos]

Rascunho

1	
2	
3	
4	
5	

Questão 4

Os transtornos de personalidade do agrupamento B do DSM-IV-TR são frequentes na prática clínica psiquiátrica. Cite as opções farmacológicas mais utilizadas para o tratamento do transtorno de personalidade *borderline*, correlacionando-as a cada uma das seguintes dimensões psicopatológicas da doença:

- alterações de humor (depressão e irritabilidade); [valor: 1,50 ponto]
- impulsividade e autodestrutividade; [valor: 1,50 ponto]
- alterações perceptuais intermitentes. [valor: 1,50 ponto]

Rascunho

1	
2	
3	
4	
5	

Questão 5

Os antidepressivos são tratamentos eficazes para o transtorno depressivo maior, com taxa de resposta de aproximadamente 60%. Descreva três estratégias que podem ser utilizadas em casos que não respondam à primeira tentativa de tratamento com a dose inicial de antidepressivo, após um período de quatro a oito semanas. [valor: 4,50 pontos]

Rascunho

1	
2	
3	
4	
5	

Questão 6

Os transtornos mentais na infância são patologias comuns e, por vezes, mal diagnosticadas. Entre as patologias mais comuns está a síndrome de Asperger. Com base nessas informações, descreva a síndrome de Asperger. **[valor: 4,50 pontos]**

Rascunho

1	
2	
3	
4	
5	

Questão 7

O tabagismo é considerado um grave problema de saúde-pública. Em relação a esse tema, atenda ao que se pede a seguir.

- Cite os dois principais tratamentos farmacológicos para o tabagismo. **[valor: 2,00 pontos]**
- Descreva de forma detalhada a forma de atuação desses tratamentos. **[valor: 2,50 pontos]**

Rascunho

1	
2	
3	
4	
5	

Questão 8

Em relação à síndrome de Prader-Willi, redija um texto que aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

- natureza dessa doença; **[valor: 2,25 pontos]**
- características em relação ao desenvolvimento dessa doença. **[valor: 2,25 pontos]**

Rascunho

1	
2	
3	
4	
5	

Questão 9

Em relação à esquizofrenia, que é considerada uma doença crônica e altamente incapacitante, redija um texto citando seis aspectos em relação fatores de bom prognóstico na esquizofrenia. [valor: 4,50 pontos]

Rascunho

1	
2	
3	
4	
5	

Questão 10

Em relação à doença de Pick, redija um texto abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

- sintomas dessa doença; [valor: 2,50 pontos]
- fisiopatologia dessa patologia. [valor: 2,00 pontos]

Rascunho

1	
2	
3	
4	
5	