

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens a seguir, acerca de classificação e processamento de artigos utilizados nos serviços de saúde.

- 41 Classificados como artigos semicríticos, os aparelhos de medir pressão arterial devem ser submetidos à desinfecção de médio nível.
- 42 Para a assepsia de artigos críticos com lúmen interno inferior a cinco milímetros, é suficiente a limpeza manual com uso de produtos químicos e seringas.
- 43 Máscaras para inaloterapia são consideradas artigos semicríticos e não devem ser submetidas à esterilização por imersão química no formaldeído.

Com relação a anatomia e fisiologia muscular, julgue os itens seguintes.

- 44 O músculo bucinador localiza-se na margem orbital medial e atua como esfíncter da órbita fechando as pálpebras.
- 45 O músculo glúteo mínimo tem inserção no trocanter maior do fêmur e origem no íleo, sendo um dos músculos da região glútea utilizados para injeções intramusculares.
- 46 O músculo bíceps femoral localiza-se na parte posterior da coxa e sua ação permite os movimentos de flexão da perna com a articulação do joelho, trazendo o calcanhar para trás em direção à parte posterior da coxa.
- 47 Ao se contrair, o diafragma, um dos músculos mais importantes para a respiração, se eleva, o que permite a entrada de ar na cavidade torácica; esse processo é conhecido como inspiração.

A respeito de agentes infecciosos e parasitários, julgue os itens subsequentes.

- 48 As bactérias que pertencem ao reino *Monera* podem ser espiraladas, arredondadas ou se organizar na forma de cachos, com vários núcleos, a exemplo do *Streptococcus pneumoniae*, causador da pneumonia no homem.
- 49 Os protozoários que parasitam o homem podem habitar diferentes tecidos ou órgãos, como o *Trypanosoma cruzi*, presente no sangue, a *Giardia lamblia*, no intestino, ou as *Trichomonas*, nos genitais e nas vias urinárias.
- 50 A classe *Trematoda*, representada pelo *Schistosoma mansoni*, e a classe *Cestoda*, representada pela *Taenia solium*, ambas do filo platelminto, são importantes parasitos humanos, capazes de causar doenças como a esquistossomose e a cisticercose, respectivamente.
- 51 Os organismos do reino *Fungi* podem causar doenças conhecidas por micoses, infecções muitas vezes crônicas, como, por exemplo, a esporotricose e a candidíase.

Julgue os próximos itens, referentes a biossegurança em saúde.

- 52 Os agentes biológicos que podem causar danos à saúde do ser humano distribuem-se em classes de risco, que vão da classe 1 a 4, de menor risco até a de alto risco individual.
- 53 Os equipos utilizados para a infusão de sangue nos recém-nascidos internados em unidades de neonatologia devem ser trocados a cada 72 horas.
- 54 Medidas de precaução de contato devem ser adotadas pelos profissionais da saúde em casos de recém-nascidos que apresentam infecção por bactérias multirresistentes.

Com relação à histologia dos tecidos, julgue os itens subsequentes.

- 55 As células musculares esqueléticas organizam-se em miofibrilas formadas por miofilamentos e dotadas de estriações transversais unidas por estruturas conhecidas por discos intercalares.
- 56 As fibras musculares cardíacas organizam-se em um complexo arranjo, formando uma rede de células contíguas, o que permite a contração rítmica e vigorosa do coração.
- 57 O cerebelo é formado por uma camada superficial de substância cinzenta: o córtex cerebelar, onde são encontrados os neurônios de Purkinje.

Mulher de trinta e nove anos de idade, hipertensa e diabética, internada na clínica médica de um hospital, recebe a seguinte medicação: insulina NPH 30 unidades pela manhã, enoxaparina 40 mg e solução fisiológica 0,9% intravenosa a 30 mL/h.

Considerando o caso clínico apresentado, julgue os itens seguintes.

- 58 A insulina utilizada é da classe dos hipoglicemiantes e, nesse caso, pode ser administrada pelas vias subcutânea ou intramuscular.
- 59 A enoxaparina é um anti-hipertensivo antagonista do receptor da angiotensina.
- 60 A solução fisiológica utilizada é hipotônica e, se o fator de gotejamento do equipo for de 20 gotas, ela deverá ser infundida a 20 gotas por minuto.

Julgue os seguintes itens acerca da administração de vacinas que constam do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

- 61 A vacina poliomielite 1, 2 e 3 inativada (VIP) é administrada exclusivamente por via oral.
- 62 Gestantes não devem receber vacinação contra HPV.
- 63 É atualmente recomendado que a imunização contra febre amarela seja feita a partir dos nove meses de idade e em dose única.
- 64 Crianças infectadas por HIV que estiverem assintomáticas e sem sinais de imunodepressão não podem receber a vacina BCG.

A respeito da assistência de enfermagem em saúde mental, julgue os seguintes itens.

- 65 Na concepção dos novos serviços de saúde mental, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), o trabalho em saúde mental deve ser fundamentalmente coletivo, ou seja, deve considerar a convivência entre pacientes, familiares e profissionais da área de saúde.
- 66 A reforma psiquiátrica propôs a aproximação entre o paciente com transtorno mental e seu espaço social por meio de estratégias de circulação pelo emprego de um trabalho territorial, caracterizado essencialmente pela preservação prática e teórica da instituição psiquiátrica.
- 67 O trabalho das equipes dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) pode ser influenciado por alterações da política de saúde mental nas instâncias federal, estadual e municipal.
- 68 A reforma psiquiátrica forneceu subsídios para que a enfermagem construísse um modelo definitivo de assistência e cuidados a pacientes com transtornos mentais.

Julgue os próximos itens, relativos aos meios de transmissão das hepatites virais.

- 69** A principal via de contágio do vírus da hepatite C (HCV) é a fecal-oral, de modo que a transmissão ocorre por contato humano ou pela ingestão de água e(ou) alimentos contaminados.
- 70** A transmissão do vírus da hepatite B (HBV) pode ocorrer por via sexual, por isso essa doença é considerada uma infecção sexualmente transmissível (IST).
- 71** A transmissão do vírus da hepatite A (HAV) ocorre majoritariamente por via parenteral, por isso o risco de transmissão é maior entre pessoas que compartilham seringas, agulhas e outros instrumentos para uso de drogas.

Com relação a procedimentos técnicos em enfermagem, julgue os itens subsequentes.

- 72** Entre as medidas de organização e de higiene adotadas no manejo de medicamentos, o técnico de enfermagem deve priorizar a antissepsia de artigos e superfícies por meio do uso de álcool 70%.
- 73** Para realizar o procedimento de punção venosa periférica, deve-se fazer a desinfecção da pele, com uso de álcool 70% ou utilizar gluconato de clorexidina tópico.
- 74** Recomenda-se que um sistema de precauções padrão seja adotado por todos os profissionais de saúde envolvidos na assistência aos pacientes atendidos em instituições de saúde, independentemente da doença inicialmente diagnosticada.
- 75** Para realizar curativo simples com técnica asséptica em ferida operatória, é adequado utilizar solução fisiológica isotônica e oclusão seca nas primeiras 48 horas. Passadas 72 horas, se a ferida estiver seca, pode-se utilizar filme adesivo transparente.

Julgue os itens a seguir, referentes à organização do processo de trabalho em saúde e enfermagem.

- 76** A relação do profissional de enfermagem com o paciente pode despertar conflitos e desgastes, mas, em contrapartida, pode ser vista como fator de motivação na perspectiva de facilitar o acesso dos usuários aos serviços de saúde.
- 77** Os técnicos em enfermagem lidam frequentemente com informações técnicas consideradas dispensáveis para o funcionamento do sistema de saúde.
- 78** O técnico de enfermagem, enquanto agente do processo de trabalho de enfermagem na assistência, pode promover, manter e recuperar a saúde dos pacientes a partir da sistematização da assistência e de procedimentos de enfermagem.

Julgue os seguintes itens, relativos à assistência em enfermagem de pacientes com disfunções musculoesqueléticas.

- 79** Em pacientes submetidos à amputação, a dor cirúrgica pode ser efetivamente controlada com analgésicos opioides, prescrições não farmacêuticas ou evacuação do hematoma ou do líquido acumulado.
- 80** Pacientes que desenvolveram síndrome de embolia gordurosa decorrente de fratura de ossos longos ou da pelve, de múltiplas fraturas ou de lesões por esmagamento apresentam, em geral, manifestações clínicas que incluem hipóxia, taquipneia, taquicardia e febre.

A respeito da assistência de enfermagem a crianças e adolescentes, julgue os itens a seguir.

- 81** A vacina HPV para vacinação de meninos e homens portadores de HIV é indicada na faixa etária de nove anos de idade a vinte e seis anos de idade, com esquema vacinal de três doses.
- 82** O quadro de criança com queimadura por líquido quente cuja distribuição na pele não mostre sinais de ação da gravidade é característico de violência física.
- 83** Conforme a divisão em ciclos de vida adotada pelo Ministério da Saúde, é considerada criança a pessoa de zero a onze anos de vida, e adolescente, a pessoa entre doze anos de idade e dezenove anos de idade.
- 84** A oferta de leite materno e de alimentos complementares cinco vezes ao dia é recomendada a crianças de seis meses de idade a vinte e quatro meses de idade.

Com relação ao climatério, julgue os itens seguintes.

- 85** A menopausa caracteriza o marco do período climatérico.
- 86** Para alívio da queixa clínica de dispareunia, deve-se recomendar o uso de preservativo na relação sexual.
- 87** São consideradas manifestações transitórias do climatério: calafrios, parestesias e menstruações abundantes e com maior período de duração.

Acerca da assistência de enfermagem à mulher no ciclo gravídico, julgue os próximos itens.

- 88** Os sinais característicos de trabalho de parto são: perda de tampão mucoso, sensação dolorosa nas costas e mudança progressiva no ritmo e na intensidade das contrações uterinas.
- 89** Na condição de ingurgitamento mamário, deve-se orientar a puérpera a realizar a ordenha e oferecer o leite materno em copinho para a criança.
- 90** Configuram sinais de violência contra a mulher o início tardio do pré-natal, lesões físicas que não se expliquem como acidentes e parceiro demasiadamente atento e controlador, que reage negativamente se for separado da mulher.
- 91** A gestante que apresentar comprovação de esquema vacinal completo da vacina dT deverá ser dispensada da imunização com a vacina dTpa.
- 92** A gestante deverá ser encaminhada ao serviço de urgência/emergência obstétrica ao apresentar quadro de amniorrexe e pressão arterial acima de 130 mmHg × 90 mmHg associado a edema acentuado dos membros inferiores.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao suporte básico de vida.

- 93** A manobra de ressuscitação cardiopulmonar deve iniciar-se com compressões torácicas em ciclos de trinta compressões para uma insuflação de ar por segundo e com acentuada elevação do tórax da vítima.
- 94** No paciente adulto com suspeita de parada cardíaca, a verificação da frequência cardíaca deve ser feita nos pulsos braquial ou femoral.
- 95** Na ressuscitação cardiopulmonar com o uso de desfibrilador automático, aplica-se uma corrente elétrica no músculo cardíaco, com o objetivo de reorganizar toda a atividade elétrica desse músculo e restabelecer sua contratilidade.
- 96** Na avaliação neurológica simplificada, que tem como objetivo descrever rapidamente o estado de consciência e detectar alterações neurológicas precoces no paciente, deve-se considerar que o paciente está inconsciente se ele não apresentar abertura ocular nem resposta aos estímulos verbal e doloroso.

Acerca da assistência de enfermagem em emergência/urgência e no trauma, julgue os itens que se seguem.

- 97** A conduta mais adequada, em caso de paciente de trauma de extremidade com exposição óssea, consiste na limpeza dos ferimentos com solução salina e oclusão com curativo estéril.
- 98** Queimaduras de terceiro grau são caracterizadas por lesões da epiderme e presença de eritemas e bolhas.
- 99** A compressão digital e a aplicação de compressa gelada no dorso nasal são medidas de controle da epistaxe.
- 100** Urgência hipertensiva é aumento da pressão arterial sistólica igual a 120 mmHg ou acima disso, sem sintomas de descompensação da função de órgãos vitais.

Acerca das doenças de interesse da saúde pública, julgue os itens a seguir.

- 101** O eletrocardiograma e a radiografia de tórax de um portador de infecção por *Trypanosoma cruzi* podem apresentar resultados normais.
- 102** O anti-helmíntico praziquantel é o medicamento mais indicado no tratamento da difteria.
- 103** A vacina BCG oferece alguma proteção contra a hanseníase.
- 104** A vacina contra HPV é contraindicada para jovens portadores de HIV/AIDS.

Acerca do Sistema Único de Saúde (SUS) e da legislação que o rege, julgue os itens que se seguem.

- 105** O transporte e a educação são alguns dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- 106** Os três níveis de atenção à saúde são corresponsáveis pela coordenação do cuidado em todos os espaços que oferecem serviços de saúde.
- 107** A equipe médica deve informar aos familiares e aos acompanhantes sobre o estado de saúde do paciente nos casos em que ele for acometido por doenças transmissíveis.
- 108** Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas.

Com relação à ética e à legislação em enfermagem, julgue os seguintes itens.

- 109** É direito do profissional de enfermagem obter, por meio do Ministério da Saúde, desagravo público por ofensa que atinja a profissão.
- 110** O aprimoramento de conhecimentos técnicos que sustentem a prática profissional constitui tanto direito como dever do profissional de enfermagem.
- 111** A responsabilidade do técnico de enfermagem de conhecer a ação da droga antes de ela ser administrada a um paciente é facultativa.
- 112** Compete ao Conselho Federal de Enfermagem a imposição da penalidade de suspensão do exercício profissional por violação do código de ética profissional.

Julgue os próximos itens à luz das normas e dos preceitos sobre segurança e saúde para trabalhadores dos serviços de saúde.

- 113** Os agentes biológicos de classe de risco 4 podem causar doenças ao ser humano por não existirem vacinas eficazes contra eles.
- 114** É obrigatório o uso de carro funcional para transporte dos materiais e produtos destinados à limpeza de locais onde se prestem serviços de saúde.
- 115** Locais que prestem serviços de saúde e só possuam centro de material e esterilização de tipo I podem ter lavanderias com máquinas de lavar de porta única.
- 116** Infecções de recém-nascidos associadas a bolsa rota superior a vinte e quatro horas são consideradas comunitárias.

Com relação à Política Nacional de Humanização (PNH) no cuidado do paciente/cliente, julgue os itens subsequentes.

- 117** A aderência de um hospital ao nível A de padrão de adesão à PNH pressupõe a existência de uma ouvidoria em funcionamento.
- 118** Um dos princípios norteadores da PNH é a conciliação da dimensão científica com a dimensão religiosa no âmbito do SUS.
- 119** A PNH prevê prioritariamente que o SUS trabalhe para reduzir as filas e o tempo de espera dos usuários.
- 120** Entre as orientações estratégicas para a implementação da PNH inclui-se a oferta de financiamento de projetos que busquem melhorar a experiência do usuário no espaço físico das unidades de saúde, como, por exemplo, a introdução de salas de conversa e espaços de conforto.

Espaço livre