

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Uma boa higiene oral diminui o risco de desenvolvimento de problemas bucais e dentários. O fumo, o consumo de álcool e a má alimentação têm relação direta com doenças da boca. Estudos científicos também comprovam que a saúde bucal tem relação com a saúde geral, pois a boca interage com todas as estruturas do corpo. As más condições de higiene da boca podem causar doenças bucais, que, por sua vez, podem acarretar ou agravar doenças cardiovasculares e diabetes.

Portal Brasil. Internet: <www.brasil.gov.br> (com adaptações).

Considerando-se o texto apresentado e informações estatísticas acerca das condições da saúde oral no Brasil, o principal problema bucal observado no país é

- A a fissura labiopalatal, distúrbio do desenvolvimento orofacial que pode dar origem a problemas funcionais.
- B a má oclusão dentária, que pode se apresentar sob a forma de mordida cruzada ou de sobremordida, entre outras.
- C o câncer bucal, enfermidade que afeta, de forma preponderante, adultos com mais de quarenta anos de idade.
- D a doença periodontal, cujas manifestações mais graves ocorrem, predominantemente, em pessoas adultas.
- E a cárie dentária, que atinge aproximadamente metade das crianças brasileiras de doze anos de idade.

QUESTÃO 22

Como principal estratégia de planejamento para a melhoria das condições de saúde bucal no Brasil, o Ministério da Saúde mantém, desde 2003, o Programa

- A Brasil Carinhoso.
- B Brasil Sorridente.
- C Saúde da Família.
- D Saúde Bucal para Idosos.
- E Mais Médicos.

QUESTÃO 23

O governo federal busca desenvolver, desde a Constituição Federal de 1988, um modelo de atenção à saúde baseado nos princípios da universalidade, da equidade e da integralidade, que começou a ser implementado com a regulamentação do

- A Sistema Único de Saúde (SUS).
- B Programa Saúde da Família.
- C Programa Pacto pela Saúde.
- D Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).
- E Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS).

QUESTÃO 24

Com a finalidade de estudar os fatores que determinam a distribuição, a frequência e a propagação das doenças que afetam a boca, a epidemiologia bucal baseia-se em índices, como o CPO-D, que é utilizado na avaliação

- A da quantidade de cáries observadas em dentição decídua.
- B da higiene oral e de problemas periodontais em adultos.
- C da incidência de casos de câncer bucal em fumantes.
- D da ocorrência de dentes cariados, perdidos ou obturados em um indivíduo.
- E do grau de corrosão em dentes cariados em pessoas idosas.

QUESTÃO 25

De acordo com a legislação que dispõe sobre a atuação de trabalhadores de saúde bucal na atenção básica por meio do Programa Saúde da Família, é de competência do auxiliar de consultório odontológico

- A realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal, entre eles, cirurgias ambulatoriais de baixo risco.
- B atuar em ações de promoção e prevenção em saúde bucal para famílias, grupos e indivíduos.
- C realizar diagnóstico a fim de obter o perfil epidemiológico para planejar ações de promoção da saúde bucal.
- D conduzir o tratamento de afecções bucais, mesmo quando for necessário encaminhar o usuário a outros níveis de assistência.
- E coordenar ações coletivas voltadas à promoção da saúde e ao tratamento de doenças bucais de baixa gravidade.

QUESTÃO 26

Conforme a classificação de Black, assinale a opção correta.

- A Classe I – cavidade preparada nas faces proximais de pré-molares e molares.
- B Classe II – cavidade preparada em região de má coalescência de esmalte, cicatrículas e fissuras.
- C Classe III – cavidade preparada no terço gengival, não de cicatrículas, das faces vestibular e lingual de todos os dentes.
- D Classe IV – cavidade preparada nas faces proximais dos incisivos e caninos, com remoção e restauração do ângulo incisal.
- E Classe V – cavidade preparada nas faces proximais dos incisivos e caninos, sem remoção do ângulo incisal.

QUESTÃO 27

Com relação aos princípios básicos de cirurgia bucal, assinale a opção correta.

- A Após a remoção de um dente, o auxiliar deve fazer a aspiração rigorosa do alvéolo dentário, mantendo-o seco até o final da cirurgia.
- B O soro fisiológico utilizado em cirurgias deve estar aquecido à temperatura de 37 °C, para não causar choque térmico no paciente.
- C O campo fenestrado disposto sobre o paciente durante uma cirurgia tem como finalidade principal não contaminar sua roupa.
- D Após sua utilização, devem-se descartar agulhas de uso único em recipientes rígidos e dotados de tampa, postos posteriormente no lixo.
- E O fórceps n.º 18 L é o instrumento adequado para a exodontia do terceiro molar superior direito.

QUESTÃO 28

Acerca dos princípios de odontopediatria, assinale a opção correta.

- A** Caso seja necessária a realização de exames radiológicos em crianças, a tomografia é preferível à radiografia, devido à menor quantidade de radiação emitida.
- B** A dentição decídua é composta de oito incisivos, quatro caninos e oito pré-molares, totalizando vinte dentes.
- C** Os procedimentos de ortodontia preventiva podem ser iniciados em crianças ainda com dentição decídua.
- D** A quantidade de anestesia administrada a uma criança deve ser maior que a aplicada em um adulto, devido à velocidade do metabolismo fisiológico infantil.
- E** Dentes decíduos que tenham sofrido avulsão por traumatismo devem ser reimplantados o mais rapidamente possível.

QUESTÃO 29

A respeito dos tratamentos endodôntico e periodontal, assinale a opção correta.

- A** Devem-se evitar instrumentos ultrassônicos na raspagem da região supragengival.
- B** Para evitar gengivites, recomenda-se que as grávidas realizem bochechos frequentes com clorexidina a 0,12%.
- C** O uso de instrumentação endodôntica rotatória deve ser evitada, pois aumenta o tempo necessário ao tratamento.
- D** O sangramento gengival espontâneo é um sinal comum em periodontites agudas.
- E** As limas endodônticas possuem padronização de cor e, por convenção, as limas escuras são as de menor calibre.

QUESTÃO 30

Em um consultório odontológico, cabe ao auxiliar de saúde bucal

- A** efetuar a manutenção de instrumentos e equipamentos de uso odontológico.
- B** efetuar o balanço contábil do consultório.
- C** emitir, carimbar e assinar atestados de comparecimento.
- D** contratar os profissionais odontólogos de uma clínica.
- E** emitir notas fiscais do consultório.

QUESTÃO 31

As ações coletivas em saúde bucal

- A** visam à ionização da água para a prevenção da cárie, de acordo com as ações adotadas nas políticas públicas.
- B** podem ser realizadas em escolas, para que se promovam atividades que estimulem a reflexão acerca da higiene oral.
- C** consistem em atividades que visam à recuperação da saúde bucal, por meio do uso exclusivo de produtos não fluoretados.
- D** devem promover a realização de procedimentos curativos, como a remoção de todos os elementos dentais cariados.
- E** devem ser desenvolvidas exclusivamente pela sociedade civil e articuladas com instituições empresariais.

QUESTÃO 32

Voltadas à prevenção da cárie e da gengivite, as atividades de higiene bucal supervisionada, realizadas em serviços de saúde, têm como objetivo promover o aprendizado dos procedimentos necessários à manutenção da saúde bucal, entre eles, a escovação adequada das superfícies dentais oclusais, que deve ser executada

- A** até induzir o sangramento das papilas e estimular a cicatrização do tecido gengival.
- B** comprimindo-se fortemente as gengivas interdentais.
- C** por meio de movimentos suaves de vai e vem.
- D** pressionando-se as cerdas da escova dental da ponta dos dentes até a gengiva.
- E** com movimentos circulares, pressionando-se fortemente a escova.

QUESTÃO 33

A remoção da placa dental é essencial para a prevenção da cárie e da doença periodontal. Considerando-se essa informação, é correto afirmar que a placa dental

- A** subgengival depositada sobre os dentes por cerca de vinte e quatro horas constitui cálculo ou tártaro.
- B** supragengival é formada por restos alimentares depositados sobre a gengiva e a língua.
- C** pode se formar sobre dentes humanos mesmo na ausência de ingestão oral de alimentos.
- D** é visível desde o período inicial de formação, podendo ser identificada duas horas após a limpeza.
- E** pode ser inibida a partir de uma dieta consistente e fibrosa, que exige mastigação mais vigorosa.

QUESTÃO 34

A fim de desestruturar os microrganismos aderidos, o controle mecânico individual do biofilme dental deve ser realizado por meio de escovações, do uso do fio dental e de outros agentes de limpeza interproximal. Para que a remoção de biofilme seja realizada sem trauma no esmalte, na língua e no tecido gengival, recomenda-se que sejam utilizadas escovas dentais

- A** com cerdas macias ou de maciez média, achatadas e organizadas em múltiplos tufos.
- B** de cerdas macias que estão contraindicadas para higienização do ventre da língua.
- C** interproximais, que substituem o fio dental na limpeza dos espaços interdentais muito estreitos.
- D** manuais, as quais apresentam eficácia comprovadamente maior que a das escovas elétricas.
- E** com cerdas duras e de extremidades retas, que promovem remoção mais completa e segura.

QUESTÃO 35

Doenças periodontais podem ser evitadas por meio de ações preventivas, entre elas,

- A** aplicação de selantes de fôssulas e fissuras.
- B** bochechos com solução de clorexidina a 0,12%.
- C** raspagem cirúrgica das bolsas periodontais.
- D** aplicação tópica de flúor.
- E** extrações seriadas.

QUESTÃO 36

A respeito da doença periodontal e dos múltiplos aspectos a ela relacionados, julgue os itens a seguir.

- I A doença periodontal é uma enfermidade que acomete os tecidos de sustentação dental.
- II A periodontite avançada pode ser paralisada e curada por meio de raspagem e alisamento radicular.
- III As lesões de furca são caracterizadas pela perda óssea na região interproximal dos dentes anteriores.
- IV A gengivite é evidenciada quando uma ou várias unidades gengivais em volta de um dente sangram em resposta à sondagem.
- V A periodontite juvenil é um distúrbio periodontal que afeta a dentição decídua.

Estão certos apenas os itens

- A I, II e III.
- B I, II e IV.
- C I, III e V.
- D II, IV e V.
- E III, IV e V.

QUESTÃO 37

Para avaliar a profundidade da bolsa periodontal, deve-se usar

- A cureta Gracey 7/8.
- B sonda milimetrada.
- C periótomo.
- D Hollenback.
- E sonda exploradora.

QUESTÃO 38

Como método de prevenção contra o surgimento de cárie em sulcos e fissuras, realiza-se

- A aplicação de verniz cavitário.
- B aplicação de selante.
- C restauração oclusal em resina.
- D restauração oclusal em amálgama.
- E aplicação de faceta em porcelana.

QUESTÃO 39

O instrumento periodontal indicado para realizar a raspagem e o alisamento radicular dos dentes anteriores é denominado

- A cureta Gracey 7/8.
- B cinzel.
- C sonda exploradora.
- D cureta McCall 17/18.
- E cureta Gracey 5/6.

QUESTÃO 40

Os bochechos com solução de flúor são indicados para indivíduos com alta prevalência de cárie, sendo utilizados também como medida preventiva em ações coletivas em saúde bucal. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, a concentração de solução de fluoreto de sódio utilizado em bochechos fluoretados, a periodicidade com que estes devem ser realizados e a duração recomendada de cada bochecho.

- A 0,05% – diariamente – 1 minuto
- B 0,05% – semanalmente – 5 minutos
- C 0,5% – diariamente – 1 minuto
- D 0,5% – semanalmente – 5 minutos
- E 0,05% – mensalmente – 1 minuto

QUESTÃO 41

Utilizada na limpeza e desoxidação de objetos e componentes, a cuba ultrassônica é preenchida com água até o nível indicado para que os materiais possam permanecer imersos por um tempo determinado. Com relação ao funcionamento da cuba ultrassônica na limpeza completa de instrumentais, julgue os itens a seguir.

- I São geradas, por vibrações em alta frequência, microbolhas, que se chocam e se rompem.
- II O resfriamento constante do líquido regula a liberação de energia pelo processo de cavitação.
- III O fenômeno da cavitação é associado à ação do calor e do detergente enzimático.
- IV O enxágue por *spray* e a drenagem por sucção automática são controlados e programados.
- V Jatos microscópicos de alta energia auxiliam na quebra das ligações entre a sujidade e o instrumento.

Estão certos apenas os itens

- A I, II e IV.
- B I, III e IV.
- C I, III e V.
- D II, III e IV.
- E II, IV e V.

QUESTÃO 42

Alguns materiais utilizados na odontologia têm a propriedade de acumular energia, quando submetidos a estímulos estressores, sem sofrer ruptura. Parte desses materiais sofre, durante esse processo, deformação elástica, retornando, após a interrupção do estímulo, à forma original, devido à

- A resistência.
- B fadiga.
- C deformação.
- D resiliência.
- E difusidade.

QUESTÃO 43

As resinas compostas utilizadas para restaurar elementos dentários sofrem uma reação quando expostas à luz na região azul do espectro, provocando a interação da sua molécula fotossensível com a amina iniciadora. Esse processo é denominado

- A reação de fotopolimerização.
- B energia de ativação.
- C tomada de presa.
- D reação de contração.
- E contração de polimerização.

QUESTÃO 44

A esterilização, por processo físico, de instrumentos metálicos contaminados pela deposição de aerossóis constituídos por sangue, saliva, tecidos e fluidos orgânicos, entre outros, deve ser realizada por meio de

- A calor por convexão mecânica por trinta minutos.
- B calor seco por quarenta minutos.
- C calor úmido pressurizado por sessenta minutos.
- D alto vácuo por vinte minutos.
- E vapor saturado sob pressão por trinta minutos.

QUESTÃO 45

Para que o trabalho do cirurgião-dentista se desenvolva com mais qualidade e produtividade, preservando também a saúde do profissional, foram concebidas diversas estratégias, como o sistema quatro mãos, baseado na atuação coordenada entre dentistas e auxiliares, e as ações de ergonomia odontológica. Entre os objetivos da ergonomia odontológica aplicada ao trabalho realizado em equipe inclui-se a

- A orientação à equipe acerca dos procedimentos para o aumento da produtividade durante intervenções.
- B prescrição de exercícios a serem realizados pela equipe no horário de lazer, com o objetivo de melhorar seu preparo físico.
- C organização de um ambiente clínico esteticamente agradável, por meio de mudanças na decoração do espaço.
- D reformulação do ambiente clínico a fim de propiciar mais conforto ao paciente durante o atendimento.
- E realização, por parte dos profissionais, de exercícios para prevenir a fadiga visual, física e psíquica durante o trabalho.

QUESTÃO 46

O instrumento odontológico utilizado para preencher cavidades dentárias com material curativo ou restaurador é denominado

- A brunidor.
- B calcador espatulado.
- C escavador dentinário.
- D espátula flexível.
- E cureta.

QUESTÃO 47

A detecção de falhas no equipamento de esterilização relacionadas à penetração do calor em estufas ou em autoclaves e a identificação dos pacotes esterilizados, podem ser realizadas com o emprego de

- A fita termocrômica interna ou externa.
- B indicador biológico.
- C indicador termo-mecânico.
- D integrador de qualificação térmica.
- E dosimetria de radiação.

QUESTÃO 48

A manutenção preventiva evita a depreciação precoce dos equipamentos e contribui na redução de gastos com visitas técnicas desnecessárias. Um dos procedimentos preventivos que podem ser realizados de modo rotineiro pelo auxiliar de consultório é a

- A verificação do sistema de colimação do aparelho de raios X odontológico.
- B drenagem da água residual do reservatório de ar do filtro no compressor de ar.
- C lubrificação a óleo do motor da cadeira odontológica.
- D inspeção periódica da lâmpada com um radiômetro.
- E aferição da pressão da câmara interna e ajuste da resistência da autoclave.

QUESTÃO 49

Os hidrocoloides irreversíveis são materiais que tomam presa de um estado fluido para um estado sólido. Esse tipo de material, muito utilizado na área de prótese, é comumente conhecido como

- A alginato.
- B silicone.
- C godiva.
- D resina.
- E gesso odontológico.

QUESTÃO 50

Sabendo-se que há embalagens próprias para cada um dos processos de esterilização empregados na odontologia, é correto afirmar que o instrumental a ser esterilizado em autoclave deve ser embalado em

- A papel de polipropileno.
- B caixa metálica com tampa.
- C bandeja metálica envolta em papel alumínio.
- D papel tipo Kraft.
- E papel crepado.

QUESTÃO 51

Com relação aos preceitos do Código de Ética Odontológica e do Código de Processo Ético Odontológico, julgue os itens a seguir.

- I É direito do técnico em saúde bucal e do auxiliar em saúde bucal recusar-se a exercer a profissão em condições de trabalho que não sejam dignas, seguras e salubres.
- II Constitui quebra de sigilo profissional comunicar ao Conselho Regional e(ou) às autoridades sanitárias condições de trabalho indignas, inseguras e insalubres.
- III Não constitui infração ética delegar a técnicos ou a auxiliares a realização de procedimentos exclusivos do cirurgião-dentista desde que não sejam complexos.
- IV É permitido ao técnico em saúde bucal remover suturas de pacientes odontológicos, desde que sob a supervisão do cirurgião-dentista.

Estão certos apenas os itens

- A I, II e III.
- B I, II e IV.
- C I e IV.
- D II e III.
- E III e IV.

QUESTÃO 52

No que se refere aos aspectos anatômicos da face, assinale a opção correta.

- A A divisão mandibular do nervo trigêmeo produz a inervação sensitiva dos dentes, mas não do periodonto.
- B A estrutura óssea na região dos dentes maxilares é mais comumente do tipo cortical.
- C Lesões no nervo trigêmeo levam à perda do movimento ocular, sem causar danos sensoriais aos olhos.
- D A maxila, estrutura formada pelos maxilares direito e esquerdo, é o segundo maior osso da face.
- E A maxila é a estrutura óssea mais forte da face, seguida da mandíbula.

QUESTÃO 53

Alterações na textura da superfície da língua caracterizadas pela presença de sulco central ao longo da linha média da superfície dorsal, a partir do qual surgem sulcos menores, são manifestações anatômicas presentes na

- A língua fissurada.
- B língua geográfica.
- C papilite lingual transitória.
- D anquiloglossia.
- E língua pilosa.

QUESTÃO 54

Entre as manifestações clínicas bucais que ocorrem em pessoas infectadas com o vírus da imunodeficiência humana (HIV), as mais frequentes são

- A o herpes simples e o condiloma acuminado.
- B a leucoplasia pilosa e o linfoma não-Hodgkin.
- C o herpes simples e a verruga vulgar.
- D a leucoplasia pilosa e o condiloma acuminado.
- E o linfoma não-Hodgkin e a verruga vulgar.

QUESTÃO 55

Com relação ao fungo *Candida albicans* e às manifestações clínicas associadas a infecções por ele causadas, assinale a opção correta.

- A A *Candida albicans* se fixa nas células epiteliais humanas na forma de pseudo-hifas, mas invade os tecidos mais profundos na forma de leveduras.
- B A candidose pseudomembranosa manifesta-se na forma de placas multifocais esbranquiçadas insuscetíveis de remoção por meio de raspagem.
- C Embora cresça também nas membranas mucosas dos tratos intestinal e genitourinário, o fungo *Candida albicans* causa danos somente à cavidade bucal.
- D A imunossupressão torna a pele dos indivíduos mais propensa a infecções por *Candida*, sem afetar a suscetibilidade das membranas mucosas a essas infecções.
- E Com prevalência variando de 3% a 48% em adultos saudáveis, a *Candida albicans* é a espécie de fungo mais comum tanto em pacientes infectados como em portadores saudáveis.

QUESTÃO 56

Considerando-se que há uma ampla distribuição de herpes-vírus na natureza e que são patogênicas para seres humanos oito espécies desses vírus, cujas manifestações clínicas variam de modo significativo, é correto afirmar que o herpes-vírus

- A simples tipo 2 está relacionado a infecções na genitália e é transmitido por contato sexual, não causando, por esse motivo, lesão na mucosa bucal.
- B causa, não importando a espécie do vírus, infecções graves e não autolimitadas, que, por isso, requerem a administração de antivirais sistêmicos.
- C simples tipo 1 é disseminado principalmente por saliva infectada ou por lesões orais e que o portador desse tipo de vírus se torna imune após a infecção primária.
- D simples tipo 1 provoca infecção primária normalmente em crianças e adolescentes, causando a estomatite ulcerativa primária, que afeta a mucosa oral e a região perioral.
- E varicela zoster causa, em fase primária, uma infecção denominada varicela ou catapora, podendo ser reativado e provocar, em fase secundária, a herpes zoster.

QUESTÃO 57

Quanto à profilaxia antimicrobiana para endocardite bacteriana, é correto

- A não prescrever antibiótico a portadores de prótese cardíaca com história prévia de endocardite bacteriana, pois esses pacientes não requerem profilaxia.
- B não prescrever antibiótico a pacientes com condições cardíacas de alto risco à endocardite bacteriana, em procedimentos que envolvam a manipulação do tecido gengival.
- C prescrever antibiótico a pacientes com cardiopatia congênita cianótica corrigida que evolui com lesão residual, mas dispensar seu uso no caso de cardiopatia congênita corrigida com material protético.
- D prescrever clindamicina, na dosagem de 600 mg, para adultos, e de 20 mg/kg, para crianças, quando o paciente que requerer profilaxia for alérgico à penicilina.
- E prescrever amoxicilina, na dosagem de 1 g, para adultos, e de 50 mg/kg, para crianças, sempre que houver indicação de profilaxia e não houver restrições ao uso dessa substância.

QUESTÃO 58

Considerando a importância do odor bucal sobre a saúde física, social e emocional do indivíduo, o conhecimento dos fatores associados ao desenvolvimento da halitose é fundamental para seu diagnóstico e monitoramento terapêutico. Assinale a opção que apresenta o principal fator da causa da halitose.

- A saburra lingual
- B cárie dentária
- C sinusite crônica
- D periodontite
- E alterações do trato gastrointestinal

Espaço livre

QUESTÃO 59

Considerando-se as medidas de suporte básico de vida nos casos de obstrução de vias aéreas por corpos estranhos, a manobra de Heimlich deve ser executada

- A** por meio de compressões sobre o esterno (linha intermamilar), em caso de paciente obeso ou de gestante no terceiro semestre de gravidez.
- B** se o paciente for capaz de tossir e de respirar, mas houver obstrução leve em suas vias aéreas.
- C** por dois socorristas, um dos quais deve se posicionar diante do paciente, para ajudá-lo na expulsão do corpo estranho.
- D** no caso de obstrução grave das vias aéreas em paciente inconsciente, mesmo que este seja capaz de respirar.
- E** em paciente posicionado em decúbito dorsal sobre uma superfície rígida, preferencialmente no solo.

QUESTÃO 60

No que se refere aos aspectos fisiológicos da saliva, bem como às alterações relacionadas à produção dela, julgue os itens a seguir.

- I A glândula parótida é a principal responsável pela secreção de saliva.
- II Denomina-se xerostomia a sensação de secura na boca.
- III O termo assialia refere-se à ausência de secreção de saliva.
- IV A produção diária normal de saliva varia entre 500 mL e 600 mL.

Estão certos apenas os itens

- A** I e II.
- B** I, II e III.
- C** I e IV.
- D** II, III e IV.
- E** III e IV.