



Aracaju

Prefeitura da Cidade

Uma cidade para todos



CONCURSO PÚBLICO

Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Saúde

NÍVEL SUPERIOR

**CADERNO
DE PROVAS**

Médico – Emergencista Cirurgião-Geral

**Aplicação:
18/1/2004
MANHÃ**

Cargo 31

CESPE
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Criando Oportunidades para Realizar Sonhos

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno, confira se ele contém **cento e vinte** itens, correspondentes às provas objetivas, corretamente ordenados de 1 a 120.
- 2 Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Recomenda-se não marcar ao acaso: a cada item cuja resposta marcada diverja do gabarito oficial definitivo, além de não marcar ponto, o candidato perde **um** ponto, conforme consta no Edital n.º 1/2003, de 17/11/2003.
- 4 Não utilize nenhum material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE.
- 5 Durante as provas, não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 6 A duração das provas é de **três horas**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 7 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de provas.
- 8 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno, na folha de rascunho ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das suas provas.

AGENDA

- I **19/1/2004** – Divulgação, a partir das 10 h (horário de Brasília), dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, na Internet — no sítio <http://www.cespe.unb.br> — e nos quadros de avisos do CESPE/UnB — em Brasília.
- II **20 e 21/1/2004** – Recebimento de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, exclusivamente nos locais e no horário que serão informados na divulgação dos referidos gabaritos.
- III **11/2/2004** – Data provável da divulgação (após a apreciação de eventuais recursos), nos locais mencionados no item I e no Diário Oficial do Município de Aracaju, do resultado final das provas objetivas e do concurso.

OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido no item 10 do Edital n.º 1/2003, de 17/11/2003.
- Informações relativas ao concurso poderão ser obtidas pelo telefone 0(XX) 61 448 0100.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item **CERTO**; o campo designado com o código E, caso julgue o item **ERRADO**; ou o campo designado com o código SR, caso desconheça a resposta correta. Marque, obrigatoriamente, para cada item, um, e somente um, dos três campos da **folha de respostas**, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. A marcação do campo designado com o código SR não implicará anulação. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a **folha de respostas**, que é o único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Os novos horizontes da ciência

1 **N**o clássico **Teogonia**, escrito 700 anos antes do
nascimento de Cristo, o poeta grego Hesíodo conta a
4 seguinte história: Eos, a deusa da alvorada, pede que
Zeus conceda a vida eterna a Títon, príncipe de Tróia
e seu grande amor. Seu desejo é atendido. Ela não se lembra,
porém, de pedir que ele também permaneça jovem para
7 sempre. O tempo passa. Carcomido pela velhice, sem
conseguir mais mexer as mãos e os pés, Títon quer morrer.
Clama por isso. Mas se tornou imortal, está acorrentado à
10 velhice. Quando entra em total estado de decrepitude, Eos,
compadecida, o transforma em gafanhoto, o mais musical dos
insetos, para ouvir eternamente a voz de seu amado.

13 O mito transmitido por Hesíodo construiu-se a partir
de duas dificuldades que, aos povos antigos, pareciam ser tão
intratáveis quanto voar — a de uma pessoa viver por
16 décadas a fio e a de um velho manter a força dos verdes
anos. Desde então, vários obstáculos foram superados nos dois
aspectos. No entanto, para a realização do sonho de uma
19 juventude que ultrapasse os limites biológicos, a ciência ainda
tem de percorrer um árduo caminho. Não foi decifrado, por
exemplo, o processo de envelhecimento em toda a sua
22 complexidade. E esse ponto é fundamental para que se
consiga detê-lo.

Internet: <http://www.veja.abril.com.br/especiais/saude2002/p_070.html> (com adaptações).

Acerca das idéias e das estruturas do texto acima, julgue os itens subsequentes.

- 1 Depreende-se do texto que, desde 700 a.C., a ciência já se preocupava com o processo de envelhecimento.
- 2 De acordo com o texto, Zeus não concordou em atender totalmente o pedido de Eos e, por esse motivo, Títon não pôde ficar jovem para sempre.
- 3 As expressões “a deusa da alvorada” (R3) e “o mais musical dos insetos” (R11-12) estão escritas entre vírgulas por constituírem apostos.
- 4 A substituição do conectivo “porém” (R6) por **no entanto** preserva a coerência textual e a correção gramatical do texto.
- 5 Depreende-se do texto que Eos, ao perceber que Títon havia envelhecido, clama pela morte de seu grande amor.
- 6 Na linha 11, a forma verbal “transforma” é complementada, sintática e semanticamente, por “o” (primeira ocorrência) e “em gafanhoto”.
- 7 Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical, ao se substituírem as ocorrências de “para” nas linhas 12 e 22 por **a fim de**.
- 8 Na linha 14, a forma verbal “pareciam” tem como sujeito “povos antigos”.
- 9 Depreende-se das informações do texto que as expressões “duas dificuldades” (R14) e “dois aspectos” (R17-18) remetem ao desejo de uma pessoa de poder viver décadas e manter-se forte.
- 10 A palavra “verdes” (R16), empregada no texto em seu valor conotativo, está associada aos **anos da juventude**.

As vacinas

1 **A**s pesquisas avançam pelo caminho de usar a imunização
no tratamento de doenças que nada têm a ver com
infecção, o campo de atuação inicial das vacinas.

4 A esperança é que sejam desenvolvidas vacinas capazes
de tratar o câncer, o mal de Alzheimer, as doenças
cardiovasculares, a artrite reumatóide e o diabetes. Uma das
7 áreas em que as pesquisas estão mais adiantadas é a das vacinas
contra males associados a problemas do coração, a principal
causa de mortes por doença em todo o mundo. Daqui a cinco
10 anos, deve ser lançada uma vacina contra o colesterol alto.
Normalmente, o organismo produz um tipo de proteína,
chamada de CETP, que participa da transformação de parte do
13 colesterol bom, o HDL, em LDL, o colesterol ruim. A vacina
estimula a produção de uma substância que bloqueia a ação
dessa proteína. No terreno do tratamento do câncer, o
16 método mais promissor consiste em injetar uma bactéria ou um
vírus enfraquecido geneticamente em um tumor. O objetivo
é fazer que esse microrganismo deflagre um ataque do sistema
19 imunológico, o qual acabaria por destruir as células cancerosas.
Alguns experimentos já foram feitos com pessoas portadoras
de melanoma, o tipo mais agressivo de câncer de pele. Os
22 resultados foram bastante animadores.

Idem, ibidem.

Com referência às idéias e às estruturas do texto acima, julgue os itens que se seguem.

- 11 Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical ao se substituir o termo “no” (R2) por **para o**.
- 12 A forma verbal “têm” (R2) possui como sujeito “As pesquisas” (R1).
- 13 Depreende-se do texto que, inicialmente, as vacinas foram criadas para a imunização contra doenças infecciosas.
- 14 De acordo com o texto, são “doenças que nada têm a ver com infecção” (R2-3) “o câncer, o mal de Alzheimer, as doenças cardiovasculares, a artrite reumatóide e o diabetes” (R5-6).
- 15 O trecho “sejam desenvolvidas” (R4) pode ser substituído, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, por **se desenvolve**.
- 16 Depreende-se do texto que doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes por doença em todo o mundo.
- 17 A expressão “dessa proteína” (R15) pode ser substituída, sem prejuízo para a coerência do texto, por **do LDL**.
- 18 O deslocamento de “geneticamente” (R17) para antes do verbo “injetar” (R16) preserva os sentidos textuais e a correção gramatical.
- 19 A expressão “o qual” (R19) refere-se a “um ataque do sistema imunológico” (R18-19).
- 20 “Os resultados” (R21-22) referem-se aos sucessos obtidos com os experimentos realizados com os portadores de melanoma.

Acerca do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, julgue os itens seguintes.

- 21 É uma rede de ações e serviços de saúde regionalizada e hierarquizada.
- 22 Existe mais de uma direção do SUS em cada esfera de governo.
- 23 A iniciativa privada não pode, por lei, participar do SUS.
- 24 Compete ao SUS colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o trabalho.

A respeito da educação em saúde, uma importante medida praticada nos serviços de saúde, julgue os itens a seguir.

- 25 A educação em saúde destina-se exclusivamente à promoção da saúde.
- 26 Os profissionais de enfermagem, de nutrição e de serviço social são os responsáveis pela realização da educação em saúde.
- 27 A participação ativa da população aumenta a efetividade das ações voltadas à educação em saúde.

As competências legais da direção municipal do SUS incluem a

- 28 execução de serviços de vigilância epidemiológica e sanitária.
- 29 execução de serviços de saúde do trabalhador.
- 30 execução de serviços de alimentação e nutrição.
- 31 gestão de laboratórios públicos de saúde e hemocentros.

Acerca da ocorrência de ferimento acidental com agulha de injeção usada, envolvendo um servidor da área de enfermagem, em um ambiente hospitalar, julgue os itens seguintes.

- 32 Não é obrigatória a comunicação imediata ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, caso o servidor já seja vacinado corretamente contra hepatite B.
- 33 Somente é recomendável a comunicação ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, se o paciente no qual a agulha tenha sido usada for portador do vírus da imunodeficiência humana.
- 34 No caso de o paciente no qual a agulha tenha sido usada ser portador de hepatite C, a conduta imediata é a vacinação contra essa doença.

Com relação à notificação compulsória de doenças, prevista na Lei n.º 6.259, de 30/10/1975, e no Decreto n.º 78.231, de 12/8/1976, que a regulamenta, e à luz da legislação atual, julgue os itens subseqüentes.

- 35 Somente devem ser notificados os casos confirmados de doenças.
- 36 A relação atual das doenças de notificação compulsória (Portaria n.º 1.943, de 18/10/2001) inclui a hanseníase, a paralisia flácida aguda e o tétano.
- 37 Os gestores municipais do SUS podem incluir outras doenças no elenco das doenças de notificação compulsória em seu âmbito de competência.

A respeito das conferências de saúde, que são instâncias colegiadas do SUS previstas em lei, julgue os itens a seguir.

- 38 Devem reunir-se a cada 4 anos.
- 39 São de âmbito exclusivamente nacional.
- 40 Têm representação dos vários segmentos sociais.

A Autoridade Nacional Palestina (ANP) convidou o Brasil a integrar uma força-tarefa que ajudaria o grupo que é conhecido como Quarteto — Estados Unidos da América (EUA), Rússia, União Européia e Organização das Nações Unidas (ONU) — para ajudar nas negociações de paz entre palestinos e israelenses.

O Brasil também deve abrir um escritório de representação ou embaixada em Ramallah, cidade da Cisjordânia onde está confinado o presidente da ANP, Yasser Arafat. O Quarteto é um grupo quase inoperante, totalmente dominado pelos EUA. O convite da Palestina para que o Brasil integre a força-tarefa é uma jogada política calculada. Lula e Arafat são conhecidos de longa data, tendo se encontrado em Brasília, na Nicarágua e em Túnis.

Folha de S. Paulo, 9/12/2003, p. A4 (com adaptações).

A partir do texto acima e considerando o cenário internacional contemporâneo e a atual política externa brasileira, julgue os itens que se seguem.

- 41 Após os atentados contra Nova Iorque e Washington, em setembro de 2001, os EUA assumiram uma posição mais flexível e tolerante em relação ao mundo árabe, como meio de evitar novos ataques ao seu território.
- 42 A União Européia, que integra o quarteto citado no texto, corresponde à integração econômica, política, social e cultural implementada por grande parte dos países europeus como forma de se fortalecerem em uma época de economia globalizada e bastante competitiva.
- 43 Com a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), a Rússia transformou-se em uma das cinco maiores potências econômicas do mundo, embora tenha perdido toda sua força militar.
- 44 O Oriente Médio, região em que se situam a Palestina e Israel, continua sendo uma das principais áreas estratégicas do mundo, especialmente em função de suas reservas de petróleo.
- 45 Em sua recente visita a países árabes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou o apoio do Brasil à atual política externa dos EUA, posição externada quando de sua chegada a Israel.
- 46 Deduz-se do texto que a ANP pretende formar um grupo de países interessados em sua causa, de modo a forçar algumas decisões do quarteto que lhe sejam favoráveis.
- 47 Yasser Arafat tem posições radicais, a começar pela não-aceitação da existência do Estado de Israel, o que dificulta ainda mais as negociações de paz na região.
- 48 Nos últimos anos, a ONU reforçou seu papel nas relações internacionais, a exemplo do ocorrido nos episódios da antiga Iugoslávia e das invasões norte-americanas ao Afeganistão e ao Iraque.
- 49 Ainda não existe efetivamente o Estado da Palestina, o que motiva ainda mais a elevada tensão no Oriente Médio.
- 50 As viagens ao exterior do presidente Lula integram uma estratégia voltada para a maior visibilidade e melhor inserção do país no cenário mundial.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Considere que um paciente relate dor epigástrica associada a fezes escurecidas, há uma semana, e descreva, também, desconforto pós-prandial e piora da dor após alimentação. Em face desse caso, julgue os itens a seguir.

- 51 Sangramento digestivo em pacientes portadores de cirrose decorre freqüentemente de varizes da junção gastroesofágica, tendo nos beta-bloqueadores não-seletivos, como o propranolol, uma prevenção eficaz dos sangramentos por varizes esofágicas.
- 52 Hematêmese indica sangramento situado abaixo do ligamento de Treitz, enquanto melena significa sangramento digestivo baixo, de duração maior que 72 horas.
- 53 A hepatite C é causa de hipertensão portal cirrótica, cujos casos agudos evoluem para hepatite crônica em 50% a 70% dos casos.

Uma paciente em trânsito, acompanhada em serviço de cardiologia, refere-se grávida de cerca de 12 semanas, com queixas de desconforto respiratório, de aumento gradual, palpitação, sopro diastólico em ponta, importante, taquicardia e pulso irregular em freqüência.

Com relação ao quadro acima, julgue os itens seguintes.

- 54 Cardiomiopatia da gravidez, cujos sintomas freqüentemente se iniciam no primeiro trimestre da gestação, é diagnóstico diferencial do caso apresentado.
- 55 A sintomatologia relatada pode ter sido deflagrada por quadro de fibrilação atrial.
- 56 É indicada a utilização de inibidores da ECA, com a finalidade de diminuir a pós-carga, aumentada substancialmente no primeiro trimestre da gestação.
- 57 A hipertensão pulmonar é a possível causa da sintomatologia respiratória.

Com respeito às patologias do trato respiratório, julgue os itens subseqüentes.

- 58 Na doença pulmonar obstrutiva crônica, o espirograma, essencial para o diagnóstico e a conduta, demonstra volumes evolutivamente diminuídos, dificuldade para atingir *plateau* em 3 a 5 segundos e exalação forçada prolongada.
- 59 A asma alérgica é dependente de resposta de IgE, controlada por linfócitos T e B ativados por interação de antígenos com mastócitos ligados às moléculas de IgE.
- 60 Casos de pneumonia intersticial associada a artrite reumatóide, mais freqüentes no sexo masculino, incluem alterações pleurais, fibrose intersticial e nódulos pulmonares.

Considere que um paciente apresentou resultados laboratoriais plasmáticos de sódio igual a 120 mEq/L, de potássio igual a 2,8 mEq/L e de bicarbonato igual a 20 mEq/L. Em face desses resultados laboratoriais, julgue os itens a seguir.

- 61 Em caso de sódio urinário próximo a 20 mEq/L, é esperado quadro de diarreia e vômitos devido à associação de sódio e potássio baixos.
- 62 No caso do paciente descrito, a reposição de sódio deve ser intensa e imediata, com o intuito de prevenir convulsões, freqüentemente vistas nesse tipo de caso.
- 63 A administração de magnésio deve ser concomitante à reposição de potássio em casos de hipopotassemia refratária.
- 64 O aldosteronismo primário associa a hipopotassemia e a alcalose à hiponatremia e à hipovolemia.
- 65 A reposição do potássio, por ser este um íon extracelular, interfere fortemente na osmolaridade plasmática.

Um paciente queixa-se de agitação, insônia, tremores, palpitação e dor ocular. Considerando essa situação, julgue os itens que se seguem.

- 66 Quadros de tireotoxicose sem oftalmopatia, associados TSH elevado e TSH-R Ab normal, sugerem adenoma pituitário.
- 67 Quadros de arritmia cardíaca induzidos por tireotoxicose respondem satisfatoriamente à administração de amiodarona na dose de 300 mg 12/12 h, EV.
- 68 Tireoidite de Hashimoto pode causar hipertireoidismo durante sua fase inicial, que é a fase destrutiva, podendo ocorrer de forma transitória em pós-parto.

Julgue os itens subseqüentes, relacionados às afecções reumatológicas.

- 69 Anticorpos antinucleares positivos são a evidência laboratorial mais freqüente no diagnóstico de pacientes portadores de lúpus eritematoso sistêmico.
- 70 O quadro inicial de cerca de 70% dos pacientes com artrite reumatóide manifesta-se por sintomas musculoesqueléticos vagos e fadiga.
- 71 Quadros de gota (artropatia por deposição de urato monossódico) manifestam-se inicialmente por poliartrite simétrica de pequenas articulações.
- 72 Na análise do líquido sinovial em casos de artrite gonocócica, obtêm-se culturas positivas para *Neisseria gonorrhoeae* em menos de 40% dos casos.

Paciente feminina, com 54 anos de idade e 60 kg, portadora de insuficiência renal crônica, com depuração de creatinina endógena (DCE) de 34 mL/min/1,73m², foi atendida com quadro de febre associado a desconforto lombar bilateral. Tem ecografia de trato urinário pregressa que apresenta rins contraídos bilateralmente, associados a retrações cicatriciais e pressão arterial de 162 × 104 mmHg. EAS demonstra intensa piúria e proteinúria. No momento tem exames laboratoriais de uréia de 64 mg/dL e creatinina de 1,8 mg/dL.

Com relação ao caso em apreço, julgue os itens a seguir.

- 73 A avaliação ecográfica sugere quadro obstrutivo urinário baixo.
- 74 O nível atual de creatinina denota significativa piora da função renal em relação ao anterior (DCE de 34 mL/min/1,73m²).
- 75 Pacientes com infecção do trato urinário, portadores de patologia renal prévia, com sintomatologia severa, devem ser hospitalizados, e a antibioticoterapia por via parenteral empírica, preferencialmente com imipenem, deve ser instituída.
- 76 Tratamento de hipertensão arterial sistêmica parenteral deve ser imediatamente administrado com o intuito de preservar a função renal da paciente.
- 77 Casos de nefropatia crônica, devido à recorrência de infecção urinária, geralmente têm início tardio em mulheres, entre 40 e 50 anos de idade.

Uma paciente com 31 anos de idade apresenta queixa de cefaléia ocasional na nuca. Observam-se tortuosidade arteriovenosa no exame oftalmoscópico, pressão arterial de 220/132 mmHg e discreto sopro na região subcostal esquerda. A paciente tem história familiar de hipertensão arterial e não está usando anticoncepcional oral.

Com base no caso clínico apresentado acima, julgue os itens a seguir.

- 78** O diagnóstico mais provável é de hipertensão arterial essencial, já que existe história familiar.
- 79** Se a paciente apresentar uma elevação reversível de creatinina, induzida pelo uso de inibidor da enzima de conversão, isso fortalecerá a hipótese diagnóstica de hipertensão essencial.

É correto o diagnóstico de hipotireoidismo para o caso de

- 80** uma mulher com 38 anos de idade, com humor deprimido e que não menstrua desde o nascimento do último filho, há 4 anos.
- 81** mulher com 64 anos de idade, exposta a iodo radioativo para tratamento de bócio há cerca de 20 anos.
- 82** mulher de 75 anos de idade que, além de ter história de letargia progressiva e confusão mental, esteja comatosa, edemaciada e pálida.

Acerca do refluxo gastroesofágico, julgue os itens abaixo.

- 83** Quando ocorre durante a gestação, habitualmente regride após o término da gravidez.
- 84** A presença de um anel de Schatzki no esofagograma constitui um indício importante para sua presença.

Um dos importantes problemas em clínica médica diz respeito aos efeitos colaterais por drogas e suas interações farmacológicas. Nesse contexto, julgue os itens que se seguem.

- 85** O uso de hidroclorotiazida a longo prazo pode levar a uma acidose metabólica hiperclorêmica.
- 86** O triamtereno é um diurético poupador de potássio, e seu uso pode estar associado com a produção de hipercalemia clinicamente significativa.
- 87** A fenitoína pode ter seus níveis séricos aumentados com aspirina, amiodarona e clordiazepóxido.

Com relação à insuficiência renal crônica, julgue os itens seguintes.

- 88** São achados típicos: rins pequenos bilateralmente, presença de anemia e hiperfosfatemia.
- 89** Considere, por hipótese, que um executivo com 50 anos de idade esteja com tosse persistente e sibilos desde que se engasgou com um punhado de pipocas em um jogo, há uma semana. Nessa hipótese, pode-se atribuir os sintomas apenas a irritação brônquica, se a radiografia de tórax não apresentar infiltrados.

Julgue o seguinte item.

- 90** A artrite reumatóide está frequentemente associada a derrame pleural e atelectasia lobar.

Uma mulher de 80 anos de idade é admitida em uma unidade de saúde com quadro clínico caracterizado por dor abdominal em cólica, vômitos e parada de eliminação de flatos e fezes. Nos antecedentes operatórios, foi submetida a apendicetomia aos 27 anos de idade e histerectomia abdominal por miomatose há 30 anos. Ao exame clínico, tem distensão abdominal e ruídos peristálticos de luta. O quadro radiológico é de obstrução do intestino delgado.

A respeito desse caso hipotético, julgue os itens a seguir.

- 91** Na admissão da paciente, a dosagem dos níveis sanguíneos de sódio e potássio é parte integrante da avaliação inicial.
- 92** O trânsito do intestino delgado com sulfato de bário é fundamental para avaliar a viabilidade intestinal.
- 93** No caso em questão, o diagnóstico etiológico mais provável é de obstrução do intestino delgado por brida ou aderências.
- 94** A reposição hídrica dessa paciente hipotética terá de ser feita de forma bastante cuidadosa, uma vez que se trata de uma mulher idosa e, portanto, com a quantidade de água corporal total aumentada em relação à água corporal dos adultos jovens.
- 95** O cateterismo gástrico e vesical, no caso em questão, deve ser realizado logo no início do tratamento.
- 96** No tratamento cirúrgico para a paciente, se houver isquemia intestinal com perfuração e peritonite generalizada, a cavidade abdominal deve ser drenada com vários drenos.

Um homem de 50 anos de idade, portador de diabetes melito do tipo I, é submetido a uma gastrectomia total para tratamento de um adenocarcinoma de corpo gástrico.

Em relação ao período pós-operatório desse paciente hipotético, julgue os itens subsequentes.

- 97** No pós-operatório imediato desse paciente, os níveis sanguíneos de aldosterona e de hormônio antidiurético estarão aumentados.
- 98** Nas primeiras 24 horas do período pós-operatório desse paciente, haverá uma forte tendência à hipoglicemia, decorrente do aumento da liberação de catecolaminas e insulina.
- 99** No caso hipotético descrito, tanto na ferida operatória como na anastomose esofagogástrica, nas primeiras 24 horas do período pós-operatório, o colágeno do tipo III predominará sobre o do tipo I.
- 100** Para esse paciente hipotético, o uso de antibiótico terapêutico seria indicado para diminuir o risco de infecção no sítio cirúrgico.

Um homem de 34 anos de idade apresenta disfagia crônica com 8 anos de evolução. Os antecedentes epidemiológicos e as provas sorológicas são positivos para doença de Chagas. Ao exame clínico e à avaliação nutricional, está gravemente desnutrido. Ao esofagograma, tem um dolicomegaesôfago.

Em relação ao caso clínico hipotético apresentado, julgue os itens seguintes.

- 101** No caso mencionado pela descrição do exame radiológico, trata-se de um megaesôfago do grupo IV ou de grau IV.
- 102** O paciente mencionado, no período pré-operatório, deve ser recuperado do ponto de vista nutricional. Mesmo sendo possível a colocação de um cateter nasoenteral, deve-se dar preferência à nutrição parenteral total, por ser mais eficiente e apresentar menor risco de complicações infecciosas e metabólicas que a nutrição enteral.
- 103** Para o caso em análise, a melhor opção cirúrgica é a operação de Heller por via laparotômica ou laparoscópica.
- 104** No caso clínico hipotético descrito, assim como nos casos de hérnia hiatal, a indicação cirúrgica depende do grau de esofagite.

Uma mulher de 25 anos de idade vai a uma unidade de saúde para uma consulta ginecológica. Ao exame clínico, foi detectado um nódulo de 2,5 cm no lobo direito da tireóide. A ecografia revelou tratar-se de um nódulo sólido. A punção com agulha fina revelou carcinoma papilífero. A paciente encontra-se completamente assintomática.

A respeito dessa situação clínica, julgue os seguintes itens.

- 105** A lobectomia direita com istmectomia é a operação mínima para o caso clínico hipotético descrito.
- 106** A via usual de disseminação do carcinoma papilífero, citado acima, é a linfática.
- 107** Independentemente da extensão da ressecção da tireóide, a colocação de um dreno de sucção é obrigatória para diminuir o risco de infecção da ferida cirúrgica.

Julgue o item abaixo, relativo às ressecções hepáticas para tratamento de metástases de adenocarcinomas primários de próstata e de colo e reto.

- 108** Em relação aos dois sítios primários referidos, de modo geral, os pacientes têm melhor prognóstico após hepatectomia para tratamento das metástases de origem colorretal.

Um homem de 65 anos de idade apresenta uma volumosa hérnia inguinoescrotal à esquerda, com 6 meses de evolução. Na avaliação pré-operatória, constatou-se que o paciente tem muita dificuldade miccional devido a aumento da próstata decorrente de hiperplasia benigna.

Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

- 109** No caso clínico hipotético descrito, no momento do tratamento cirúrgico da hérnia, a dissecação deverá ser feita com cautela para evitar a lesão do sigmóide, pois este poderá estar fazendo parte da parede do saco herniário.

- 110** O tratamento da hiperplasia e o reparo sem tensão na correção cirúrgica da hérnia, no caso descrito, são medidas importantes para evitar a recidiva da hérnia.

Julgue os seguintes itens relativos a avaliação e atendimento de pacientes traumatizados.

- 111** Em um paciente com um ferimento penetrante no hemitórax esquerdo, a primeira medida que deve ser adotada é a drenagem torácica em selo d'água.
- 112** No tratamento de choque hemorrágico, a primeira prioridade é parar o sangramento.
- 113** A sondagem nasogástrica está contra-indicada em pacientes com suspeita de fratura de base de crânio.
- 114** O cateterismo vesical só deve ser realizado após haver sido feita a radiografia da pelve.
- 115** A tomografia computadorizada é o exame de maior especificidade para o diagnóstico de lesões intra-abdominais, após um trauma contuso.
- 116** A lavagem peritonial diagnóstica está indicada para todo paciente com retorragia após trauma abdominal.

Um menino com 25 kg de peso corporal foi vítima de atropelamento. No pronto-socorro, após garantir a permeabilidade da via aérea e controlar a respiração, o menino apresentou sinais claros de choque hipovolêmico. A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

- 117** O volume de cristalóide que deve ser infundido na primeira etapa é de 1.000 mL.
- 118** Caso o paciente necessite de transfusão sanguínea, o volume de sangue a ser administrado na primeira etapa deve ser de 250 mL.

Um homem de 21 anos de idade, com 50 kg de peso corporal, sofreu queimaduras de 2.º e 3.º graus no tronco, atingindo 30% da superfície corporal. A esse respeito, julgue os itens seguintes.

- 119** O volume de líquido que deve ser infundido nas primeiras 24 h após a queimadura é de 3.000 mL a 6.000 mL.
- 120** O parâmetro mais fidedigno para avaliar a perfusão orgânica nesse paciente é a pressão arterial média.