

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os próximos itens de acordo com os preceitos éticos e legais a serem seguidos pelo perito na área da medicina.

- 51 A perícia médico-legal com finalidade criminal, diferentemente da medicina assistencial, não pressupõe o estabelecimento de uma relação profissional-paciente e, por essa razão, não configura um ato médico.
- 52 A realização de perícia médico-legal em pessoas vivas depende, necessariamente, do consentimento do periciando, ainda que implícito, para as conclusões da perícia terem validade e para evitar que o perito incorra em crime de constrangimento ilegal.
- 53 **Situação hipotética:** Após rebelião em presídio na qual se suspeitou de excesso no uso de força policial, cerca de trezentos detentos serão submetidos a exames de corpo de delito para a constatação de eventuais lesões corporais. **Assertiva:** Nessa situação, será facultado ao perito médico se deslocar até o presídio para realizar a perícia, mesmo que exista um ambiente com condições adequadas para exames médicos periciais.
- 54 As necropsias de interesse médico-legal, por força de lei, independem de autorização da família, da mesma forma que algumas de interesse apenas médico-sanitário.
- 55 Segundo o Código de Processo Penal, o exame cadavérico, em casos de morte violenta, é obrigatório e deverá ser realizado preferencialmente por perito oficial, sendo obrigatória, nesses casos, a inspeção tanto externa quanto interna do corpo, o que será detalhado e, se possível, ilustrado, no respectivo laudo pericial.

Julgue os seguintes itens, a respeito de lesões produzidas por projéteis de arma de fogo.

- 56 Todas as lesões produzidas por projéteis únicos de arma de fogo devem ser classificadas como perfurocontusas.
- 57 A excentricidade da orla de escoriação presente em uma lesão de entrada de projétil de arma de fogo único não encamisado é indicativa de que este terá entrado no corpo de lado, o que poderia ter sido causado, entre outros aspectos, por um ricochete ou por transfixação ocorridos antes de o projétil atingir a vítima.
- 58 Lesões estreladas podem ocorrer em entradas ou saídas de projéteis de arma de fogo.
- 59 **Situação hipotética:** Em uma perícia cadavérica de vítima de disparo de arma de fogo único no crânio, observou-se que o núcleo havia se separado da respectiva camisa. Esses elementos balísticos foram recolhidos para exame; entretanto, um deles se perdeu. **Assertiva:** Nessa situação, a perda pericial será maior, caso o extravio seja da camisa.
- 60 O exame cadavérico de uma vítima de disparo de arma de fogo de alma lisa deve cursar com o recolhimento de todos os balins, para fins de exame laboratorial.

Com referência à classificação dos agentes vulnerantes, julgue os itens a seguir.

- 61 Uma lesão com secção da artéria carótida comum esquerda, em alguns casos, pode ser denominada de esgorjamento, independentemente de ter sido produzida por ação cortante ou cortocontundente.
- 62 Nas lesões causadas por explosão de artefatos pirotécnicos, pode-se ter a combinação de agentes contundentes com agentes térmicos.
- 63 Em geral, fraturas ósseas ou dentárias pressupõem a participação de agente contundente, perfurocontundente ou cortocontundente.
- 64 Um mesmo instrumento pode produzir lesões incisais, perfuroincisais, cortocontusas e contusas.

No que se refere à medicina legal, julgue os itens que se seguem.

- 65 O sinal de Amussat, que corresponde a lesão na túnica íntima da artéria carótida, é mais comum no enforcamento do que na esganadura.
- 66 Caso uma pessoa seja encontrada morta, pendurada por uma corda envolta em seu pescoço, mas com os joelhos semifletidos e os pés tocando o chão, deve-se excluir a hipótese de suicídio por enforcamento.
- 67 Em caso de lesão corporal dolosa não seguida de morte, a classificação jurídica da lesão em leve, grave ou gravíssima não será de competência do perito médico-legista.
- 68 O fato de uma vítima de agressão sobreviver à injúria corporal, mas, devido a isso, perder toda a função renal direita, sem acometimento do rim esquerdo, caracteriza o crime de lesão corporal de natureza leve.
- 69 A gestão de cadáveres em um desastre de massa deve levar em conta, além dos aspectos legais e sanitários, os culturais, sociais, religiosos e psicológicos da população afetada.
- 70 **Situação hipotética:** Uma chacina foi perpetrada contra uma família, e as vítimas fatais, todas nuas, foram levadas para diferentes locais. O filho foi jogado em um canal; o pai, submerso em uma cisterna; e a mãe, enterrada. Arrependido, após uma semana, o criminoso confessou e indicou os locais dos corpos, que foram resgatados no mesmo dia. **Assertiva:** Nessa situação, o cadáver mais putrefato será o do pai.

A respeito de tortura e de exames periciais para diagnóstico de vítimas submetidas a tortura, tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, julgue os itens subsequentes.

- 71 A otoscopia detalhada, exame que, em geral, possibilita ao médico legal descrever as lesões detectadas, pode confirmar o diagnóstico de traumatismo do aparelho auditivo e o tipo de tortura que a vítima tiver sofrido.
- 72 O exame da região genital, caso necessário, deverá ser realizado por médico do mesmo sexo do periciando, exceto nos casos de transexuais e assemelhados.
- 73 Em caso de hipótese de tortura, a utilização da expressão “correspondência típica” em um relatório médico-legal indicará que o sinal ou sintoma não pode ter sido causado de qualquer outra forma senão a descrita.
- 74 A tortura por eletricidade com o uso de toalha molhada interposta entre a pele e o condutor energizado aumenta a superfície de passagem da eletricidade e nem sempre deixa a marca típica de Jellinek.

Dois motoristas, Pedro e José, foram levados à central de flagrantes da polícia civil após terem sido parados em uma *blitz* no trânsito. Segundo a polícia civil, Pedro, de trinta e dois anos de idade, foi submetido ao teste do bafômetro, durante a *blitz*, e o resultado mostrou 0,68 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ele pagou fiança e deverá responder em liberdade por crime de trânsito. Conforme os policiais, José, de vinte e dois anos de idade, se recusou a submeter-se ao teste do bafômetro, mas o médico legista do Instituto Médico Legal (IML) que o examinou comprovou alteração da capacidade psicomotora em razão do consumo de substância psicoativa que determina dependência. José também pagou fiança para ser liberado.

Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

- 75 Caso fosse feito um segundo teste do bafômetro em Pedro, cinco minutos após a realização do primeiro teste, o resultado seria necessariamente inferior a 0,68 miligramas de álcool por litro de ar expelido, desde que ele não tivesse ingerido bebida alcoólica durante o intervalo entre os testes.
- 76 Os exames clínicos que podem ter sido utilizados pelo médico legista para a comprovação do consumo de substância psicoativa por José incluem a loquacidade, o equilíbrio e a coordenação motora.
- 77 A conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa que não seja bebida alcoólica não está prevista como crime no Código de Trânsito Brasileiro.
- 78 José cometeu infração administrativa, mas não crime, ao se recusar a fazer o teste do bafômetro.

No que se refere à genética forense, julgue os próximos itens.

- 79 Tanto a mutação quanto o polimorfismo constituem alteração na sequência do DNA, mas o segundo não implica modificação da expressão gênica; apesar disso, a análise dos polimorfismos pode contribuir para a identificação de uma pessoa.
- 80 O princípio básico para o estabelecimento de um perfil de DNA de interesse forense está relacionado à quantidade suficiente de polimorfismos de determinado sujeito: a probabilidade de qualquer outra pessoa, incluindo-se irmãos gêmeos univitelinos, ter os mesmos alelos em cada locus cromossomal é ínfima.
- 81 As amostras de tecidos moles de um cadáver para possível exame de DNA devem ser acondicionadas em saco plástico limpo a temperatura entre 2 °C e -8 °C, para fins de armazenamento.

Uma mulher de vinte e oito anos de idade foi presa acusada do crime de infanticídio, após ter jogado em uma centrífuga o bebê que ela havia dado à luz. Segundo a ocorrência policial, um familiar da suspeita disse que ela havia escondido a gravidez e que negava que houvesse praticado aborto.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

- 82 Caso, em exame no IML após a prisão, seja encontrado tablete de misoprostol na cavidade vaginal da suspeita, o perito deverá responder “sim” ao quesito “há vestígios de provocação de aborto?”.
- 83 A configuração do crime de infanticídio independe da existência de estado puerperal, bastando para tal que o sujeito passivo seja uma criança.
- 84 Caso a docimásia pulmonar hidrostática de Galeno evidencie franca flutuação desde a primeira fase, excluindo-se as causas de falso-positivos, dever-se-á concluir que o nascituro não respirou.
- 85 O diagnóstico pericial de gravidez pregressa em mulheres acusadas de crime de aborto ou infanticídio pode ser realizado por meio do exame da genitália para identificar o sinal de Jacquemier ou de Chadwick (na vulva) ou o sinal de Kluge (na vagina).

Julgue os itens subsequentes, relativos à psicopatologia forense.

- 86 Verificada imputabilidade penal plena, o perito deve fazer constar no laudo pericial a conclusão de que o periciado era, à época do exame pericial, plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.
- 87 A esquizofrenia é uma das psicoses encontradas com mais frequência nos réus que se submetem a exame de imputabilidade penal, sendo esses periciandos, geralmente, considerados inimputáveis.
- 88 Em casos de psicopatia, observa-se mais o uso de violência instrumental do que o de violência reativa, a qual é mais própria dos transtornos da personalidade.
- 89 No Código Penal brasileiro, a expressão desenvolvimento mental retardado se refere à psicose, à epilepsia e à demência.

Um trabalhador de quarenta e oito anos de idade morreu após ter caído de um barracão com uma altura de três metros. O caso aconteceu em uma fábrica localizada em área industrial. O corpo de bombeiros foi até o local para atender a vítima, que havia batido a cabeça na queda e estava inconsciente. Equipes da polícia militar e do Instituto Geral de Perícias (IGP) da cidade onde ocorreu o acidente também atenderam à ocorrência.

Considerando as informações do texto anterior, julgue os próximos itens, a respeito de infortunística.

- 90 Para fins de classificação em infortunística, casos como o citado nesse texto são exemplos de acidente típico.
- 91 Acidentes de trabalho, como o mencionado no texto, atingem mais trabalhadores do sexo masculino com idade entre quarenta anos e cinquenta anos.
- 92 O trabalhador que sobrevive a tais acidentes com sequelas e apresenta incapacidade total para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação profissional, e que, por consequência, não tem mais condições de prover a sua subsistência pode ser aposentado por invalidez.

No que tange à responsabilidade civil e penal do médico, julgue os itens subsecutivos.

- 93 Responsabilidade civil médica é o dever jurídico do médico de responder por atos praticados durante o exercício da profissão — quando ilícitamente causar danos —, além do dever de repará-los.
- 94 **Situação hipotética:** Ao planejar uma cirurgia de joelho, de forma descuidada, o médico não percebeu que a radiografia estava sendo observada pelo lado contrário e, durante a execução do procedimento, operou o joelho errado. **Assertiva:** Nesse caso, cabe sua responsabilização criminal, mas não responsabilização civil.

Com relação às perícias médicas nos âmbitos cível, administrativo e previdenciário, julgue os itens que se seguem.

- 95 Nos casos de perícias no âmbito previdenciário, todo indivíduo inválido pode ser considerado alienado mental.
- 96 Nos casos de perícias no âmbito administrativo, de acordo com a Lei n.º 8.112/1990, o servidor aposentado por invalidez permanente deve ser submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de readaptação.
- 97 Nos casos de perícias no âmbito cível, para a determinação do valor da indenização devida a vítima de lesões corporais, devem-se considerar critérios como as despesas de tratamento.

Com relação a doenças coronarianas, julgue os itens a seguir.

- 98 Os avanços tecnológicos têm contribuído para a redução de sua mortalidade nas últimas décadas.
- 99 A síndrome coronariana aguda ainda é uma grande causa de morbidade e mortalidade em todo o mundo.
- 100 Embora a mortalidade atribuída à doença tenha diminuído significativamente entre idosos, vem aumentando entre pacientes mais jovens.
- 101 A ruptura de placa aterosclerótica ainda é a principal causa de trombose das artérias coronárias.
- 102 Os avanços em prevenção, diagnóstico e tratamento têm reduzido a níveis muito baixos a recorrência de eventos isquêmicos.

Acerca dos transtornos do espectro da esquizofrenia, julgue os itens subsequentes.

- 103 Dois sintomas negativos destacam-se na esquizofrenia: expressão emocional diminuída e redução em atividades motivadas, autoiniciadas e com finalidade.
- 104 Delírios são crenças fixas que podem ser mudadas à luz das evidências conflitantes. Os delírios podem ter, por exemplo, conteúdo persecutório, religioso, somático e de grandeza.
- 105 As alucinações podem ser um elemento normal em experiências religiosas de determinados contextos culturais.

A respeito de transtornos do humor, julgue os itens seguintes.

- 106 Pessoas com transtorno bipolar têm, ao longo da vida, risco de suicídio estimado em pelo menos quinze vezes o da população em geral.
- 107 O transtorno bipolar tipo II caracteriza-se por um curso clínico de episódios de humor recorrentes, sendo um ou mais episódios depressivos maiores e pelo menos um episódio maníaco.
- 108 Um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável e aumento anormal e persistente da atividade ou energia, com duração de pelo menos quatro dias consecutivos e presente na maior parte do dia, quase todos os dias, caracteriza um episódio hipomaníaco.
- 109 Pessoas com transtorno bipolar tipo II normalmente comparecem ao atendimento médico durante um episódio de mania, sendo improvável que se queixem inicialmente de hipomania.
- 110 Em relação ao suicídio, o mais consistente fator de risco descrito é a história prévia de tentativas ou ameaças de suicídio.
- 111 A maioria dos suicídios completados é precedida de tentativas de suicídio sem sucesso.
- 112 Em se tratando de depressão maior, os sintomas de insônia ou fadiga são frequentemente a principal queixa relatada pelo paciente.

No que se refere ao tromboembolismo pulmonar (TEP), julgue os itens que se seguem.

- 113 O TEP é a uma causa de morte muito comum entre pacientes hospitalizados.
- 114 A apresentação clínica mais comum do TEP é caracterizada pela precocidade de sintomas exuberantes.
- 115 O filtro de veia cava está indicado para pacientes que cursem com episódios recorrentes de TEP, a despeito de terapia anticoagulante adequada, mas é contraindicado para pacientes com alto risco de desenvolver trombose venosa profunda proximal.
- 116 Aproximadamente quinze por cento dos pacientes acometidos por TEP são diagnosticados com trombose venosa profunda nos membros inferiores.
- 117 O resultado de dímero-D menor que 500 ng/mL, pelo método de Elisa rápido quantitativo, torna improvável a ocorrência de TEP.
- 118 O exame angiográfico pulmonar permite ao médico diagnosticar TEP em aproximadamente metade dos pacientes com trombose venosa profunda nos membros inferiores.

Julgue os próximos itens, relativos às pneumoconioses.

- 119 São doenças fibróticas dos pulmões causadas pela inalação de poeira com matéria orgânica.
- 120 As formas graves de silicose e asbestose podem ser tratadas com terapia imunossupressora.