



INCA INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER

CONCURSO PÚBLICO

**CARGO 51:
TECNOLOGISTA JÚNIOR**

**ÁREA:
MEDICINA**

**ESPECIALIDADE:
CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO**

**CADERNO DE PROVAS – PARTE II
Conhecimentos Específicos e Discursiva**

MANHÃ

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Nesta parte II do seu caderno de provas, confira atentamente se os seus dados pessoais e os dados identificadores do seu cargo transcritos acima estão corretos e coincidem com o que está registrado em sua folha de respostas e em sua folha de texto definitivo da prova discursiva. Confira também o seu nome e o nome de seu cargo em cada página numerada desta parte de seu caderno de provas. Em seguida, verifique se o seu caderno de provas (partes I e II) contém a quantidade de itens indicada em sua folha de respostas, correspondentes às provas objetivas, e a prova discursiva, acompanhada de espaço para rascunho. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência quanto aos seus dados pessoais ou quanto aos dados identificadores do seu cargo, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- 2 Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da **folha de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A maior capacidade é a confiabilidade.

OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido em edital.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet – www.cespe.unb.br.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca dos tumores benignos que ocorrem na cavidade nasal, julgue os seguintes itens.

- 41 A maioria dos papilomas invertidos surge da parede lateral da cavidade nasal, sendo comum um envolvimento secundário dos seios maxilar e etmoidal.
- 42 As associações do papiloma invertido com malignidade são muito comuns, chegando a 50% dos casos.
- 43 Quando o papiloma invertido não é ressecado adequadamente, sua taxa de recorrência é alta, podendo chegar a mais de 40%.
- 44 É invariável o potencial vascular e fibroso do angiofibroma juvenil.

Quanto às neoplasias malignas da cavidade nasal, julgue os próximos itens.

- 45 O tipo histológico mais comum é o adenocarcinoma.
- 46 A taxa de cura de um paciente com carcinoma de septo nasal tratado adequadamente com cirurgia ou cirurgia e radioterapia é boa, com média de 70%.
- 47 Paciente diagnosticado e tratado cirurgicamente de melanoma não necessita de acompanhamento constante devido à baixa taxa de recorrência dessa doença.

Julgue os itens que se seguem, relativos às doenças das glândulas salivares.

- 48 Sialoadenite crônica é uma condição localizada da glândula salivar caracterizada por episódios de dor e inflamação, geralmente culminando em degeneração ductal com preenchimento fibroso.
- 49 Vários episódios inflamatórios podem levar a alterações irreversíveis da arquitetura ductal, resultando em ectasia ductal difusa.

Em relação às neoplasias malignas da boca (incluindo lábios), julgue os itens seguintes.

- 50 A maioria dos cânceres de lábio está relacionada à exposição solar, sendo o tipo histológico mais comum o carcinoma basocelular.
- 51 O tipo morfológico mais comum de câncer de lábio é o ulceroinfiltrativo.
- 52 O tipo morfológico exofítico tende a dar metástases tardiamente.
- 53 O câncer de lábio tende a ter uma história lenta. O paciente pode apresentar crostas recorrentes em área leucoplásica por alguns anos antes da evidência de infiltração.
- 54 O triângulo retromolar é o local mais comum dos tumores malignos da cavidade oral.
- 55 Após diagnóstico de um carcinoma espinocelular (T2) de borda livre de língua, deve-se encaminhar o paciente para cirurgia ou radioterapia, pois, em ambas as opções, os resultados de sobrevida em 5 anos são praticamente iguais.

Considerando que há um melhor controle locorregional dos carcinomas espinocelulares das vias aerodigestivas superiores, a ocorrência de múltiplos tumores primários apresenta impacto na sobrevida dos pacientes. Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir.

- 56 A continuidade do tabagismo e do etilismo após o tratamento é um importante fator de risco.
- 57 Os tumores primários da laringe estão muito associados aos segundos primários em pulmão.
- 58 A pan-endoscopia periódica é de extrema importância, com muitos achados positivos e excelente relação custo/benefício.

No que concerne à radiobiologia, uma das armas no tratamento de grande parte dos cânceres da região de cabeça e pescoço, julgue os itens subsequentes.

- 59 O efeito da radioterapia é, em 70% dos casos, decorrência da ação irradiante sobre o DNA da célula tumoral.
- 60 No fracionamento, o princípio dos quatro erres significa reparo, redistribuição, repopulação e reoxigenação.

Julgue os itens a seguir, relativos aos tumores das glândulas salivares.

- 61 O tumor de Warthin é também denominado nódulo quente devido a sua intensa capacidade em captar o tecnécio.
- 62 A faixa etária mais acometida pelos adenomas pleomórficos de parótida está acima dos 50 anos de idade.
- 63 O carcinoma adenoide cístico apresenta evidências microscópicas de envolvimento perineural em cerca de 50% dos casos, e a sua incidência de metástases pulmonares tem sido relatada, na literatura, entre 37% e 43%.

Considerando o quadro de um paciente de 55 anos de idade, etilista, com carcinoma espinocelular de borda lateral de língua e pescoço clinicamente negativo (T3, N0), julgue os itens a seguir.

- 64 O tratamento do pescoço está indicado porque a chance de o paciente apresentar metástase oculta regional é superior a 20%.
- 65 Um esvaziamento cervical seletivo (I, II, III) possui finalidade diagnóstica e também terapêutica.
- 66 O esvaziamento cervical dos níveis Ia e Ib é suficiente para o caso em questão.

Entre as laringectomias parciais, a supracricoide é bastante viável também em situações de resgate. Quanto a esse tipo de laringectomia, julgue os itens que se seguem.

- 67 É uma condição para sua indicação que as duas aritenoides sejam preservadas.
- 68 São pontos de reparo para a reconstrução a cartilagem cricoide e o osso hioide.
- 69 Invasão maciça do espaço pré-epiglótico não contraindica esse procedimento cirúrgico.

Com relação aos tumores de pele da região da cabeça e pescoço, julgue os próximos itens.

- 70** A característica clínica de um ceratoacantoma é de uma lesão que se desenvolve em um período entre 4 e 12 semanas e assume uma configuração elevada em forma de cúpula.
- 71** Carcinomas de células escamosas que têm origem em região de pele com exposição a queimaduras térmicas ou químicas geralmente são mais agressivos que os tumores induzidos pela exposição solar.
- 72** O carcinoma de células basais é o mais comum entre os tumores malignos, sendo a variante esclerosante o tipo histológico e clínico mais comum.

No que se refere ao manejo cirúrgico dos carcinomas epidermóides da base da língua, considerando a faringotomia transversa infra-hioide, julgue os itens a seguir.

- 73** É a via de acesso eletiva para lesões extensas da base da língua.
- 74** A abordagem da faringe deve ser feita pelo lado menos comprometido.
- 75** É recomendada para lesões com infiltração do espaço pré-epiglótico ou que se projetem anteriormente para o V lingual.

Julgue os itens que se seguem, relativos às reconstruções mandibulares.

- 76** A reconstrução microcirúrgica é especialmente indicada para reconstrução de segmento do ramo ascendente.
- 77** A fíbula vascularizada é ótima opção para reconstrução do arco central.
- 78** A calha de titânio com osso esponjoso é uma opção segura de reconstrução.
- 79** A crista ilíaca pode ser indicada nos defeitos de ramo horizontal e ascendente da mandíbula.
- 80** A radioterapia está contraindicada nos casos em que se utilize a fixação rígida (placas e parafusos) de titânio.

Em relação aos nódulos tireoidianos, julgue os itens subsequentes.

- 81** Os nódulos sólidos ao ultrassom, no polo superior, apresentam maior risco de malignidade.
- 82** O doppler não possui papel importante na avaliação desses nódulos.
- 83** A punção guiada por ultrassom não representa vantagem em relação à punção convencional.

Julgue os próximos itens, referentes a leucoplasias e líquenes da cavidade oral.

- 84** Se a lesão branca não é removida por simples raspagem, excluem-se processos pseudomembranosos.
- 85** A frequência real de transformação maligna, apesar de baixa, ocorre mais notadamente nas formas erosivas e atróficas do líquen.
- 86** Em cinco anos, a taxa de transformação maligna das leucoplasias é próxima de 1 para cada 3.

Com relação a estudos clínicos e pesquisa científica sobre níveis de evidência, julgue os itens que se seguem.

- 87** De acordo com a American Medical Association, uma informação médica pode ser classificada em três níveis de evidência (1-4), em função do tipo de estudo ou da origem da informação: nível 4 corresponde a evidência baseada em ensaios clínicos randomizados.
- 88** No nível 1, se confirmam pelo menos 5 estudos com p significativa ($< 0,05$) ou se obteve um estudo multicêntrico com p significativa ($< 0,05$).
- 89** O nível 1 de evidência corresponde a resultados de estudos randomizados ou meta-análise de estudos clínicos com boa metodologia.

Julgue os seguintes itens, a respeito do adenocarcinoma etmoidal.

- 90** Geralmente, ocorre em trabalhadores de minas de carvão.
- 91** Tem relação com a exposição crônica ao pó de madeira.
- 92** Estão mais predispostos os indivíduos orientais expostos a infecção pelo EBV (Epstein-Bar vírus).

Quanto aos tumores mesenquimais, julgue os próximos itens.

- 93** Rabdomyossarcoma é o tumor primário maligno de órbita mais comum em crianças.
- 94** Leiomyossarcoma é um tumor orbitário raro que se origina nos músculos de Muller.
- 95** Osteoma de órbita corresponde a cerca de 10% de todos os tumores orbitários.

A respeito do ligamento de Gruber, julgue os itens a seguir.

- 96** É um ligamento suspensor da tireoide.
- 97** Tem relação com o tendão interdigástrico.

Julgue os itens que se seguem, acerca da anatomia da laringe.

- 98** O ligamento vocal é uma área de resistência à disseminação tumoral.
- 99** O pericôndrio interno da cartilagem tireoide é uma área de resistência à disseminação tumoral.
- 100** O ligamento tiroepiglótico é muito resistente, impedindo os tumores de alcançarem o espaço pré-pré-epiglótico.

PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, no local apropriado, pois **não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos**.
- Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
- Na **folha de texto definitivo**, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois **não será avaliado** texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Redija um texto dissertativo que apresente uma proposta de tratamento para um paciente com quadro de fístula quilosa no segundo dia de pós-operatório de um esvaziamento cervical radical.

Ao elaborar seu texto, descreva e justifique, necessariamente, as seguintes opções de tratamento para o quadro descrito:

- ▶ tratamento conservador;
 - ▶ tratamento adjuvante;
 - ▶ tratamento cirúrgico.
-

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	