

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

Fundação Universidade de Brasília

**RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM
ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE 2013**


CADERNO DE PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1** Ao receber este caderno de prova, confira inicialmente se os seus dados pessoais, transcritos acima, estão corretos e coincidem com os que estão registrados em sua folha de respostas da prova objetiva, no seu caderno de textos definitivos da prova discursiva de respostas curtas e em cada página numerada deste caderno. Confira também o nome do programa de residência para o qual você concorre, bem como a área, conforme seu caso. Em seguida, verifique se ele contém a quantidade de itens indicada em sua folha de respostas da prova objetiva, correspondentes à prova objetiva, e dez questões correspondentes à prova discursiva de respostas curtas, acompanhadas de espaços para rascunho. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência quanto aos seus dados pessoais ou quanto ao nome do programa de residência para o qual você concorre, bem como a área, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- 2** Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da sua folha de respostas da prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

Conforme previsto em edital, o descumprimento dessa instrução implicará a anulação das suas provas e a sua eliminação do processo seletivo.
- 3** Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização de fiscal de sala.
- 4** Não serão distribuídas folhas suplementares para rascunho nem para texto definitivo da prova discursiva de respostas curtas.
- 5** Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas —, ao preenchimento da folha de respostas da prova objetiva e à transcrição dos textos para o caderno de textos definitivos da prova discursiva de respostas curtas.
- 6** Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas da prova objetiva e o seu caderno de textos definitivos da prova discursiva de respostas curtas e deixe o local de provas.
- 7** Nenhuma folha deste caderno pode ser destacada.
- 8** A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na folha de respostas da prova objetiva ou no caderno de textos definitivos da prova discursiva de respostas curtas poderá implicar a anulação das suas provas.

PROCESSO SELETIVO



GDF
Secretaria de
Estado de Saúde



Universidade de Brasília

cespeUnB
Centro de Seleção e de Promoção de Eventos

OBSERVAÇÕES

Não serão conhecidos recursos em desacordo com o estabelecido em edital. É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

0(XX) 61 3448-0100
www.cespe.unb.br
sac@cespe.unb.br

PROVA OBJETIVA

De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na **folha de respostas** da prova objetiva, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas** da prova objetiva, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.

A anticoncepção de emergência (AE) é uma proposta que veio contribuir para a garantia do exercício pleno dos direitos das mulheres na tomada de decisões sobre sua reprodução. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.

- 1 No caso de mulheres soropositivas que estão em tratamento com antirretrovirais, poderá haver comprometimento da eficácia do método de AE, caso seja utilizado o etinil-estradiol em decorrência de interação farmacológica entre esses medicamentos.
- 2 O método de administração de pílulas anticoncepcionais combinadas, compostas por estrogênio e progestágeno sintéticos, é conhecido por regime de Yuzpe.
- 3 A AE é o método mais indicado nas situações de esquecimento prolongado do anticoncepcivo oral, cálculo incorreto do período fértil, erro no período de abstinência ou interpretação equivocada da temperatura basal.
- 4 O prazo para início da AE é de, obrigatoriamente, até 72 horas após a relação sexual.

Um homem de quarenta e sete anos de idade, 70 kg, trabalhador de uma indústria, sofreu um acidente ao tentar consertar um tambor de óleo que explodiu. A vítima conseguiu sair do local sem inalar fumaça e foi encaminhada a um hospital de atendimento especializado. Ao ser examinado, apresentava 50% de queimaduras de espessura parcial e total nas extremidades inferiores e superiores, nas mãos, nos braços e no tronco. A área atingida do tronco e dos membros inferiores foi apenas anterior, nas demais áreas, houve comprometimento circular. O paciente estava consciente, queixando-se de dores intensas, apresentando edema generalizado, pulso filiforme nas extremidades inferiores e murmúrio vesicular fisiológico à ausculta pulmonar. Os sinais vitais obtidos foram: 125 bpm, 35 mmm, 35,8 °C e 100 mmHg x 50 mmHg. Não foram palpados pulsos em membros superiores (apenas com *doppler*). Não havia expectoração de partículas de carbono no escarro e nem fuligem em narinas ou em boca. O débito urinário por cateter vesical de longa permanência estava entre 20 a 25 mL/hora. Os exames gasométricos encontravam-se normais e o hematócrito elevado. O paciente recebeu infusão venosa de Ringer Lactato por cateter central. A equipe de enfermeiros do local aplicou o modelo de Roy e a classificação dos diagnósticos de enfermagem da NANDA-I.

Considerando esse caso clínico, julgue os itens subsequentes, a respeito da assistência de enfermagem.

- 5 Existem evidências clínicas que indicam a presença do diagnóstico de enfermagem volume de líquidos deficiente.
- 6 Para a reposição de líquidos, consideram-se as respostas individuais do paciente e os seus parâmetros clínicos, e os ajustes de volume obedecem a valores do hematócrito, da hemoglobina e dos níveis séricos de sódio.

- 7 O cateter vesical de longa permanência, nesse caso, além de propiciar o monitoramento mais exato do débito urinário, permite avaliar também como está a função renal. No caso em questão, o débito urinário está adequado.
- 8 Pela descrição do tipo de lesão ocorrida, houve inalação abaixo da glote, resultando nos indícios evidenciados no exame físico respiratório.
- 9 Os pressupostos do modelo utilizado fundamentam-se na combinação das teorias de sistemas e adaptação, permitindo considerar o paciente um ser com *inputs* (estímulo da queimadura, por exemplo) e *outputs* (respostas ou comportamentos diante do estímulo).
- 10 No planejamento da assistência ao paciente, o equilíbrio hídrico e a recuperação da perfusão tissular periférica são resultados esperados prioritariamente.
- 11 A investigação da dor e a administração de analgésicos prescritos são intervenções apropriadas, assim como a orientação precisa acerca dos procedimentos a serem realizados e a tranquilização do paciente quanto aos cuidados instituídos.

Acerca da assistência de enfermagem ao paciente com Síndrome de Guillain-Barré, julgue os itens a seguir.

- 12 O cuidado de enfermagem deve priorizar a atenção à fadiga, pois essa síndrome caracteriza-se por um distúrbio autoimune que afeta a junção mioneural, provocando fraqueza em vários músculos voluntários.
- 13 Os exames laboratoriais séricos, que evidenciam diminuição de proteínas no líquido cefalorraquidiano, são fundamentais para o diagnóstico clínico da doença.
- 14 As prescrições de enfermagem devem contemplar a melhora da mobilidade física, a partir de exercícios passivos e de amplitude de movimentos, posicionamento funcional de membros paralisados e mudanças de decúbito.

A leishmaniose é considerada uma das seis endemias mais importantes no mundo. Sua associação a indivíduos portadores do Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV) é recente, mas tem representado um dos problemas mais importantes da atualidade. A respeito da coinfeção *Leishmania*-HIV, julgue os próximos itens.

- 15 As manifestações clínicas mais comuns nos pacientes com leishmaniose visceral e HIV são hepato-esplenomegalia, febre e pancitopenia.
- 16 A recomendação de realização de sorologia para HIV restringe-se aos pacientes com leishmaniose visceral, sendo facultativo esse exame para crianças com leishmaniose tegumentar cutânea.
- 17 A reação intradérmica de Montenegro é o método mais indicado para o diagnóstico de leishmaniose visceral em pacientes com AIDS.
- 18 O tratamento da coinfeção HIV-*Leishmania* é exclusivo para o caso, uma vez que o tratamento convencional com desoxicolato de anfotericina B, utilizado em pacientes imunocompetentes, não é suficiente para obter bons resultados nas formas visceral e tegumentar da doença.

Uma criança de um mês e dez dias de idade, atendida no serviço de crescimento e desenvolvimento de uma unidade básica de saúde, apresenta diarreia há três dias. Segundo a mãe, a criança é alimentada exclusivamente com leite materno e há dois dias passou a eliminar fezes líquidas, sem outras alterações, mas, progressivamente, houve piora da diarreia e diminuição da sucção no peito. No exame físico, foram detectados olhos fundos, sinal de irritação, ao ser movimentada, e regressão, após dois segundos, na avaliação do sinal da prega do abdome. Não foram observadas dificuldades respiratórias. A mãe relata ausência de febre, vômitos e sangue nas fezes.

Considerando o caso clínico apresentado acima, julgue os itens subsequentes.

- 19 A criança deve receber a classificação verde, sem desidratação, sendo indicado tratamento domiciliar. A mãe deve ser orientada a administrar soro oral, a manter a amamentação e a retornar imediatamente, em caso de agravamento do quadro.
- 20 O exame da prega cutânea, realizado com técnica correta, exigiu que o enfermeiro colocasse a criança em posição supina, com os braços sobre a cabeça e as pernas estendidas, sendo feita a prega cutânea com a ponta dos dedos, polegar e indicador, na região acima do umbigo.
- 21 Para o tratamento da diarreia, é indicada a administração de uma dose de 1 mg de vitamina K, por via intramuscular, além da primeira dose de antibiótico parenteral.
- 22 A partir dos dados do exame físico, pode-se dizer que a criança apresentou sinal da prega do abdome com retorno muito lento, além de permanecer inquieto ou irritado.

Acerca do controle de infecção, julgue os itens que se seguem.

- 23 As mãos que mostram sujidade visível ou que estejam visivelmente contaminadas por sangue, fluidos ou excreções corporais devem ser friccionadas com solução alcoólica e dispensadas da lavagem com água e sabão.
- 24 Substâncias anti-sépticas, usadas em pele e mucosa, devem ter ação letal ou inibitória da reprodução microbiana, ter baixa causticidade e ser hipoalergênicas.
- 25 A polivinilpirrolidona iodo (PVPI) é um composto utilizado no ambiente hospitalar cujas formulações disponíveis (degermante, aquoso ou alcoólico) são tamponadas para o pH da pele.

O Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado a maior política inclusiva, por se destinar ao atendimento de mais de 190 milhões de brasileiros. Com relação à organização do SUS, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação interfederativa, julgue os itens seguintes.

- 26 Rede de atenção à saúde consiste no conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- 27 No planejamento da saúde devem ser considerados, exclusivamente, os serviços e as ações prestadas pela iniciativa pública, que deverão compor os mapas da saúde regional, estadual e nacional.
- 28 A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na rede de atenção à saúde, mediante referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado nas Comissões Intergestores.
- 29 Comissões Intergestores (CIT) são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS. No âmbito regional, a CIT está vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais.

Um enfermeiro que compõe a equipe de saúde de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) prestou cuidados de emergência a uma criança de cinco anos de idade que ingeriu acidentalmente um medicamento. Nessa situação é indicada a lavagem gástrica.

Acerca desse procedimento, julgue os itens a seguir.

- 30 A lavagem gástrica pode ser realizada por sonda oro ou nasogástrica.
- 31 Em crianças, uma lavagem gástrica bem sucedida necessita de uma média de 6 a 8 litros de soro fisiológico ou água.

Com relação ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da rede de atenção à saúde mental, julgue os itens que se seguem.

- 32 O objetivo dos CAPS é oferecer atendimento à população de sua área de abrangência, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários.
- 33 Os CAPS devem oferecer acolhimento diurno e, quando possível e necessário, noturno.

Julgue os itens subsequentes que versam acerca da Política de Humanização da Atenção e da Gestão (PNH).

- 34 Um parâmetro da PNH para implementação de ações de urgência e emergência nos prontos-socorros, pronto atendimentos, assistência pré-hospitalar e outros, se refere à demanda acolhida e atendida de acordo com a avaliação de risco, garantido o acesso referenciado aos demais níveis de assistência.
- 35 O Método Canguru é um tipo de assistência neonatal que implica em contato pele a pele o mais cedo possível entre os pais e o recém-nascido, de forma crescente e pelo tempo que ambos entenderem ser prazeroso e suficiente, promovendo autonomia e competência parental a partir do suporte da equipe, da interação familiar e de redes sociais.

Julgue os itens seguintes quanto à atenção à saúde do recém-nascido.

- 36 Na avaliação da vitalidade ao nascer, a coloração da pele e das mucosas do recém-nascido é examinada para decidir procedimentos na sala de parto.
- 37 A punção na face anterior do calcanhar é um procedimento indicado para a realização de exame de glicemia.

A enfermagem perioperatória inclui uma ampla variedade de funções de enfermagem associadas à experiência cirúrgica do paciente nas fases pré-operatória, transoperatória e pós-operatória. Com relação a esse assunto, julgue os itens que se seguem.

- 38 A remoção de pelos no pré-operatório deve ser realizada em sala operatória, imediatamente antes da incisão cirúrgica, utilizando-se lâmina de bisturi.
- 39 A anestesia epidural é um bloqueio extenso da condução nervosa produzido quando um anestésico local é introduzido dentro do espaço subaracnoide no nível lombar, usualmente entre L4 e L5.
- 40 Em situação de choque hipovolêmico, o paciente deve ser posicionado em decúbito lateral, com a cabeça hiperdistendida e as pernas devem estar retas.

Acerca dos cuidados a pacientes idosos em situações clínico-cirúrgicas, julgue os próximos itens.

- 41 Pacientes idosos que foram submetidos à prostatectomia transuretral apresentam risco potencial para ocorrência de trombose venosa profunda.
- 42 A metformina é um medicamento injetável para o manejo da insulina no tratamento do diabetes tipo 1 em pacientes idosos.
- 43 A perda de memória é um sinal inicial de delírio em idosos, sendo a perda da memória recente seguida por declínio progressivo e desorientação temporária para lugar, visual e espacial e pessoal.

Com relação à saúde da mulher no ciclo gravídico puerperal, julgue os itens seguintes.

- 44 Conceitua-se como abortamento a interrupção da gravidez ocorrida antes da 32ª semana de gestação, podendo ser classificado de várias formas. No abortamento habitual ocorre a morte do embrião ou feto e o mesmo permanece na cavidade uterina, sem ser eliminado.
- 45 A rotura prematura de membranas ovulares (RPM) é definida como a separação da placenta da parede uterina antes do parto, sendo que em grau 2 ocorre sangramento genital importante com hipertonia uterina, hipotensão arterial materna e óbito fetal.

Acerca dos cuidados aos pacientes adultos com hipertensão arterial sistêmica, julgue os itens subsequentes.

- 46 Para uma medida adequada da pressão arterial deve-se utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 2 a 3 cm acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. A largura da bolsa de borracha deve corresponder a 40% da circunferência do braço e o seu comprimento a um mínimo de 80% dessa circunferência.
- 47 Valores de pressão arterial sistólica entre 140 mmHg e 159 mmHg e pressão arterial diastólica entre 90mmHg e 99 mmHg é classificada como pré-hipertensão.
- 48 É de competência do profissional enfermeiro da equipe de saúde da família solicitar, durante a consulta de enfermagem, os exames mínimos estabelecidos nos consensos e definidos como possíveis e necessários pelo médico da equipe.

Com relação às boas práticas dos serviços de saúde voltadas ao processamento de produtos para saúde, julgue os itens que se seguem.

- 49 O processamento de produtos deve seguir um fluxo direcionado sempre da área suja para a área limpa.
- 50 O trabalhador de central de material e esterilização (CME) deve utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) de acordo com a sala/área. Na sala de recepção e limpeza, o protetor facial pode substituir o uso de máscara e óculos.
-

PROVA DISCURSIVA DE RESPOSTAS CURTAS

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso queira, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos para as respectivas folhas do **CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA DE RESPOSTAS CURTAS**, nos locais apropriados, pois **não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos**.
- Em cada questão, qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será também desconsiderado o texto que não for escrito no devido local da folha de texto definitivo correspondente.
- No **caderno de textos definitivos**, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois **não será avaliada** a prova que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
- Na avaliação de cada questão, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até **5,00 pontos**, dos quais, até **4,50 pontos** serão atribuídos ao domínio do tema e até **0,50 ponto** será atribuído à capacidade de expressão na modalidade escrita e ao uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa.

Questão	1
----------------	----------

A execução de ações de controle da tuberculose é fundamental na condução das atividades de saúde pública no Brasil, sendo a prova tuberculínica um importante método auxiliar na identificação de casos de tuberculose.

Com relação à prova tuberculínica, redija um texto em que se defina o fenômeno booster [valor: 2,50 pontos] e se descrevam os critérios adotados na definição desse fenômeno no Brasil [valor: 2,00 pontos].

Rascunho

1	
2	
3	
4	
5	

Texto para as questões 2 e 3

Homem de setenta e cinco anos de idade encontra-se consciente e cooperativo em uma unidade de internação após ser submetido a cirurgia abdominal, realizada para o tratamento de obstrução causada por tumor maligno. Há registro de que houve perda ponderal desse paciente desde o início da doença. O último exame físico realizado evidenciou mucosas pálidas, fragilidade capilar, turgor diminuído, altura de 1,70 m e peso de 47 kg. O paciente apresenta, também, anorexia, fadiga, diminuição de massa, força e tônus muscular, tosse ineficaz, dispneia em repouso e ruídos adventícios à ausculta pulmonar. Os exames gasométricos evidenciaram hipoxia e hipercapnia. Foi solicitada a instalação de uma sonda alimentar duodenal devido ao fato de o paciente estar apresentando dificuldades na aceitação de alimentos.

Questão	2
----------------	----------

Com relação ao caso clínico apresentado e com base na classificação dos diagnósticos de enfermagem da NANDA-I, cite dois diagnósticos de enfermagem [valor: 1,50 ponto] e seus respectivos fatores relacionados [valor: 1,50 ponto], enumerando, para cada diagnóstico, três características definidoras ou evidências clínicas [valor: 1,50 ponto].

Rascunho

1	
2	
3	
4	
5	

Questão 3

Com relação à solicitação de instalação de sonda alimentar duodenal no caso clínico hipotético apresentado, responda aos seguintes questionamentos.

- Quais características de diâmetro, flexibilidade e tipo de material da sonda que deve ser utilizada nessa situação? [valor: 1,50 ponto]
- Qual o modo de inserção nasal da sonda? [valor: 1,50 ponto]
- Como confirmar o correto posicionamento da sonda? [valor: 1,50 ponto]

Rascunho

1	
2	
3	
4	
5	

Questão 4

As lesões de pele tornaram-se uma das maiores preocupações dos profissionais de saúde nos últimos tempos, em decorrência do impacto socioeconômico a elas relacionado. O enfermeiro é um membro fundamental da equipe de saúde que deve estar preparado na identificação, no diagnóstico, na prevenção e no tratamento dessas lesões.

Com relação a esse tema e conforme a última classificação NUAP (*National Pressure Ulcer Advisory Panel*), redija um texto acerca da diferenciação entre dermatites associadas a incontinência (DAI) e úlceras por pressão no estágio I. Em seu texto aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

- etiologia; [valor: 1,50 ponto]
- fatores associados; [valor: 1,50 ponto]
- localização. [valor: 1,50 ponto]

Rascunho

1	
2	
3	
4	
5	

Questão 5

Um jovem de dezoito anos de idade, com diabetes tipo 1, encontra-se em uma unidade básica de saúde e deve ser orientado quanto aos cuidados a serem tomados diante de sintomas como gripe, resfriado ou diarreia, na prevenção da cetoacidose.

Considerando a situação hipotética acima, cite os cuidados necessários a serem orientados ao jovem relativos ao controle da temperatura [valor: 1,00 ponto], ao tratamento e alimentação [valor: 1,00 ponto], ao controle dos níveis glicêmicos [valor: 1,50 ponto] e a potenciais complicações [valor: 1,00 ponto].

Rascunho

1	
2	
3	
4	
5	

Questão 6

Segurança é um princípio fundamental na administração de medicamentos. As maneiras como os medicamentos são administrados modificam o efeito deles no organismo. Por exemplo, a via intravenosa é utilizada quando se deseja o início de ação mais rápida da droga.

Considere a situação em que foram prescritos a um paciente 1.000 mL de soro glicosado a 5%, que deverão ser administrados no intervalo de 8 horas, com um equipo calibrado de tal maneira que 15 gotas do soro equivalem a 1 mL.

Com base nas informações e na situação hipotética apresentada acima, faça o que se pede a seguir.

- Determine a quantidade de soro que o paciente deverá receber em mililitros por hora. [valor: 1,50 ponto]
- Determine a quantidade de soro que o paciente deverá receber em mililitros por minuto. [valor: 1,50 ponto]
- Determine o ritmo do fluxo do soro em gotas por minuto. [valor: 1,50 ponto]

Rascunho

1	
2	
3	
4	
5	

Questão 7

A hepatite B, também denominada soro-homóloga, é uma doença infecciosa, causada pelo vírus B (VHB). Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza gratuitamente, em qualquer posto de saúde, a vacina contra a hepatite B.

Com relação à hepatite B, faça o que se pede a seguir.

- Cite três formas de transmissão do VHB. [valor: 1,50 ponto]
- Cite três grupos de pessoas com maior vulnerabilidade a adquirir a doença, independentemente da faixa etária. [valor: 1,00 ponto]
- Descreva o esquema de imunização preconizado pelo Ministério da Saúde, apresentando o quantitativo de doses, os intervalos entre as doses, os grupos-alvo e as faixas etárias recomendadas. [valor: 2,00 pontos]

Rascunho

1	
2	
3	
4	
5	

Questão 8

Segundo tipo mais frequente no mundo, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. Se diagnosticado e tratado oportunamente, o prognóstico é relativamente bom. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados.

INCA.

Considerando o fragmento do texto apresentado apenas como motivador, faça o que se pede a seguir.

- Descreva as estratégias atualmente empregadas para a detecção precoce do câncer de mama; [valor: 2,00 pontos]
- Indique o público-alvo de cada estratégia; [valor: 1,50 ponto]
- Descreva os exames e recursos utilizados em cada estratégia. [valor: 1,00 ponto]

Rascunho

1	
2	
3	
4	
5	

Questão 9

As infecções primárias de corrente sanguínea (IPCS) estão entre as mais comumente relacionadas à assistência à saúde. Estima-se que cerca de 60% das bacteremias nosocomiais sejam associadas a algum dispositivo intravascular. Recomendações de frequência de troca de cateteres e dispositivos utilizados devem ser seguidas com vistas à prevenção das IPCS.

A respeito do tema abordado no texto acima, responda aos questionamentos a seguir.

- Qual a frequência de troca recomendável dos seguintes cateteres e dispositivos: cateter periférico de poliuretano; equipo de infusão intermitente; cobertura de membrana transparente semipermeável (MTS)? **[valor: 3,75 pontos]**
- Há exceções para a não obediência às recomendações de troca dos referidos cateteres e dispositivos? Justifique sua resposta. **[valor: 0,75 ponto]**

Rascunho

1	
2	
3	
4	
5	

Questão 10

Um paciente masculino, com 56 anos de idade, acabou de retornar da sala de cirurgia após submeter-se à toracotomia. À inspeção geral, apresenta um tubo endotraqueal, dois drenos torácicos, duas linhas intravenosas, um monitor cardíaco e uma sonda urinária de demora em posição. Após avaliação feita pelo enfermeiro, foi determinado um plano de cuidado, sendo estabelecido um dos diagnósticos de enfermagem referentes à eliminação traqueobrônquica ineficaz relacionada com o comprometimento pulmonar, anestesia e dor. A meta estabelecida é a melhoria da depuração da via aérea e obtenção de uma via aérea permeável.

Considerando a situação hipotética acima, proponha uma prescrição de enfermagem que permita atingir a meta estabelecida **[valor: 2,50 pontos]** e apresente a justificativa para essa proposta. **[valor: 2,00 pontos]**

Rascunho

1	
2	
3	
4	
5	