

Aplicação: 2015

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA**



PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA INGRESSO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE E MULTIPROFISSIONAL

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1** Ao receber este caderno de prova, confira inicialmente se os seus dados pessoais e os dados do programa em que você se inscreveu, transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua folha de respostas. Confira, também, o seu nome e os dados do programa em que você se inscreveu em cada página numerada do seu caderno de prova. Em seguida, verifique se ele contém a quantidade de itens indicada em sua folha de respostas, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente discordância quanto aos seus dados pessoais, ou ao programa em que você se inscreveu, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- 2** Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da sua folha de respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

Conforme previsto em edital, o descumprimento dessa instrução implicará a anulação da sua prova e a sua eliminação do processo seletivo.

- 3** Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização de fiscal de sala.
- 4** Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer da prova — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 5** Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de prova.
- 6** A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

CADERNO DE PROVA OBJETIVA



Universidade de Brasília



OBSERVAÇÕES

Não serão conhecidos recursos em desacordo com o estabelecido em edital. É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

0(XX) 61 3448-0100
www.cespe.unb.br
sac@cespe.unb.br

De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.

PROVA OBJETIVA

Acerca do traçado de um eletrocardiograma normal, julgue os itens a seguir.

- 1 A onda P corresponde ao estímulo elétrico que, ao passar pelos ventrículos, provoca contrações destes.
- 2 O intervalo PR é medido do início da onda P até o fim da onda R, durando, tipicamente, entre 0,12 e 0,20 segundo.
- 3 O segmento ST corresponde ao tempo entre o fim da despolarização ventricular e o começo da repolarização ventricular, devendo ser visualizado na linha isoeétrica.
- 4 Se a distância entre duas ondas R consecutivas for de 15 quadrados menores e cada quadrado menor corresponder a 0,04 s, a frequência cardíaca será de 100 bpm.
- 5 O eixo vertical representa o volume de ejeção do ventrículo direito.

No que se refere às arritmias supraventriculares e de condução, julgue os itens seguintes.

- 6 No aumento constante do bloqueio atrioventricular de primeiro grau, verifica-se um intervalo PR, excedendo 0,20 segundo, e a manutenção da relação P:QRS em 1:1, o que indica retardo do estímulo elétrico.
- 7 A fibrilação atrial é caracterizada por ondas P não identificáveis e por frequência atrial que pode alcançar 600 bpm.

A respeito dos conhecimentos da enfermagem oncológica, julgue os itens subsecutivos.

- 8 As mais recentes diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil não recomendam a realização de mamografia em mulheres com menos de cinquenta anos de idade para rastreamento de câncer de mama.
- 9 A investigação clínica para diagnóstico de melanoma em um nevo passa pela avaliação dos seguintes critérios de aparência: formato, bordas, distribuição da pigmentação e diâmetro.
- 10 De acordo com as diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil, enfermeiros não devem realizar o exame das mamas de mulheres, cabendo apenas ao médico realizar tal procedimento durante o exame físico geral.

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária n.º 15, de 15/3/2012, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências, julgue os itens subsequentes.

- 11 Na esterilização de produtos para saúde, é vedado o uso de estufas.
- 12 Um produto para saúde que entra em contato com a pele não íntegra é definido como um produto não crítico.
- 13 O armazenamento de produtos para saúde só pode ser realizado em área de circulação se isto ocorrer de forma provisória e com autorização e controle do responsável pelo centro de material e esterilização.
- 14 O centro de material e esterilização (CME) classe I deve possuir, no mínimo, barreira técnica entre o setor sujo e os setores limpos, enquanto no CME classe II a separação entre o setor sujo e os setores limpos deverá ser física.

Consideradas as diretrizes nacionais para a prevenção e controle de epidemias de dengue do Ministério da Saúde, julgue os itens que se seguem.

- 15 A definição de caso suspeito de dengue é a de paciente com febre de duração máxima de três dias; com pelo menos dois dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia, artralgia, dor retro-orbitária, poliúria e exantema; e que tenha estado em áreas de transmissão de dengue ou com presença de *Aedes aegypti* nos últimos sete dias.
- 16 No período não epidêmico, as diretrizes devem servir à organização e ao desenvolvimento de rotinas de prevenção e controle da dengue.
- 17 A pessoa com suspeita de dengue deve receber soro de hidratação enquanto espera por atendimento apenas se apresentar sinais de alarme ou sinais de choque.

A respeito da terminologia e de produtos técnicos de enfermagem, julgue os itens a seguir.

- 18 Degermação é a remoção de detritos e impurezas sobre a pele, por meio de detergentes sintéticos e sabões, que removem mecanicamente a flora transitória e residente.
- 19 O álcool e a cloro-hexidina são os agentes germicidas que satisfazem as exigências para a aplicação em tecidos vivos, e ambos não possuem ação residual.
- 20 Antissepsia é a destruição de microrganismos existentes nas camadas superficiais ou profundas da pele mediante aplicação de um agente germicida de baixa causticidade.

Acerca dos conhecimentos dos enfermeiros no processo transfusional de hemocomponentes, julgue os itens seguintes.

- 21 Nenhum medicamento deve ser adicionado à bolsa de hemocomponentes, nem ser infundido simultaneamente no mesmo acesso venoso, devido a risco de hemólise.
- 22 O tempo de administração de qualquer hemocomponente não deve exceder o prazo de duas horas, sendo o tempo médio adequado para transfusão de hemácias em pacientes estáveis de noventa minutos.
- 23 Antes de iniciar o processo, é importante realizar uma inspeção visual do equipamento de transfusão, visto que a presença de alguns elementos, como coágulos na bolsa de hemocomponentes, pode ser indício de contaminação bacteriana.

No que se refere aos conhecimentos específicos de enfermagem das drogas vasoativas, julgue os itens subsecutivos.

- 24 A dobutamina é a droga utilizada para melhorar a função ventricular e o desempenho cardíaco em pacientes com choque cardiogênico, insuficiência cardíaca congestiva, sem interferir no aumento de oxigênio pelo miocárdio.
- 25 As drogas vasoativas são comumente utilizadas em pacientes graves, em estado de choque circulatório, com vistas ao equilíbrio da oxigenação.
- 26 A noradrenalina não é indicada em manobras de reanimação cardiopulmonar, mas é a principal droga de eleição no choque, cuja finalidade é elevar a pressão arterial em pacientes hipotensos, que não respondem à ressuscitação volêmica.

De acordo com o calendário de vacinação do Distrito Federal, julgue os itens subsequentes.

- 27 Deve-se administrar especificamente a primeira dose da vacina tríplice viral (SCR) aos nove meses de idade e a 2.^a dose aos quinze meses de idade.
- 28 A vacina contra poliomielite deve ser administrada conforme o esquema sequencial VIP-VOP: a 1.^a e a 2.^a doses são administradas com VIP no 2.^o e no 4.^o mês de idade, na 3.^a dose, aos seis meses de idade com VOP; e os reforços devem ocorrer no 15.^o mês de idade e aos seis anos de idade.

Acerca da diabetes melito, julgue os próximos itens.

- 29 A metformina é o medicamento de escolha para a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2, porque não leva à hipoglicemia, sendo rara a cetoacidose.
- 30 De acordo com os valores da glicemia, pode ser administrada insulina NPH ou regular, pelas vias SC, IM ou EV, conforme recomendação médica.
- 31 O termo diabetes tipo 2 é utilizado para designar deficiência relativa de insulina; a administração desse medicamento nesses casos, quando efetuada, não visa evitar a cetoacidose, mas o controle da hiperglicemia.

Conforme avaliação das medidas de precaução específicas, julgue os itens que se seguem.

- 32 Em pacientes com coqueluche, rubéola e difteria, deve-se adotar precauções para gotículas, devendo o paciente usar máscara cirúrgica durante toda a sua permanência fora do quarto, não podendo ficar internado com outros pacientes com a mesma patologia.
- 33 Pacientes com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento podem dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose, desde que adotadas precauções para aerossóis.
- 34 Em pacientes com infecção ou colonização por microrganismos multirresistentes, com varicela ou imunodeprimidos, deve-se adotar precaução de contato, com a correta higienização das mãos, avental, luvas e quarto privativo quando houver disponibilidade.

Com relação ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica, julgue os itens seguintes.

- 35 É recomendado o uso de aspirina profilática em indivíduos com hipertensão arterial sistêmica e risco cardiovascular alto, após controle ideal ou próximo do alvo da pressão arterial (abaixo de 140 mmHg × 90 mmHg).
- 36 Independentemente do valor do índice de massa corporal (IMC), a distribuição de gordura com localização predominantemente no abdome está frequentemente associada com resistência à insulina e elevação da pressão arterial.

As reações adversas decorrentes da quimioterapia relacionam-se à não especificidade, ou seja, essas drogas não afetam exclusivamente as células tumorais. Com relação a esse assunto, julgue os itens de 37 a 40.

- 37 Bleomicina, Vincristina e Asparaginase são exemplos de quimioterápicos que não afetam a função medular, uma vez que a maioria dessas drogas são mielossupressoras em mielotóxicas.

- 38 Em casos de toxicidade gastrointestinal, náuseas e vômitos têm a mesma origem fisiopatológica e devem ser avaliados.

- 39 Hipermagnesemia, hipernatremia, hipocalemia e hiporuricemia são alterações metabólicas comuns decorrentes do uso de agentes antineoplásicos.

- 40 A mucosite consiste na resposta inflamatória das membranas mucosas à ação das drogas antitumorais, denominando-se estomatite, esofagite e proctite, quando acomete, respectivamente, a cavidade oral, o esôfago e a região do reto.

Com relação ao diagnóstico e tratamento da tuberculose, julgue os itens que se seguem.

- 41 A capacidade de eliminação virtual de todos os bacilos de uma lesão no tratamento da tuberculose é denominada atividade esterilizante, o que não impede a recidiva da tuberculose, mesmo sendo realizada de maneira adequada.

- 42 O tratamento das formas extrapulmonares e dos pacientes coinfectados com HIV, independentemente da fase de evolução da infecção viral, terá a duração de seis meses, exceto o da tuberculose meningoencefálica.

- 43 A confiabilidade dos resultados da baciloscopia, da cultura para micobactéria com identificação de espécie e do teste rápido molecular para tuberculose depende da quantidade e da qualidade da amostra de escarro.

Acerca dos cateteres para administração dos agentes antineoplásicos, julgue os itens subsequentes.

- 44 A heparina deve ser utilizada após cada uso de antineoplásicos; mensalmente, nos casos de *ports* venosos; e semanalmente, nos arteriais.

- 45 Além da administração de quimioterápicos antineoplásicos, o *port* venoso destina-se à infusão de soro, antibióticos, sangue e seus componentes, nutrição parenteral, contraste ou qualquer outro fluido endovenoso, e também pode ser usado para coleta de amostra sanguínea para exames laboratoriais.

- 46 Após o uso do cateter intraperitoneal, existe a necessidade de heparinização periódica a cada quinze dias, na concentração de 5.000 unidades/mL do anticoagulante.

- 47 Os cateteres periféricos utilizados nos acessos vasculares possuem limitações para os fármacos vesicantes sob infusão contínua prolongada, como má qualidade da rede venosa periférica e problemas emocionais ligados à punção, como o pânico da picada.

- 48 A agulha utilizada para a punção do cateter central de implantação periférica deve ser do tipo Huber Point.

Acerca da hipodermoclise, referenciada também como via subcutânea para administração de soluções e medicamentos, julgue os itens subsequentes.

- 49 Entre os efeitos adversos mais comuns que ocorrem na referida via, observam-se edema subcutâneo, grande quantidade de casos de infecção local, hematomas, necroses e equimoses.

- 50 A hipodermoclise é uma via de acesso eficiente, de baixo custo para pacientes que se encontram em cuidados paliativos, além de proporcionar maior conforto sem risco de obstrução por coágulo.



 **cespe**

 **Cebraspe**

Centro Brasileiro de Pesquisa em
Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos