

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Conforme a legislação que regula a segurança e a saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde, define-se risco biológico como a possibilidade, no ambiente de trabalho, de ocorrência de efeitos adversos à saúde humana decorrentes de

- A exposição ocupacional a microrganismos patogênicos.
- B contato frequente com agentes biológicos.
- C contato com microrganismos patogênicos.
- D exposição ocupacional a agentes biológicos.
- E acidente envolvendo microrganismos patogênicos.

QUESTÃO 22

Em uma unidade de saúde, foram prescritas 60 unidades internacionais (UI) de insulina NPH, a serem administradas por via subcutânea, a um paciente diabético. Ao preparar a medicação, no entanto, o profissional de enfermagem notou que não havia seringas próprias para UI, estando disponíveis apenas seringas de 3 mL. Nesse caso, para atender à prescrição, o profissional deve aspirar nessa seringa o volume de insulina NPH correspondente a

- A 0,60 mL.
- B 1,20 mL.
- C 0,06 mL.
- D 0,12 mL.
- E 0,20 mL.

QUESTÃO 23

Sabendo-se que as infecções do sítio cirúrgico (ISC) estão relacionadas a procedimentos cirúrgicos realizados em pacientes internados ou ambulatoriais, com ou sem colocação de implantes, é correto afirmar que as infecções do sítio cirúrgico incisionais superficiais ocorrem

- A até trinta dias após a cirurgia, ou até noventa dias no caso de implantes, e acometem qualquer órgão ou cavidade que tenham sido abertos ou manipulados durante a cirurgia.
- B até sessenta dias após o procedimento cirúrgico e acometem tecidos moles profundos à incisão.
- C até sessenta dias após a cirurgia e acometem apenas pele e tecido subcutâneo.
- D até trinta dias após o procedimento cirúrgico e acometem apenas pele e tecido subcutâneo.
- E até trinta dias após a cirurgia, ou até noventa dias no caso de implantes, e acometem tecidos moles profundos à incisão.

QUESTÃO 24

São denominados lesões por pressão os danos localizados na pele e(ou) em tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea, causados por pressão intensa e(ou) prolongada, em combinação com o cisalhamento do tecido. Classifica-se como lesão de estágio 3 a lesão por pressão caracterizada por

- A pele intacta ou não, com presença de bolha com exsudato sanguinolento.
- B perda da pele em sua espessura total e perda tissular.
- C pele íntegra com área localizada de eritema que não embranquece.
- D perda da pele em sua espessura total, com visibilidade do tecido adiposo.
- E perda da pele em sua espessura parcial, com exposição da derme.

QUESTÃO 25

Na pele, a camada mais externa, denominada epiderme, é constituída de tecido

- A nervoso.
- B cartilagenoso.
- C adiposo.
- D conjuntivo.
- E epitelial.

QUESTÃO 26

Geo-helmintíases são infecções causadas por parasitos que se desenvolvem no trato intestinal humano e que completam seu ciclo evolutivo no solo, o qual passa a estar contaminado, assim como a água e os alimentos, com os ovos ou larvas desses helmintos. A respeito das manifestações clínicas das geo-helmintíases, julgue os itens seguintes.

- I Pessoas com geo-helmintíases são frequentemente assintomáticas, porém altas cargas parasitárias e a ocorrência de poliparasitismo podem desencadear manifestações clínicas severas.
- II Após o surgimento das formas adultas dos helmintos no intestino, o paciente pode apresentar desconforto abdominal, cólicas intermitentes, perda de apetite, diarreia, dores musculares e anemia de diversos graus.
- III As principais manifestações clínicas da infecção por helmintos estão relacionadas à má absorção de nutrientes, à redução da capacidade de ingestão de alimentos e à obstrução das vias aéreas.
- IV A migração de grandes quantidades de larvas para os pulmões pode desencadear um quadro de pneumonia verminótica.

Assinale a opção correta.

- A Apenas os itens I, II e III estão certos.
- B Apenas os itens I, II e IV estão certos.
- C Apenas os itens I, III e IV estão certos.
- D Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 27

Para evitar a transmissão da influenza, a pessoa com essa doença deve, entre outras medidas,

- A evitar ambientes fechados onde haja aglomerações de pessoas.
- B higienizar a cavidade oral antes de compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e copos.
- C afastar-se do trabalho por ao menos 48 horas após o fim dos sintomas.
- D higienizar as mãos com lenços descartáveis após espirrar ou tossir.
- E higienizar as mãos somente após o consumo de alimentos.

QUESTÃO 28

Medicamentos biológicos são moléculas complexas de alto peso molecular, obtidas a partir de fluidos biológicos, tecidos de origem animal ou procedimentos biotecnológicos, por meio da manipulação ou alteração dos genes, ou da inserção de outro material genético. Considerando-se essas informações e as definições da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), é correto afirmar que são medicamentos biológicos

- A) probióticos, que são substâncias existentes em animais ou vegetais que podem induzir uma resposta IgE e(ou) uma reação alérgica do tipo I.
- B) biomedicamentos, que são imunoglobulinas derivadas de um mesmo clone de linfócito B, cuja clonagem e propagação efetuam-se em linhas de células contínuas.
- C) anticorpos monoclonais, que são fármacos imunobiológicos que contêm uma ou mais substâncias antigênicas que, quando inoculadas, são capazes de induzir imunidade específica ativa.
- D) hemoderivados, que são produtos farmacêuticos, submetidos a processos de industrialização, obtidos a partir do plasma humano.
- E) vacinas, que são fármacos obtidos a partir de fluidos biológicos ou de tecidos de origem animal ou a partir de procedimentos biotecnológicos.

QUESTÃO 29

Antes de verificar os sinais vitais de um paciente, o técnico de enfermagem deve tomar precauções a fim de reduzir a carga de microrganismos nas próprias mãos, realizando um procedimento simples, que consiste em aplicar uma preparação alcoólica na pele e que é denominado

- A) antissepsia cirúrgica das mãos.
- B) fricção antisséptica das mãos.
- C) higienização antisséptica das mãos.
- D) higienização cirúrgica das mãos.
- E) fricção simples das mãos.

QUESTÃO 30

Estoma é uma abertura feita cirurgicamente no corpo do paciente com o objetivo de facilitar a comunicação com o meio exterior, para a saída de fezes e urina ou para auxiliar na respiração ou na alimentação. Denomina-se de ileostomia o procedimento de criação de um estoma que permite a comunicação entre o exterior e

- A) o intestino delgado.
- B) o estômago.
- C) a traqueia.
- D) o intestino grosso.
- E) os condutos urinários.

QUESTÃO 31

O profissional de saúde deve esclarecer e orientar o usuário dependente de cocaína por inalação sobre os riscos, as doenças e os agravos decorrentes do uso dessa droga. Nesse contexto, de acordo com as estratégias para a redução de danos físicos e mentais em paciente que não consegue ou não manifesta vontade de cessar o consumo de cocaína, o profissional de enfermagem deverá recomendar — ou sugerir, conforme o caso — que o paciente

- A) lave as narinas com soro fisiológico ou água e utilize canudos plásticos individuais para o consumo da droga.
- B) aumente a ingestão líquida e monitore a temperatura do corpo.
- C) faça uso de cachimbo individual e creme labial durante o consumo da droga.
- D) inale a droga em lugares públicos fechados e denuncie a venda dessa substância para menores de dezoito anos.
- E) opere máquinas industriais ou técnicas, visto que um dos efeitos da cocaína é o aumento da concentração.

QUESTÃO 32

No período pré-operatório imediato de cirurgia de varizes, bem como durante a realização desse procedimento, o paciente deve ser mantido na posição de

- A) Sims.
- B) Elliot.
- C) Mayo-Robson.
- D) Fowler.
- E) Trendelenburg.

QUESTÃO 33

O quadro evolutivo da úlcera de pressão caracterizado por perda superficial de pele, pelo envolvimento da derme e da epiderme e pela presença de bolha, abrasão ou cratera corresponde ao estágio

- A) 4.
- B) intermediário entre os estágios 3 e 4.
- C) 1.
- D) 2.
- E) 3.

QUESTÃO 34

O profissional de saúde da atenção básica poderá propor acordo de fornecimento de alimentação diária ao usuário de *crack* em situação de rua, com tuberculose e baixa adesão a tratamento medicamentoso, se, em contrapartida, esse usuário

- A) alterar sua localização habitual para uma rua próxima da unidade básica de saúde.
- B) trazer para a unidade básica de saúde outros usuários que estejam na mesma condição que ele.
- C) voltar a morar na casa de sua família de origem.
- D) deixar de usar *crack* e outras drogas diariamente.
- E) concordar em receber a alimentação e a administração de medicação na unidade básica de saúde.

QUESTÃO 35

Nos cuidados de enfermagem para o paciente que apresentar deiscência pós-cirúrgica torácica ou abdominal, o profissional de saúde deve

- A** levar o paciente ao sanitário, irrigar o períneo deste com água morna e abrir a torneira da pia para que o barulho da água corrente sirva de estímulo.
- B** fazer o controle de diurese e temperatura corporal do paciente, oferecer líquidos por via oral ou controlar a hidratação venosa.
- C** manter secas as roupas de cama, trocar curativos e não mobilizar drenos.
- D** acalmar o paciente, cobrir as vísceras deste com compressa estéril e avisar o cirurgião imediatamente.
- E** avaliar o aspecto dos pontos cirúrgicos e a liberação de secreção e orientar o paciente sobre a execução correta da técnica de tosse.

QUESTÃO 36

Na coleta de material biológico a ser submetido à urocultura, se o paciente estiver consciente e conseguir controlar sua micção, deve-se

- A** utilizar cateterismo uretral, caso se trate de paciente do sexo feminino.
- B** coletar todo conteúdo da bexiga, até o esvaziamento completo.
- C** utilizar cateter com preservativo em paciente do sexo masculino.
- D** fazer antisepsia dos genitais externos com água e sabão e desprezar o primeiro jato.
- E** utilizar material limpo, seco e não estéril.

QUESTÃO 37

Para o profissional de saúde, a principal finalidade das estratégias de redução de danos para usuários de álcool e outras drogas deve ser o(a)

- A** eliminação do uso de drogas por pessoas em situação de rua.
- B** repressão ao tráfico ilícito de drogas nas metrópoles.
- C** imposição de normas prescritivas para o comportamento do usuário de drogas ilícitas.
- D** redução das consequências adversas do uso indevido de drogas.
- E** estímulo ao uso de drogas na população vulnerável.

QUESTÃO 38

As atividades que compõem as atribuições do auxiliar e do técnico de enfermagem, na assistência de enfermagem em saúde coletiva e saúde da família, incluem o(a)

- A** realização de fotografias de uso odontológico.
- B** gerenciamento de ações realizadas pelos agentes comunitários de saúde.
- C** realização de pequenos procedimentos cirúrgicos.
- D** realização de modelos em gesso.
- E** execução de atividades de demanda espontânea.

QUESTÃO 39

O auxiliar e o técnico de enfermagem participam da organização do processo de trabalho, auxiliando o enfermeiro no controle de medicamentos, a fim de evitar perdas, extravios e desperdícios. Com relação a esse assunto, assinale a opção que apresenta procedimentos típicos dos sistemas de controle de medicamentos.

- A** sistema de troca diária e rol de consertos
- B** requisições diária e semanal e reposição automática
- C** mapas de fluxo de pacientes e de visitas
- D** levantamento diário e relatório mensal
- E** inspeção e encaminhamento para manutenção

QUESTÃO 40

Entre outros aspectos, o trabalho das equipes de atenção à saúde da família é caracterizado pelo(a)

- A** recebimento de incentivo financeiro mensal para o custeio de unidade móvel.
- B** atenção no domicílio, em escolas, creches, praças e outros locais da comunidade.
- C** atribuição de competência aos gestores municipais de saúde para a composição das referidas equipes.
- D** realização das atividades da equipe de forma itinerante.
- E** limitação do livre acesso da população para atendimento individual.

QUESTÃO 41

Pacientes renais crônicos geralmente apresentam baixos níveis de eritropoietina (EPO). Assinale a opção que apresenta, respectivamente, uma causa e uma consequência dessa disfunção.

- A** aumento dos níveis séricos de ureia – cefaleia
- B** alterações na homeostase do cálcio – osteopenia
- C** deficiência na produção de tampões – acidose metabólica
- D** diminuição da massa renal – anemia
- E** retenção de sódio e água – hipervolemia

QUESTÃO 42

Lúcia é técnica em enfermagem e deve administrar medicação a quatro pacientes: José necessita da substância para tratamento cardíaco; Luís deve receber tratamento para o estômago; Heloísa precisa de remédios para atenuar os sintomas de sua artrite; e Rita aguarda tratamento para cistite.

Considerando-se o uso mais comum de cada medicamento e que os pacientes apresentem apenas as condições acima mencionadas, Lúcia deve administrar, entre outros,

- A** diclofenaco a Heloísa e ciprofloxacina a Rita.
- B** diclofenaco a José e ciprofloxacina a Luís.
- C** metoclopramida a José e digoxina a Rita.
- D** diclofenaco a Luís e ciprofloxacina a Heloísa.
- E** metoclopramida a Luís e digoxina a Rita.

QUESTÃO 43

Com base nas recomendações do Ministério da Saúde, julgue os itens a seguir, acerca das orientações nutricionais a serem repassadas por um técnico em enfermagem a uma paciente em gestação de baixo risco, com o objetivo de prevenir o desenvolvimento de anemia ferropriva.

- I A paciente deve consumir diariamente alimentos de origem animal ou vegetal ricos em ferro.
- II É recomendado à gestante o consumo frequente de sal de cozinha, que, no Brasil, é enriquecido com ferro.
- III A partir da oitava semana de gestação, a paciente deve buscar o serviço de saúde para receber suplementação de ferro.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item II está certo.
- C Apenas o item III está certo.
- D Apenas os itens I e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 44

Com capacidade civil plena, casado e sem filhos, Francisco buscou o serviço de saúde a fim de obter informações a respeito de planejamento familiar.

Julgue os itens a seguir, acerca das informações que, de acordo com a legislação que trata do assunto, devem ser repassadas a Francisco, quanto às condições para que ele possa se submeter à esterilização.

- I É necessário manifestar por escrito sua vontade de realizar o procedimento.
- II É necessário apresentar consentimento expresso de sua esposa.
- III Para pessoas com menos de dois filhos, a idade mínima é de vinte e cinco anos.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item II está certo.
- C Apenas o item III está certo.
- D Apenas os itens I e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 45

O tratamento da icterícia neonatal é tipicamente realizado por fototerapia. Entretanto, esse tratamento pode causar em recém-nascidos efeitos colaterais, como

- I hipertermia.
- II aumento da perda hídrica.
- III constipação intestinal.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item II está certo.
- C Apenas os itens I e II estão certos.
- D Apenas os itens I e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 46

Durante a oxigenoterapia em recém-nascidos, o técnico em enfermagem deve realizar controle e acompanhamento cuidadoso do funcionamento do equipamento e dos procedimentos envolvidos, pois, caso a pressão parcial de oxigênio alveolar atinja valor superior a 100 mmHg, o procedimento pode causar danos permanentes

- A à pele.
- B à retina.
- C à tireoide.
- D ao pâncreas.
- E ao rim.

QUESTÃO 47

O atendimento pré-hospitalar de vítimas de trauma é frequentemente realizado com base em protocolo que compreende uma avaliação primária e uma secundária. A avaliação primária é baseada no método ABCDE, que compreende cinco etapas, entre elas, a etapa de circulação e controle de hemorragias, que

- A deve ser realizada após a exposição do paciente, a fim de se detectarem outras lesões.
- B dispensa a infusão de solução cristaloide, realizada somente na avaliação secundária.
- C dispensa a determinação exata de pressão arterial, para que se proceda imediatamente à ressuscitação do paciente.
- D é prioritária em relação às demais.
- E deve ser realizada após a avaliação neurológica.

QUESTÃO 48

De acordo com a legislação referente aos sistemas estaduais de urgência e emergência, um técnico em enfermagem civil com formação específica em urgências, sem certificação em salvamento, poderá ser tripulante, atuando em situações de urgência, apenas em ambulâncias de

- A transporte e de suporte básico.
- B transporte, de suporte básico e de suporte avançado.
- C resgate.
- D transporte.
- E resgate e de transporte.

QUESTÃO 49

Muito frequentes na terapia intensiva, os choques podem ser classificados de acordo com sua etiologia, independentemente da causa básica da internação do paciente. A partir dessas informações, assinale a opção que indica, corretamente, a causa prevalente e a respectiva classificação do choque.

- A infarto do miocárdio – choque neurogênico
- B queimaduras extensas – choque hipovolêmico
- C ingestão de alergênicos – choque obstrutivo
- D infecção generalizada – choque cardiogênico
- E lesões medulares – choque distributivo

QUESTÃO 50

Entre outros medicamentos, podem ser usados, durante as crises convulsivas e para prevenir essas crises, respectivamente,

- A lidocaína e estreptoquinase.
- B tramadol e manitol.
- C diazepam e fenitoína.
- D diltiazem e midazolam.
- E alteplase e amiodarona.

QUESTÃO 51

Com relação às hepatites virais, julgue os itens a seguir.

- I São formas de transmissão da hepatite A: o contágio fecal-oral, o contato direto com pessoas infectadas, a ingestão de alimentos ou de água contaminados e o contato direto com objetos contaminados.
- II A exposição percutânea ou de mucosas a sangue e(ou) fluidos corpóreos infectados é uma das formas de transmissão ocupacional do vírus da hepatite B (HBV).
- III O Programa Nacional de Imunizações recomenda que a vacinação contra a hepatite B seja administrada a crianças a partir do quarto ano de vida.
- IV A transmissão de hepatite C (HCV) seria contida, no Brasil, caso se realizassem testes sorológicos de triagem eficazes em doadores de sangue, uma vez que a transfusão de sangue é a principal forma de transmissão dessa doença no país.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C I e IV.
- D II e III.
- E III e IV.

QUESTÃO 52

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) bem como a manifestação clínica em fase avançada da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) constituem importantes preocupações para a saúde pública. Com relação à AIDS e aos múltiplos aspectos a ela relacionados, julgue os itens a seguir.

- I O HIV-1 e o HIV-2 são adenovírus da família *Lentiviridae*.
- II O ser humano é o único hospedeiro tanto do vírus HIV-1 quanto do HIV-2.
- III O vírus HIV pode ser transmitido por via sexual (esperma e secreção vaginal), pelo sangue (via parenteral e de mãe para filho) e pelo leite materno.
- IV O tratamento da AIDS com medicação antirretroviral (TARV) reduz a carga viral e reativa o sistema imunológico, levando à cura da doença.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C I e IV.
- D II e III.
- E III e IV.

QUESTÃO 53

Clinicamente, a sífilis desenvolve-se em três estágios, caracterizados por diferentes sintomas. Na fase latente da doença, o paciente apresenta

- A proliferação de treponemas nas lesões, o que justifica a titulação elevada nos exames sorológicos realizados nesta fase.
- B uma ou mais erupções indolores na pele e na mucosa, denominadas cancos duros, com secreção serosa escassa e de curta duração.
- C sinais subclínicos da doença, que, nesse estágio, é diagnosticada por meio de testes sorológicos, tais como o de imunofluorescência indireta.
- D múltiplas lesões ulceradas, que provocam dor prolongada e intensa e apresentam base endurecida e fundo liso e brilhante.
- E alta carga bacteriana no sangue, comprovável em exames sorológicos do tipo ELISA (*enzyme-linked immunosorbent assay*).

QUESTÃO 54

Com relação à tuberculose e aos múltiplos aspectos a ela relacionados, assinale a opção correta.

- A Independentemente da prova tuberculínica, os profissionais de saúde devem ser imunizados com a vacina BCG.
- B A vacina BCG cura indivíduos já infectados pelo *Mycobacterium tuberculosis*.
- C Na vacinação contra a tuberculose, é facultado aos profissionais de saúde o uso de óculos de segurança.
- D O tratamento dos pacientes com tuberculose deve ser realizado por um período mínimo de seis meses.
- E Os profissionais da área de saúde têm riscos menores de contrair a tuberculose do que o resto da população.

QUESTÃO 55

De acordo com a legislação que dispõe sobre o exercício da enfermagem,

- A é facultado ao técnico de enfermagem, caso considere adequado, facilitar a fiscalização do exercício profissional a ser realizada por órgão competente.
- B as infrações éticas observadas durante o trabalho em unidades de saúde devem ser comunicadas ao Conselho Regional de Enfermagem somente nos casos de interesse do trabalhador.
- C técnicos de enfermagem estão habilitados a atuar tanto na jurisdição em que estão inscritos como nas outras jurisdições, sendo desnecessária a transferência da inscrição.
- D a inscrição nos conselhos regionais de enfermagem é obrigatória aos enfermeiros e técnicos de enfermagem, embora seja facultativa no caso de auxiliares de enfermagem.
- E é obrigatório ao profissional de enfermagem, caso encerre suas atividades na área, solicitar o cancelamento de sua inscrição no conselho regional ao qual estiver vinculado.

QUESTÃO 56

Acerca dos conselhos regionais de enfermagem e das entidades de classe da categoria, assinale a opção correta.

- A** É destinada ao Conselho Federal de Enfermagem 50% da receita de cada conselho regional de enfermagem, sendo os 50% restantes destinados a despesas administrativas locais.
- B** A filiação à Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) é facultada aos técnicos de enfermagem, porém obrigatória aos enfermeiros e estudantes de graduação em enfermagem.
- C** A defesa dos interesses econômicos dos profissionais de enfermagem é de responsabilidade da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn).
- D** É de responsabilidade dos sindicatos da categoria a elaboração de estratégias voltadas ao desenvolvimento cultural e profissional de enfermeiros.
- E** As fontes de renda dos conselhos regionais de enfermagem são a taxa de expedição de carteiras e cédulas profissionais, os emolumentos, as anuidades e as multas.

QUESTÃO 57

A Política Nacional de Humanização (PNH) parte da concepção de um novo humanismo, não mais baseado em valores universais referidos a um homem ideal, mas sim focado na experiência concreta. De acordo com os preceitos da PNH,

- A** o programa de educação permanente é um projeto consolidado no Brasil, dispensando-se a necessidade de se investir mais nesse setor.
- B** a gestão dos processos de produção de saúde deve ser conduzida de forma autônoma e objetiva, priorizando-se sua função institucional.
- C** os sujeitos usuários são os protagonistas dos processos de gestão e de atenção do SUS, seguidos em importância pelos trabalhadores dos serviços de saúde.
- D** deve ser valorizada a interação entre aspectos afetivos e fatores técnicos, da qual são exemplos os projetos Maternidade Segura e Método Canguru.
- E** a humanização do sistema de saúde deve ser compreendida como um programa de metas específicas a serem cumpridas em prazos determinados.

QUESTÃO 58

As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)

- A** apresentam-se sempre de maneira sintomática na mulher, o que diminui o risco de complicações graves.
- B** são assim denominadas por transmitirem-se exclusivamente por via sexual, como é o caso do papilomavírus humano (HPV).
- C** são insuscetíveis de transmissão da mãe infectada ao feto, tanto durante a gestação quanto no parto.
- D** podem, em alguns casos, evoluir para complicações graves e levar à morte, caso não sejam diagnosticadas e tratadas a tempo.
- E** devem ser prevenidas, primariamente, por meio do uso de preservativos durante as relações sexuais extraconjugais.

QUESTÃO 59

Doença febril aguda que pode apresentar um amplo espectro clínico, a dengue

- A** pode levar à morte logo após o aparecimento dos sintomas iniciais mais comuns, como o choque, a febre baixa e a hemorragia.
- B** é de diagnóstico trabalhoso, sendo necessários testes sorológicos baseados no método ELISA, que identificam anticorpos IgG.
- C** deve ser tratada, entre outros cuidados, por meio de hidratação adequada, considerando-se o estágio da doença e os sintomas apresentados.
- D** tem como agente etiológico o *Aedes aegypti*, espécie de mosquito de difícil erradicação em regiões tropicais e subtropicais.
- E** é causada pela infecção por um vírus que atinge apenas a população de países pobres, inexistindo casos da doença em nações desenvolvidas.

QUESTÃO 60

Embora o tétano acidental possa ser prevenido por meio da administração de vacina específica, ainda há registros de ocorrência dessa doença no Brasil. Por isso, no que tange ao tétano, o profissional de saúde deve estar atento

- A** à possibilidade de contágio direto entre indivíduos, o qual dificulta o controle da transmissão da toxina tetânica.
- B** ao curto período de incubação do tétano e ao fato de que o prognóstico é mais grave em incubações inferiores a sete dias.
- C** à não ocorrência de sinais clínicos específicos, o que leva à necessidade, para fins de diagnóstico, de exames laboratoriais.
- D** à baixa gravidade das possíveis complicações decorrentes do tétano, o que o caracteriza como uma doença de curso benigno.
- E** aos cuidados domiciliares recomendados ao paciente, uma vez que o tratamento do tétano não exige hospitalização.