



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL**  
**HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)**

**CONCURSO PÚBLICO**  
– Aplicação: 27/1/2002 –

**ÁREA: MÉDICA**  
**EMPREGO: MÉDICO**  
**ESPECIALIDADE: UROLOGIA**

---

**CADERNO DE PROVAS**

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES NO VERSO.**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)  
Concurso Público – Aplicação: 27/1/2002

ÁREA: MÉDICA  
EMPREGO: MÉDICO  
ESPECIALIDADE: UROLOGIA

## INSTRUÇÕES

- 1 Este caderno consta de **quarenta** questões objetivas, assim distribuídas: **cinco** questões de **Língua Portuguesa**, **cinco** questões de **Língua Inglesa**, **cinco** questões de **Conhecimentos de Informática**, **dez** questões de **Conhecimentos Gerais** e **quinze** questões de **Conhecimentos Específicos**.
- 2 Caso este caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Recomenda-se não marcar ao acaso: cada questão cuja resposta divirja do gabarito oficial definitivo acarretará a perda de 0,25 ponto, conforme consta no Edital n.º 1/2001 – HFA, de 6/11/2001.
- 4 Não é permitida a utilização de nenhum material de consulta.
- 5 Durante as provas, o candidato não deve levantar-se nem comunicar-se com outros candidatos.
- 6 A duração das provas é de **três horas**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da Folha de Respostas.
- 7 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nas presentes Instruções, na Folha de Rascunho ou na Folha de Respostas poderá implicar a anulação das provas do candidato.

## AGENDA

- I **28/1/2002** – Divulgação dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, na Internet — no endereço <http://www.cespe.unb.br> — e nos quadros de avisos do CESPE/UnB — em Brasília.
- II **29 e 30/1/2002** – Recebimento de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas exclusivamente na Gerência de Atendimento do CESPE/UnB.
- III **6/2/2002** – Data provável da divulgação (após a apreciação de eventuais recursos), no Diário Oficial e nos locais mencionados no item I, do resultado final das provas objetivas e da convocação para a entrega de títulos.

## Observações:

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido no item **10 DOS RECURSOS** do Edital n.º 1/2001 – HFA, de 6/11/2001.
- Informações relativas a resultados poderão ser obtidas pelo telefone 0(XX)–61–448–0100.
- É permitida a reprodução deste material, desde que citada a fonte.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)  
Concurso Público – Aplicação: 27/1/2002

ÁREA: MÉDICA  
EMPREGO: MÉDICO  
ESPECIALIDADE: UROLOGIA

Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Na Folha de Respostas, a indicação do campo **SR** é facultativa e não contará para efeito de avaliação; servirá somente para caracterizar que o candidato desconhece a resposta correta. Use a Folha de Rascunho para as devidas marcações e, posteriormente, a **Folha de Respostas**.

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Texto LP-I – questões 1 e 2

1 A geração atual é muito menos romântica, muito mais  
objetiva que a de há cinco décadas. Recordo-me da emoção com  
que olhávamos, e ainda olhamos, as mulheres, em contraste com  
4 a tranqüilidade dos jovens de hoje, em face do sexo. Refiro-me,  
é claro, à mocidade pioneira e não à massa geral das populações  
do interior, mais conservadora. Há hoje uma frieza, que talvez  
7 seja providencial, em face da explosão demográfica. A libido se  
desgenitaliza. Os homens estão mais frios. Mas o grande  
elemento de equilíbrio é a mulher. Quando os homens eram  
10 ardentes demais, elas encompridavam as saias e reduziam os  
decotes. Em face de homens frios, elas levantam as saias e  
baixam os decotes, em uma tentativa de homeostase. Quando os  
13 jovens tendem à intersexualidade, elas, compensadoramente,  
procuram masculinizar-se, pelo menos no vestuário. Quem não  
vê as coisas mais a fundo pensa mesmo que elas se  
16 masculinizaram. Na realidade, nunca foram mais femininas do  
que nesse esforço patético de reequilíbrio.

J. Fernando Carneiro. *Psicologia do brasileiro*. São Paulo: Agir, 1971, p. 75 (com adaptações).

### QUESTÃO 1

Depreende-se do texto LP-I que

- A as mulheres, melhor do que os homens, adaptam-se às circunstâncias novas; por isso, reagem sedutoramente ao frio comportamento masculino.
- B o sexo perdeu o valor e a importância para os jovens, desde que a libido passou a ser mais intelectualizada.
- C o romantismo é coisa do passado; no mundo contemporâneo, o que importa é a frieza nas relações intersexuais.
- D o movimento em favor das minorias sexuais teve início quando as mulheres passaram a vestir-se de forma masculinizada.
- E quem pensa que as mulheres se masculinizaram entende que a atitude do homem moderno é contrastante com a do homem do século passado.

### QUESTÃO 2

Assinale a opção cuja expressão substitua “de homeostase” (R12), no texto LP-I, sem alterar o sentido do período.

- A da tranqüilidade
- B de pioneirismo
- C da explosão demográfica
- D de equilíbrio
- E de masculinização

### Texto LP-II – questões de 3 a 5

1 Pouco maior do que um par de ameixas secas, com  
formato semelhante ao de uma gravata-borboleta e pesando  
entre 15 g e 25 g, ela comanda algumas das mais  
4 importantes funções do corpo humano. Exemplos? A  
capacidade de respirar, de mover as pernas, regular a  
temperatura corporal, manter o coração batendo no ritmo certo,  
7 o raciocínio pronto para qualquer desafio... É preciso mais?  
Claro que não. Está comprovadíssima a nobreza da pecinha de  
que estamos falando. E para não espichar o assunto, vamos logo  
10 à ficha da moça. Trata-se da glândula tireóide (ou tireóide),  
domiciliada à frente da traquéia, bem abaixo do pomo-de-adão,  
ou gogó, para os íntimos.

13 O primeiro médico a descrevê-la foi o belga Vesalius,  
pai da anatomia moderna, em 1543. Ele observou que a pequena  
estrutura se movimenta para cima e para baixo durante o ato de  
engolir, mas não chegou a descobrir as tarefas desempenhadas  
16 por ela no organismo. Séculos depois, os cientistas perceberiam  
que, além de dançar no pescoço, a glândula fabrica dois  
19 hormônios fundamentais: o T3 (triiodotironina) e o T4  
(tiroxina). Lançadas na corrente sanguínea, essas substâncias  
atingem, uma por uma, todas as células do corpo, estimulando-  
22 as a produzir energia. Isso mesmo. O T3 e o T4 atuam como a  
gotinha mágica que induz o metabolismo celular a transformar  
nutrientes em combustível vital. Assim, o organismo encontra  
25 forças para desempenhar todas as suas funções — de piscar o  
olho a correr a mais disputada das maratonas.

Armando Luiz Antenore. In: *Saúde!*, dez./1990, p. 71 (com adaptações).

### QUESTÃO 3

A partir da leitura interpretativa do texto LP-II, assinale a opção correta.

- A Ao descrever a glândula tireóide, o autor apresenta-lhe a origem, o histórico, as características, as funções e os principais empecilhos a seu funcionamento.
- B Denominam-se hipertiroidismo e hipotiroidismo o excesso ou a carência, respectivamente, dos hormônios fundamentais da tireóide, segundo o movimento ascendente e descendente dessa glândula.
- C O fragmento estrutura-se a partir de analogias, com ameixas e borboletas, e de comparações, com o coração e o cérebro, por exemplo.
- D Os efeitos principais do mau funcionamento da tireóide são, para os membros, a fraqueza e a imobilidade gradativas e, para o tórax, as dificuldades de funcionamento do diafragma.
- E O texto trata de um assunto especializado, de natureza científica, em linguagem adequada ao público leigo.



**QUESTÃO 8**

Based on the last paragraph of text LI, it can be gathered that

- I the Family Health Programme involves partnership.
- II there is a direct contact between the families and a team of field workers.
- III the families themselves know when to look for help and where to find it.
- IV child feeding and antenatal care are the Programme's only concern.
- V treatment is provided for just two types of diseases.

The only true items are

- A I and II.
- B I and IV.
- C II and V.
- D III and IV.
- E III and V.

**QUESTÃO 9**

It can be deduced from text LI that

- I dental care will never be included in the health treatment.
- II specialised care can also be offered if required.
- III hospital treatment is granted only for pregnant women.
- IV every Family Health Programme's team has ten participants.
- V a possible title for this passage could be: **Brazil widens access to health care.**

The total number of true items is

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

**QUESTÃO 10**

In text LI,

- I "Elsewhere" (R4) means **Everywhere.**
- II "which" (R12) refers to "Brazil" (R10).
- III "could not afford" (R13) means **could not find available.**
- IV "to seek" (R19-20) is the same as **to search for.**
- V "advice" (R20) is related to **advise.**

The only true items are





- A I and II.
- B I and III.
- C II and IV.
- D III and V.
- E IV and V.

**CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA**


Nas questões de 11 a 15, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; que o *mouse* está configurado para pessoas destreas e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*. Considere também que não há restrições de proteção e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

**QUESTÃO 11**



Por meio do Internet Explorer 5 e a partir de um computador que opera com o sistema operacional Windows 98, um usuário acessou um *website* especializado no envio de *fax*, utilizando os recursos da Internet. A figura acima mostra uma das páginas do *website* acessado. Com base nessa figura e acerca da Internet, do Windows 98 e do Internet Explorer 5, assinale a opção correta.

- A Com base nos dados apresentados na figura, é correto afirmar que a página mostrada acima é uma das favoritas do Internet Explorer 5, configurada pelo usuário a partir do botão .
- B Para facilitar a navegação pela *Web*, as páginas da WWW podem ser desenvolvidas com recursos de *hyperlink*. Por meio desse recurso, o usuário pode acessar informações a partir de elementos gráficos e textuais dispostos na própria página. Na página acima mostrada, se o usuário clicasse em Login, em Senha ou até mesmo em , ele acessaria recursos da página por meio de *hyperlinks*.
- C Os serviços de *fax* por meio dos recursos da Internet somente podem ser utilizados, caso o computador do usuário tenha nele instalado, além de uma placa de rede para a conexão a um provedor de Internet, uma placa de *fax/modem* para enviar o *fax* até o *website*. Adicionalmente, o destinatário deverá ter instalado em seu computador esses mesmos equipamentos para poder receber o *fax* enviado.
- D Em se tratando de informática e, principalmente, da Internet, é comum que os *softwares* se tornem ultrapassados ou inadequados, devendo ser substituídos ou, o que acontece geralmente, ser atualizados. Para facilitar a atualização do Internet Explorer, a Microsoft disponibiliza, atualmente, um *site* que permite ao usuário realizar a *download* via Internet das novas versões desse *software*. Essa facilidade pode ser acessada por meio do botão . Ao se clicar nesse botão, automaticamente o navegador realiza a atualização do Internet Explorer 5.
- E Caso o usuário queira tornar a página mostrada acima a página inicial do Internet Explorer 5 para, a cada vez que uma nova sessão de uso do Internet Explorer 5 for iniciada, o *software* carregar automaticamente essa página, será suficiente que ele clique no botão .

**QUESTÃO 12**










A figura acima ilustra uma janela do Outlook Express sendo executado em um computador cujo sistema operacional é o Windows 98. Acerca desse *software* e do Windows 98 e com base na figura mostrada, assinale a opção **incorreta**.

- A Para que esse *software* possa funcionar adequadamente no ambiente Windows 98 e possa enviar um *e-mail* para um destinatário localizado em um outro país, é necessário que o computador no qual ele está sendo executado tenha nele instalado um microprocessador com frequência de relógio — *clock* — superior a 1 GHz.
- B O *software* cuja janela é mostrada acima é capaz de enviar e receber mensagens de correio eletrônico no formato textual, em forma de arquivos anexados e na forma de páginas *Web* no corpo do *e-mail*.
- C Caso se queira responder o *e-mail* recebido, que está sendo mostrado na figura acima, basta clicar no botão ; na janela que será aberta em decorrência dessa ação, digitar a mensagem no local apropriado, configurar adequadamente as opções de envio disponíveis e, finalmente, enviar a mensagem de resposta, acionando o botão destinado para esse fim na referida janela.
- D A partir desse *software*, é possível criar um catálogo de endereços de *e-mail* que facilite o envio de correio eletrônico a um determinado contato.
- E Caso se deseje enviar a mensagem recebida e mostrada na figura a um determinado destinatário, é suficiente clicar no botão ; na janela que será aberta em decorrência dessa ação, configurar adequadamente as opções de envio disponíveis, tais como o endereço eletrônico do destinatário e, finalmente, enviar a mensagem, acionando o botão destinado para esse fim na referida janela.

**QUESTÃO 13**




A figura acima mostra parte da área de trabalho do Windows 98, em que se observa aberta a janela Meu computador. Com base nessa figura e acerca do Windows 98, julgue os itens abaixo.

- I Para excluir  da pasta Meu computador, é suficiente que o usuário se certifique de que a tecla  esteja desabilitada, clique sobre o referido objeto e pressione a tecla .
- II Para visualizar toda a área de trabalho do Windows 98, é suficiente que o usuário clique em , no canto superior direito da janela Meu computador. Contudo, com essa ação, a referida janela será fechada.
- III Executando-se um clique duplo sobre o ícone , será visualizada a pasta denominada Painel de controle. Nessa pasta, o usuário tem acesso a várias opções para a configuração de *software* e de *hardware* do seu computador.
- IV Clicando em , o usuário tem acesso a uma lista de opções, entre elas, à janela Executar. Essa janela pode ser utilizada para carregar um programa executável ou abrir um documento contendo texto.
- V Na pasta , são guardados os arquivos excluídos pelo usuário ao longo de uma sessão de trabalho. Os arquivos armazenados nessa pasta são automaticamente excluídos pelo Windows 98, sem possibilidade de recuperação, sempre que o disco rígido do computador apresenta um índice de ocupação de 90%.




Estão certos apenas os itens

- A I, II e V.
- B I, III e IV.
- C I, IV e V.
- D II, III e IV.
- E II, III e V.


**QUESTÃO 14**







A figura acima mostra parte de uma janela do Word 97, com o fragmento de um texto que foi editado por um usuário. Com relação a essa janela e ao Word 97, assinale a opção correta.

- A O documento em apreço é composto por apenas uma página, como pode ser visto na seqüência de caracteres **Pág 1**, no canto inferior esquerdo da janela, e foi editado no dia primeiro de abril, como pode ser visto na seqüência de caracteres **1/4**.
- B Caso o usuário deseje maximizar a tela de trabalho, de forma que ela ocupe toda a área da tela do monitor de vídeo, é suficiente que ele clique em .
- C Caso o usuário selecione o título “A Ciência da Dedução” e clique em , será exibida a caixa de diálogo Fonte, que permite alterar a fonte utilizada no título.
- D Caso o usuário deseje que o Word 97 procure por erros gráficos no primeiro parágrafo, é suficiente que ele, após selecionar o referido parágrafo, clique em .
- E Caso o usuário deseje selecionar a palavra “cordas”, é suficiente que ele execute a seguinte seqüência de ações com o mouse: posicionar o ponteiro imediatamente à esquerda da letra “c”, no início dessa palavra; pressionar o botão esquerdo e, mantendo-o pressionado, posicionar o ponteiro entre a letra “s”, no final da palavra, e o ponto final à sua direita; liberar o botão esquerdo.

**QUESTÃO 15**



A figura acima mostra uma planilha elaborada no Excel 97 por um empregado de um hospital, contendo informações acerca de alguns materiais hospitalares que foram adquiridos. Com referência à janela mostrada e ao Excel 97, assinale a opção correta.

- A Caso o empregado deseje aumentar a largura da coluna B, é suficiente que ele clique, sucessivamente, no cabeçalho da referida coluna — **B** — e em .
- B O preço total pago pelos “Cateteres” pode ter sido obtido por meio da seguinte seqüência de ações: clicar na célula D5; digitar sucessivamente as teclas **6 , ) , L , 7 e )** ; teclar **<**.
- C Caso o empregado deseje calcular o total gasto nos itens listados, pondo o resultado na célula D6, é suficiente que ele realize a seguinte seqüência de ações: clicar na célula D6; clicar em ; teclar **<**.
- D Para selecionar as células B2, C2 e D2, é suficiente que o empregado realize a seguinte seqüência de ações: clicar na célula D2; clicar três vezes seguidas em .
- E Caso o empregado deseje copiar o conteúdo da célula C2 para a área de transferência, é suficiente que ele clique nessa célula e, em seguida, clique em .

## CONHECIMENTOS GERAIS

### QUESTÃO 16

Um paciente, com vinte anos de idade, deu entrada na emergência de um hospital e, no momento em que estava sendo examinado, apresentou parada cardiorrespiratória. Nessa situação, a primeira providência a ser tomada é

- A abrir as vias aéreas.
- B fazer compressões torácicas.
- C puncionar uma veia periférica.
- D realizar uma desfibrilação.
- E realizar ventilações com pressões positivas.

### QUESTÃO 17

Uma paciente, com dezoito anos de idade, apresenta, há 24 h, temperatura de 39° C, associada a calafrios e dor localizada em flanco direito. O exame físico mostra um quadro de astenia e fácies de dor. Não se encontra dor à pesquisa do sinal de Giordano. O hemograma apresenta leucocitose, e o exame de urina revela a existência de piúria maciça, com teste do nitrito positivo. Com base nessa história clínica, julgue os seguintes itens.

- I Um diagnóstico diferencial a ser considerado, nesse caso, é o de abscesso renal.
- II O fato de não haver disúria e o resultado negativo para sinal de Giordano prejudicam o diagnóstico de pielonefrite.
- III O teste do nitrito é altamente sensível para o diagnóstico de infecção do trato urinário.
- IV A realização de ecografia renal traz boa contribuição para o diagnóstico do caso em questão.
- V O emprego de antibiótico pode ser iniciado antes mesmo do resultado da cultura de urina.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

### QUESTÃO 18

Um paciente, com vinte anos de idade, tabagista, que ingere, com alguma frequência, bebida alcoólica, realizou uma consulta em ambulatório de clínica médica, quando se verificou que a medida de sua pressão arterial era de 150 mmHg × 95 mmHg. Na revisão de prontuário, descobriu-se que se tratava da terceira visita do paciente ao hospital no espaço de quatro semanas e que seus níveis de pressão arterial sistólica e diastólica sempre se situavam, respectivamente, entre 145 mmHg e 150 mmHg e entre 90 mmHg e 95 mmHg. A respeito do tratamento não-farmacológico para esse caso, julgue os itens a seguir.

- I A perda de peso é potencialmente a medida mais eficaz, independentemente de o paciente ser obeso.
- II A dieta hipossódica é uma recomendação cujo benefício ainda não está claramente demonstrado na literatura médica.
- III Uma dieta que contemple a ingestão de alimentos ricos em potássio pode promover uma significativa redução da pressão arterial.
- IV O paciente deve ter recomendação expressa de não mais fumar e de restringir o uso de bebidas alcoólicas.
- V Exercícios aeróbios devem ser realizados, obedecendo ao limite de 85% da frequência cardíaca máxima, pelo menos três vezes por semana.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

### QUESTÃO 19

O alcoolismo é um grave problema de saúde pública no Brasil e ocorre em todas as classes socioeconômicas, acarretando diversos problemas na esfera médica. A respeito desse assunto, julgue os itens subseqüentes.

- I Alguns indivíduos podem desenvolver hiperglicemia como conseqüência do metabolismo do álcool.
- II Muitos indivíduos estão sujeitos a desenvolver essa doença, motivados por fatores genéticos.
- III A presença de sinais neurológicos focais demanda urgente realização de uma tomografia computadorizada de crânio.
- IV Estudos vêm demonstrando que o alcoólico tem um melhor prognóstico terapêutico quando inserido em um programa de reabilitação.
- V O tremor é o sinal mais comum da abstinência e costuma ocorrer acompanhado de hiperatividade parassimpática.

Estão certos apenas os itens

- A I, II e III.
- B I, III e V.
- C I, IV e V.
- D II, III e IV.
- E II, IV e V.

### QUESTÃO 20

O diabetes melito é uma das principais causas de procura de um consultório médico, e as estatísticas mostram ser essa uma doença de grande morbimortalidade. Os fatores que demandam uma pesquisa acerca de seu diagnóstico incluem

- I obesidade.
- II infecções recorrentes de pele.
- III poliúria.
- IV antecedentes familiares dessa enfermidade.
- V idade acima de sessenta anos.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

### QUESTÃO 21

Acerca das parasitoses intestinais, que ainda representam grande prevalência no Brasil, assinale a opção que apresenta a correta relação entre a doença e a droga para seu tratamento.

- A ascaridíase      ÿ mebendazol
- B estrogiloidíase      ÿ metronidazol
- C esquistossomose      ÿ cambendazol
- D teníase      ÿ mebendazol
- E amebíase      ÿ tiabendazol



**QUESTÃO 22**

Após a identificação de um gânglio localizado na região supraclavicular esquerda, de consistência endurecida, indolor e aderido a planos superficiais, tem-se como diagnóstico mais provável o(a)

- A tuberculose.
- B câncer.
- C lúpus eritematoso sistêmico.
- D sarcoidose.
- E gânglio reacional inespecífico.

**Texto CG – questões de 23 a 25**

Um paciente, com quinze anos de idade, previamente hígido, apresenta, há uma semana, quadro súbito de febre, calafrios e dor torácica com pontada à esquerda, seguida de tosse com expectoração amarelada. O paciente nega o uso de drogas ilícitas, tabaco e álcool. O exame físico mostra a presença de crepitações inspiratórias na base do pulmão esquerdo. No raio X de tórax, verifica-se a existência de condensação homogênea no lobo inferior esquerdo.

**QUESTÃO 23**

O mais provável agente etiológico de quadro de pneumonia descrito no texto CG é o(a)

- A *Staphylococcus aureus*.
- B *Haemophilus influenzae*.
- C *Legionella pneumophila*.
- D *Streptococcus pneumoniae*.
- E *Pseudomonas aeruginosa*.

**QUESTÃO 24**

No caso apresentado no texto CG, o tratamento que melhor associa eficácia terapêutica e menor custo é feito com

- A macrolídeo.
- B penicilina.
- C quinolona.
- D cloranfenicol.
- E aminoglicosídeo.

**QUESTÃO 25**

Supondo que o paciente mencionado no texto CG responda favoravelmente ao tratamento prescrito, a resolução das imagens radiográficas pode então ser esperada em um intervalo de tempo de

- A uma semana.
- B duas a quatro semanas.
- C quatro a seis semanas.
- D seis a oito semanas.
- E oito a dez semanas.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 26**

Acerca do tratamento clínico e cirúrgico da disfunção erétil masculina, assinale a opção correta.

- A As novas drogas, como o sildenafil e a apomorfina, tiveram pouco impacto no tratamento da disfunção erétil em pacientes com doenças crônicas, como hipertensão arterial e diabetes.
- B A cirurgia veno-oclusiva tem boa indicação, especialmente nos pacientes com disfunção erétil por arteriosclerose.
- C Os pacientes submetidos a implante de prótese peniana inflável têm, em geral, maior grau de satisfação com o tratamento que os pacientes em uso de terapia de injeção intracavernosa.
- D Atualmente, as terapias de vacuoconstricção e a reposição parenteral de testosterona não apresentam mais nenhuma aplicabilidade clínica.
- E Não há indicação clínica que justifique a associação de terapia oral com sildenafil e terapia de injeção intracavernosa em pacientes com prótese peniana.

**QUESTÃO 27**

Com relação à anatomia cirúrgica dos rins, julgue os itens abaixo.

- I A ressecção parcial no pólo superior do rim tem menos risco de complicações vasculares que a ressecção do pólo inferior, porque a irrigação arterial do pólo superior, feita apenas por um único ramo segmentar anterior, é menor que a do pólo inferior, que recebe ramos segmentares anteriores e posteriores.
- II A disposição anatômica das fâscias renais separa potencialmente os espaços perirrenais direito e esquerdo, tornando extremamente raras complicações bilaterais de procedimentos endourológicos unilaterais, como hematoma ou abscesso perirrenal.
- III O rim esquerdo geralmente é maior que o direito e a largura do pólo inferior é maior que a do pólo superior.
- IV Em acessos percutâneos intercostais, é comum a pleura ser atingida porque a sua reflexão posterior se estende até abaixo da décima segunda costela.
- V Na face lateral da junção pieloureteral, se encontra a área de menor vascularização, onde pode ser realizada a incisão de endopielotomia, sem maior risco de sangramento.

Estão certos apenas os itens

- A I, II e III.
- B I, III e IV.
- C I, IV e V.
- D II, III e V.
- E II, IV e V.

**QUESTÃO 28**

Um paciente portador de câncer prostático e PSA elevado (> 40 ng/mL) foi submetido a uma linfadenectomia pélvica laparoscópica. Durante o procedimento, foi detectado um volumoso pneumoescrito. Em relação a essa complicação, assinale a opção correta.

- A É geralmente tratada com aspiração e curativo compressivo.
- B O procedimento deve ser prontamente interrompido.
- C Certamente é devida a um posicionamento inadequado da agulha de Veress e insuflação em plano anatômico incorreto.
- D Geralmente é autolimitada e pode ser reduzida por compressão manual do escroto antes de ser retirado o último trocarte.
- E É grave e de alto risco para o paciente, evoluindo comumente para gangrena escrotal e sepsse.

**QUESTÃO 29**

Uma paciente com 56 anos de idade será submetida a tratamento de incontinência urinária (por insuficiência esfíncteriana intrínseca) pela técnica de *sling* pubovaginal e correção de retocele. O objetivo do reparo perineal durante a correção da retocele é reconstruir o tendão central do períneo e aproximar, ao nível da linha média, os músculos

- A transversos do períneo.
- B isquiocavernosos.
- C obturadores internos.
- D pubococcígeos.
- E bulbocavernosos.

**QUESTÃO 30**

Mundialmente, tem sido observado um declínio na espermatogênese, especialmente em homens expostos a fatores de risco ambientais e ocupacionais. Os fatores considerados de risco para toxicidade reprodutiva incluem

- I indústrias de tintas, pintura e impressão, que produzem éter glicol e outros solventes orgânicos.
- II indústria de extração e produção de metais pesados, como cádmio e mercúrio.
- III agricultura com uso de agrotóxicos que contenham estrógenos sintéticos, como DDT e cloropropano.
- IV esporte profissional, como ciclismo, motociclismo e equitação.
- V indústria petroquímica, que produz benzeno.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

**QUESTÃO 31**

Com referência ao refluxo vesicoureteral, assinale a opção correta.

- A Pacientes com estenose de junção pieloureteral não apresentam refluxo vesicoureteral ipsilateral associado.
- B Estudos experimentais sugerem que o refluxo de baixo grau, sem infecção, não é normalmente capaz de provocar o aparecimento de cicatrizes renais, fato que também se observa na prática clínica.
- C A nefropatia de refluxo raramente determina o aparecimento de hipertensão arterial.
- D O melhor exame de imagem para acompanhamento clínico de uma criança com refluxo de grau II é a uretrocistografia miccional.
- E Pacientes grávidas, tratadas de refluxo na infância e que tenham cicatrizes renais, não apresentam, durante a gravidez, risco de complicações, como pielonefrite aguda ou aborto, acima do normal.

**QUESTÃO 32**

A litíase urinária é uma doença comum, de etiologia multifatorial e com várias formas de apresentação clínica. Acerca dos cálculos urinários, assinale a opção **incorreta**.

- A A identificação de pacientes de alto risco metabólico diminui a necessidade de múltiplas intervenções cirúrgicas.
- B Em países industrializados, a incidência global de litíase urinária varia entre 10% e 15% da população.
- C De maneira geral, todos os pacientes com litíase urinária devem manter boa hidratação oral (volume urinário em 24 h maior que 2.000 mL), restrição de sódio e proteínas de origem animal e, especialmente, rigoroso controle da ingestão de cálcio.
- D O estudo metabólico em pacientes com litíase urinária recorrente pode identificar a(s) causa(s) do distúrbio em até 90% dos pacientes.
- E A tomografia computadorizada helicoidal sem contraste é atualmente o exame de escolha em pacientes com suspeita clínica de cólica ureteral por cálculo.

**QUESTÃO 33**

Em relação à cirurgia renal minimamente invasiva, assinale a opção **incorreta**.

- A Quanto ao resultado, a pieloplastia laparoscópica é comparável à cirurgia aberta, em termos de eficácia, e à endopielotomia, em termos de morbidade.
- B Na presença de vasos polares cruzando a junção pieloureteral, os resultados da endopielotomia são inferiores aos da cirurgia aberta.
- C Pacientes sintomáticos com cálculos em divertículos caliciais podem ser tratados por via retrógrada por meio de ureteroscopia flexível.
- D A ressecção endoscópica no manuseio de tumores transicionais do trato superior pode ser indicada em pacientes monorrenais (anatômico ou funcional), com insuficiência renal, tumores bilaterais ou co-morbidades clínicas severas.
- E Em paciente com rim policístico de grande volume e insuficiência renal crônica terminal, a nefrectomia laparoscópica comprovou ser tecnicamente mais simples e com melhores resultados que a cirurgia aberta.

**QUESTÃO 34**

Em relação ao tratamento cirúrgico do câncer prostático, assinale a opção correta.

- A A invasão perineural identificada na biópsia pré-operatória não tem importância prognóstica comprovada e não apresenta correlação com doença extraprostática.
- B São contra-indicações absolutas para a prostatectomia radical com preservação do feixe neurovascular da ereção: doença localmente avançada, impotência pré-operatória e pacientes com PSA pré-operatório maior que 20 ng/mL ou doença palpável no ápice prostático.
- C Homens com tumores detectáveis ao toque retal não apresentam risco maior de acometimento do feixe neurovascular ipsilateral por neoplasia.
- D O estadiamento pré-operatório tem baixa correlação com prognóstico e recidiva da doença nos pacientes submetidos à prostatectomia radical e à linfadenectomia pélvica simultânea.
- E A hormonioterapia neoadjuvante diminui a vascularização prostática e a incidência de complicações vasculares nos pacientes a serem submetidos à prostatectomia radical.

**QUESTÃO 35**

A doença de Peyronie (DP), conhecida enfermidade causadora de deformidade peniana, pode receber tratamento clínico e(ou) cirúrgico. No referente a essa patologia, assinale a opção **incorreta**.

- A A terapia intralesional com interferon não comprovou qualquer benefício no tratamento da DP.
- B Com os recentes avanços no conhecimento da etiopatogenia da doença, vários fatores genéticos foram identificados juntamente com sua correlação com alguns subtipos de HLA.
- C Há grande associação entre DP e trauma local, com deposição de fibrina, injúria microvascular e formação da placa na túnica albugínea.
- D É bem clara a associação da DP com outras doenças do colágeno, como a doença óssea de Paget e a contratura palmar de Dupuytren.
- E Lesões com acentuada tortuosidade peniana, placa calcificada e com mais de um ano de evolução têm boa indicação para tratamento cirúrgico.

**QUESTÃO 36**

Em relação a pacientes grávidas com infecção urinária, julgue os itens que se seguem.

- I Gestantes com bacteriúria assintomática e passado de infecção urinária não devem ser tratadas e acompanhadas com uroculturas seriadas durante a gravidez, pelo maior risco de prematuridade, pré-eclâmpsia e anemia.
- II A investigação de possível litíase associada pode ser realizada com exames de radiação ionizante após o quarto mês de gestação, sem acarretar riscos de má-formação fetal.
- III Na recorrência de infecção urinária sintomática após tratamento adequado em gestantes, não há indicação de antibioticoprofilaxia durante a gestação, mesmo em paciente com bacteriúria.
- IV O risco de ocorrência de pielonefrite aguda e anemia associada está afastado.
- V Em casos de pielonefrite aguda, a ausência de melhora 72 h após o início de terapia antibiótica sistêmica (de preferência parenteral) indica necessidade de estudos de imagem para descartar uropatia obstrutiva.

Estão certos apenas os itens

- A I e III.
- B I e IV.
- C II e IV.
- D II e V.
- E III e V.

**QUESTÃO 37**

Em um paciente com 58 anos de idade, assintomático, que compareceu a consulta para *check-up*, foi identificada, mediante tomografia computadorizada, lesão sólida, de 2 cm, na periferia do parênquima renal, aparentemente não comprometendo os planos perirrenais. Acerca dos fatores etiológicos e do tratamento de lesões semelhantes, assinale a opção correta.

- A A nefrectomia parcial em tumores localizados apresenta taxas de sobrevida e controle da doença a longo prazo inferiores às da nefrectomia radical.
- B A existência de tumores multifocais em até 20% dos casos contra-indica cirurgias de preservação do parênquima renal.
- C Em casos de lesões bilaterais e de ocorrência familiar, devem ser pesquisadas doenças específicas, como Von Hippel-Lindau e lesões tumorais em outros órgãos.
- D A nefrectomia parcial laparoscópica não é possível sem o controle adequado do pedículo vascular.
- E A punção por biópsia percutânea, guiada por ultra-som ou tomografia computadorizada, está absolutamente contra-indicada, em função do alto risco de implante de células malignas no trajeto da agulha de punção.

**QUESTÃO 38**

Um paciente, com 23 anos de idade, vítima de acidente de motocicleta, apresenta fratura pélvica e uretrorragia. A avaliação por imagem mais adequada no seu atendimento imediato deve ser feita por

- A uretrossonografia.
- B uretrocistografia retrógrada e miccional.
- C uretrocistoscopia.
- D ressonância nuclear magnética.
- E urografia excretora e cistografia miccional.

**QUESTÃO 39**

A respeito do diagnóstico e do tratamento do câncer superficial de bexiga, assinale a opção correta.

- A Os tumores próximos ao meato ureteral devem ser ressecados completamente, especialmente em pacientes com ureterohidronefrose associada.
- B A citologia urinária tem baixa especificidade com muitos resultados falso-positivos.
- C A ablação de tumores vesicais localizados na cúpula da bexiga é possível com hólmio:YAG *laser* e não implica nenhum risco de perfuração ou lesão de alça intestinal.
- D A expressão do gene p53 comprovou ser importante fator prognóstico em pacientes com tumores superficiais.
- E O uso de BCG tópico determina menores taxas de recorrência e sobrevida que outros agentes, como a mitomicina C ou o thiotepa.

**QUESTÃO 40**

Em 1883, Fournier descreveu uma fascíte necrotizante rapidamente progressiva do pênis e escroto de cinco pacientes. Desde então, inúmeros casos foram descritos na literatura e vários estudos etiológicos e terapêuticos também foram desenvolvidos. Acerca dessa doença, assinale a opção **incorreta**.

- A A apresentação clínica é variável, mas habitualmente surgem dor local, hiperemia, sinais flogísticos e, em muitos casos, necrose da pele peniana e escrotal.
- B A morbimortalidade é alta, especialmente em idosos com doença renal crônica e em pacientes com grandes extensões de tecido acometido.
- C Comumente, a bexiga, o reto e os testículos são preservados devido a sua vascularização não-perineal.
- D A cobertura antibiótica deve incluir medicações que atinjam bactérias aeróbias, gram-positivas e gram-negativas, e anaeróbias.
- E A eficácia da oxigenoterapia hiperbárica, comprovada por vários estudos multicêntricos randomizados e controlados, reforça sua aplicação como tratamento de primeira linha.