

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com base nas regras mínimas para o tratamento de pessoas presas, conforme estabelecido pela Organização das Nações Unidas, julgue os itens a seguir.

- 51** Na hipótese de um recluso estar doente e necessitar de cuidados especializados, deverá ser providenciada sua transferência para um estabelecimento especializado ou para um hospital civil.
- 52** Caso haja tentativa de fuga de um preso, o servidor do estabelecimento penitenciário poderá fazer uso de força contra o recluso com o objetivo de impedir sua fuga.

A respeito dos direitos humanos à luz da Constituição Federal de 1988, julgue os itens que se seguem.

- 53** É possível a concessão de mandado de segurança na hipótese de um preso sofrer, por abuso de poder, violência em sua liberdade de locomoção.
- 54** Os condenados devem cumprir suas penas em estabelecimentos distintos, considerando-se a idade e o sexo do apenado e a natureza dos delitos.
- 55** Ao preso pode ser negado o acesso à identificação dos responsáveis por sua prisão por decisão da polícia ou para preservar a segurança dos envolvidos.

Acerca do eixo orientador IV do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), que trata de segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, julgue os próximos itens.

- 56** Constitui um objetivo estratégico do eixo orientador IV a promoção dos direitos humanos dos profissionais do sistema de segurança pública, assegurando sua formação continuada e compatível com as atividades que exercem.
- 57** No eixo orientador IV, é disposta diretriz para a participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal; a diretriz para o combate à violência institucional não é, contudo, abrangida por esse eixo.
- 58** O eixo orientador IV parte do pressuposto de que a realidade brasileira segue sendo gravemente marcada pela violência e por severos impasses estruturais na área da segurança pública.

A respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue os itens abaixo.

- 59** Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
- 60** A vítima de perseguição em seu país legitimamente motivada por crime de direito comum pode invocar o direito de procurar e de gozar asilo em outros países.

Com relação à anatomia e à fisiologia humana, julgue os itens que se seguem.

- 61** No processo de divisão celular, a mitose resulta em quatro células geneticamente diferentes, havendo redução do número de cromossomos.
- 62** Os ossos longos, como o fêmur, são constituídos por duas extremidades (epífises) e pelo corpo (diáfise); entre a diáfise e cada epífise, situa-se a metáfise.

Um tecido é um conjunto de células especializadas, iguais ou diferenciadas entre si, separadas ou não por líquidos e substâncias intracelulares, que realizam determinada função em um organismo multicelular. Julgue os itens seguintes, a respeito da histologia dos tecidos.

- 63** A função do epitélio é o revestimento da superfície externa do corpo (pele), além do revestimento dos órgãos e cavidades corporais internas.
- 64** O sangue é um tecido conjuntivo constituído por células diferenciadas (hemácias, leucócitos e plaquetas) e por plasma, o qual é composto por água, sais minerais e diversas proteínas.

A administração de medicamentos é um dos deveres de maior responsabilidade da equipe de enfermagem. Antes da administração, deve-se observar a regra dos sete certos: prescrição certa, leito certo, cliente certo, medicamento certo, via certa, dose certa e hora certa. A respeito da via de administração de medicamentos, julgue os itens a seguir.

- 65** Para a administração de medicamentos por via intradérmica e por via subcutânea devem ser utilizadas seringas de 3 mL.
- 66** Na via intravenosa, a absorção do medicamento ocorre de forma constante e lenta.

Acerca das doenças causadas por parasitas, julgue os próximos itens.

- 67** A giardíase é uma doença causada pelo protozoário *Entamoeba histolytica*, sendo transmitida, principalmente, pelo contato sexual.
- 68** A malária é transmitida pelo mosquito infectado com protozoários do gênero *Plasmodium*.

Biossegurança refere-se à condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, a animal e o meio ambiente. Julgue o item abaixo, a respeito da biossegurança em saúde.

- 69** Resíduos perfurocortantes devem ser descartados em uma caixa apropriada (rígida e impermeável). Essa caixa deve ser lacrada ao se atingir dois terços de sua capacidade e rejeitada dentro de saco branco do lixo infectante até seu recolhimento.

Julgue o item seguinte, acerca do controle das infecções relacionadas à assistência à saúde.

70 Os produtos para saúde não críticos são aqueles que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas.

O cuidado adequado com o recém-nascido é fundamental para a redução do índice de mortalidade neonatal, responsável por quase 70% das mortes no primeiro ano de vida, conforme dados do Ministério da Saúde. Doenças cardiovasculares e endócrinas, por exemplo, quando detectadas inicialmente, podem ser controladas ou tratadas. Acerca de distúrbios metabólicos da glicose e de distúrbios eletrolíticos em recém-nascidos, julgue os itens a seguir.

71 Para a prevenção da hipoglicemia, deve-se estar atento aos grupos de risco, que incluem recém-nascidos prematuros e nascituros de tamanho desproporcional para a idade gestacional.

72 A hipoglicemia é de fácil detecção, uma vez que tem sintomatologia bem definida, como sinais de cianose, sucção vigorosa, hipertonia, poliúria e agitação.

73 A hipocalcemia tardia em recém-nascidos está associada às baixas dos depósitos de cálcio, mais frequentes em recém-nascidos a termo, devendo ser corrigida com injeções intramusculares de gluconato de cálcio.

74 A hipoglicemia — diminuição dos níveis de glicose sanguínea — em recém-nascidos deve ser identificada o quanto antes, uma vez que a rápida correção da taxa de glicose pode evitar danos neurológicos graves.

Um homem de quarenta e sete anos de idade deu entrada em uma unidade de pronto-socorro após sofrer trauma automobilístico. O paciente chegou acompanhado de uma equipe de atendimento especializado pré-hospitalar que, após empregar as medidas de avaliação primária, fez imobilização cervical completa e controle ventilatório com máscara facial. Na admissão, foi realizada avaliação do paciente e confirmado traumatismo craniocéfálico (TCE). Após algumas horas, o paciente evoluiu com perda da consciência (escore 5 na escala de coma de Glasgow) e instabilidade hemodinâmica.

Considerando o caso clínico acima apresentado e os cuidados devidos em casos de trauma, julgue os itens de **75** a **78**.

75 As medidas de avaliação primária instituídas durante o atendimento pré-hospitalar constituem-se de exame físico detalhado da cabeça aos pés e reavaliações dos sinais vitais.

76 A imobilização cervical feita no paciente durante o atendimento pré-hospitalar indica que a equipe de atendimento já suspeitava de TCE. O equipamento usado na estabilização da coluna restringiu-se ao colar cervical, com o intuito de impedir os movimentos de lateralidade da cabeça.

77 As condutas habituais a serem tomadas no pronto-socorro incluem manter o paciente aquecido e com as vias aéreas desobstruídas, fornecer oxigenação prescrita, verificar os sinais vitais periodicamente, puncionar veia calibrosa e observar e relatar sinais de choque hipovolêmico ou sinais de mudança no padrão de consciência.

78 Os parâmetros utilizados na escala de coma de Glasgow envolvem capacidade de resposta pupilar e respostas verbal e motora. No caso descrito, o escore identificado é considerado moderado.

A respeito dos cuidados de enfermagem com indivíduos com transtorno bipolar do humor, julgue os itens seguintes.

79 A equipe de enfermagem pode servir de elo entre o indivíduo com transtorno bipolar e a família, esclarecendo os familiares acerca da doença e orientando sobre como lidar com o paciente.

80 A fase da mania caracteriza-se pela exaltação do humor, inquietação e alegria exagerada, sendo necessário envolver o paciente em atividades que exijam concentração, além de estimulá-lo a ficar em ambientes mais agitados.

81 Devido ao alto risco de suicídio em pacientes com depressão, o profissional de enfermagem deve, especialmente na fase inicial desta, afastar objetos de risco do paciente e mantê-lo em isolamento.

Julgue os itens a seguir, relativos aos cuidados de enfermagem e às orientações à puérpera.

82 A secreção eliminada pela vagina tem aspecto sanguinolento nos primeiros dias após o parto, devendo-se observar seu volume e suas características, como aspecto e odor.

83 Para que a paciente possa conseguir deambular sem restrições, deve-se orientá-la a permanecer no leito, independentemente do tipo de parto, até que as dores cessem.

84 Na possibilidade de amamentação deve-se orientar a mãe quanto à melhor posição da criança, cuja barriga deve ser mantida junto ao corpo da mãe. Além disso, para uma pega correta, a criança deve abocanhar toda a região mamilo areolar.

85 Logo após o nascimento da criança, as mamas da mãe devem estar semitúrgidas e secretar o colostro, que não pode ser oferecido à criança caso a mãe seja soropositiva para HIV.

Um jovem de vinte e dois anos de idade, com diabetes do tipo I, após quadro infeccioso, foi internado com sintomatologia de cetoacidose diabética, que progrediu em poucas horas, conforme relato da mãe, que o acompanhava. O paciente encontrava-se sonolento e letárgico, com pulso rápido e fraco, além de hipotensão e hiperventilação. Os níveis sanguíneos e urinários de cetona estavam elevados. O médico prescreveu reidratação parenteral, restauração de eletrólitos e infusão venosa de insulina. Após algumas horas, houve queda dos níveis séricos de potássio.

Considerando o caso clínico acima apresentado e os cuidados necessários para pacientes com distúrbios endócrinos, julgue os itens subsequentes.

- 86** Infere-se do caso clínico que a insulina prescrita pelo médico é aquela conhecida como insulina protamina zinco, de ação rápida, com aspecto esbranquiçado.
- 87** Níveis elevados de cetona podem provocar sinal característico da cetoacidose diabética: o hálito cetônico.
- 88** A reposição de eletrólitos deve ser feita por via subcutânea, tendo-se especial atenção no preparo, com técnica rigorosamente asséptica e aplicação, preferencialmente, no antebraço.

A respeito da assistência de enfermagem prestada a paciente submetido a prostatectomia, julgue os itens seguintes.

- 89** Após o procedimento cirúrgico, o profissional de enfermagem deve orientar o paciente a permanecer preferencialmente na posição de Fowler, a fim de reduzir o risco de complicações hemorrágicas, e disponibilizar ao paciente alimentos com poucas fibras, evitando nutrientes laxativos ou emolientes para diminuir o trânsito intestinal, poupando-o, assim, do desconforto evacuatório.
- 90** No pré-operatório, não é recomendado o uso de sonda vesical de demora ou cistostomia, visto que o esvaziamento da bexiga antes do procedimento gera riscos de lesão desse órgão. Por esse motivo, é recomendada a retirada desses equipamentos pelo menos 24 horas antes da cirurgia.
- 91** Na preparação do paciente antes da cirurgia, deve-se auxiliá-lo a colocar meias de compressão elástica, quando indicado, pois estas são importantes na prevenção de trombose venosa profunda.
- 92** No pós-operatório, deve-se observar o fluxo de urina pela sonda vesical de demora instalada, sendo proibida a irrigação dessa sonda por motivos de prevenção de infecção urinária.

O Ministério da Saúde, desde o ano de 2003, elegeu a tuberculose como problema prioritário de saúde pública, tendo emvidado, desde então, esforços na implementação de tratamento diretamente observado. Acerca desse tema, julgue os itens a seguir.

- 93** Na prova tuberculínica, realizada por via intradérmica, no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo, deve-se observar a formação de uma pápula pálida e de limites precisos.
- 94** São atribuições do técnico de enfermagem a identificação dos sintomáticos respiratórios, a orientação na coleta do escarro, a convocação dos contatos para a consulta médica, a notificação dos casos suspeitos e a observação dos cuidados básicos de redução da transmissão do bacilo da tuberculose.
- 95** A investigação da infecção tuberculosa latente em profissionais de saúde deve ser feita periodicamente, por meio de prova tuberculínica (PT), sendo necessária a revacinação por BCG e instituição do tratamento nos casos de valores superiores a 10 mm na PT.

Com relação às unidades de saúde nas instituições prisionais, julgue os próximos itens. Nesse sentido, considere que a sigla SUS, sempre que empregada, refere-se ao Sistema Único de Saúde.

- 96** Embora no sistema prisional as ações de promoção da saúde e de atenção no nível básico não contemplem imunizações, há garantia de assistência farmacêutica básica, saúde mental e coleta de material biológico para realização de exames laboratoriais.
- 97** Nas unidades prisionais, compete ao técnico de enfermagem implementar ações e serviços de atenção básica, bem como de média e de alta complexidade em saúde.
- 98** O técnico em enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, deverá atuar junto à equipe interdisciplinar de saúde da unidade prisional, articulado a redes assistenciais de saúde, com participação no planejamento das ações de promoção e vigilância sanitária e epidemiológica à saúde e em consonância com as diretrizes políticas do SUS.
- 99** O acolhimento é uma etapa da política de humanização do SUS que favorece a construção de uma relação de confiança e compromisso dos usuários com os profissionais de saúde.
- 100** A inclusão da população prisional no SUS requer o fortalecimento das ações que integram a saúde e a justiça para melhor estabelecimento dos princípios da equidade, integralidade e universalidade.

Julgue os itens a seguir, acerca da promoção e vigilância à saúde no sistema prisional.

- 101** Em caso de suspeita de tuberculose, a coleta de escarro para o exame de baciloscopia deve ser realizada por meio de três amostragens coletadas no primeiro contato do usuário na unidade de saúde.
- 102** O Programa Nacional de Imunizações preconiza que, para a estocagem e manutenção da qualidade dos imunobiológicos, a temperatura interna das geladeiras da sala de vacinação da unidade de saúde deve ser graduada entre +2 °C e +8 °C. A equipe de enfermagem é responsável pela realização da leitura diária da temperatura desses equipamentos no início e no final da jornada de trabalho.
- 103** A esquistossomose, a sífilis e a poliomielite não são consideradas doenças infecciosas, portanto, não são transmissíveis.
- 104** A tuberculose é um grande problema de saúde pública no sistema prisional, logo a investigação de pessoas com tosse prolongada deve ser uma estratégia priorizada nos serviços de saúde.

Julgue os itens de **105** a **113**, acerca da atenção à saúde materno-infantil.

- 105** A hipertensão arterial, manifesta-se comumente no período gestacional, sendo dispensável o relato desse tipo de ocorrência à equipe de saúde.
- 106** Durante o período pré-natal, a mulher gestante deve receber cuidados básicos, como a testagem de sífilis e HIV, ações educativas relativas às consultas e à vacinação e o controle do peso corporal.
- 107** A rede Cegonha objetiva fomentar um novo modelo de atenção à mulher e à criança de 0 a 24 meses, com foco no pré-natal, no parto, no nascimento, no crescimento e no desenvolvimento da criança.
- 108** Entre as ações preventivas para redução da transmissão vertical do HIV, entre mãe e filho, está o aconselhamento de não amamentação, pois o aleitamento materno representa um risco adicional que se renova a cada exposição da criança ao leite materno da mãe infectada.
- 109** Na UTI neonatal, o recém-nascido prematuro, com peso inferior a 1.250 g, deve receber, como cuidados essenciais, higiene corporal diária e o monitoramento de oximetria, de frequência cardíaca, de glicemia e da medida antropométrica.
- 110** Os serviços de saúde devem estar organizados para atender a princípios que norteiam o Estatuto da Criança e do Adolescente, como o acompanhamento dos pais no momento da internação, o recebimento de vacinação para prevenção de doenças, o teste do pezinho e a garantia de aleitamento dos bebês com leite humano ou artificial.

- 111** Durante as consultas realizadas na unidade básica de saúde é recomendado o registro dos dados antropométricos (peso, altura e perímetro cefálico) no prontuário da criança, de forma intercalada, para a avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança.
- 112** Cabe à equipe de saúde orientar à mãe sobre o aleitamento materno, o qual deve ser exclusivo até os quatro meses de idade da criança, ou seja, durante esse período, o bebê não deve receber nenhum alimento complementar.
- 113** O atendimento da criança hospitalizada requer determinadas ações, como a utilização de técnicas de desinfecção, assepsia e antisepsia para proteção contra infecções e medidas para garantia da segurança física e psicológica da criança.

Julgue os itens subsequentes, relativos a cuidados, procedimentos e situações clínicas.

- 114** No atendimento de um paciente com suspeita de dengue, deve ser investigada a data do início dos sintomas, a ocorrência de febre alta e a existência de, no mínimo, dois dos seguintes sintomas: cefaleia, anorexia, dor retro-orbitária, mialgia e artralgia, exantema e diarreia associada à epidemiologia compatível.
- 115** Para aferição da pressão arterial o paciente deve estar sentado, com as pernas cruzadas, pés apoiados no chão, dorso alinhado, braço apoiado, palma da mão voltada para cima e cotovelo estendido.
- 116** Ao se atender pacientes em estado de urgência, todas as normas de biossegurança devem ser utilizadas, sendo dispensável apenas o uso de luvas, desde que a higiene das mãos tenha sido previamente realizada.
- 117** No atendimento a uma paciente com traumatismo craniocéfálico em uma unidade de terapia intensiva, é função do técnico de enfermagem manter as vias aéreas da paciente livres por meio da aspiração orotraqueal, manter a cabeça da paciente em decúbito elevado e alinhada, atentar para crises convulsivas, monitorar a pressão arterial e a respiração e observar o nível de consciência da paciente. Se houver qualquer alteração, caberá ao técnico, ainda, informar ao médico ou enfermeiro responsável.
- 118** O paciente com síndrome da abstinência alcoólica pode apresentar cefaleia, náuseas, sensibilidade visual, tremores finos de extremidades, insônia, agitação psicomotora e, nos casos mais graves, alucinações e crises convulsivas.
- 119** As principais recomendações não medicamentosas para prevenção primária da hipertensão arterial sistêmica são a realização de atividade física rotineira, o controle do tabagismo e a manutenção de uma alimentação composta de alimentos ricos em gordura saturada, mas com baixa quantidade de sódio.
- 120** Os pacientes com diabetes melito do tipo I devem ser orientados quanto à realização de atividade física por, no máximo, duas vezes na semana, à utilização de calçados fechados, à redução de carboidratos na alimentação e ao controle semanal da glicemia de jejum.

PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, no local apropriado, pois **não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido**.
- Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
- Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
- Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até **20,00 pontos**, dos quais até **1,00 ponto** será atribuído ao quesito apresentação e estrutura textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

O princípio da individualização da pena é direito subjetivo dos condenados, previsto no art. 5.º da Constituição Federal. Trata-se de garantia fundamental para que se alcance a recuperação social e moral dos presos, a qual guarda estreita relação com o princípio da dignidade da pessoa humana. A Lei de Execução Penal coaduna-se com os ideais individualizadores, sendo muitos os institutos previstos por ela para que assim se proceda.

In: Intertem@s, ISSN 1677-1281, vol. 17, n.º 17, 2009 (com adaptações).

Considerando a Lei de Execução Penal e o fragmento de texto acima, que tem caráter unicamente motivador, redija texto dissertativo que aborde, necessariamente, os seguintes tópicos:

- ▶ composição da Comissão Técnica de Classificação, responsável por classificar, nos estabelecimentos prisionais, os condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade segundo seus antecedentes e personalidade; [**valor: 6,00 pontos**]
- ▶ procedimentos a serem adotados pela Comissão Técnica de Classificação no exame para obtenção de dados relevantes da personalidade do preso; [**valor: 7,00 pontos**]
- ▶ abrangência da assistência à saúde do preso e do internado. [**valor: 6,00 pontos**]

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	