

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens subsequentes, com relação ao desenvolvimento e crescimento infantil.

- 41 Para auxiliar e orientar as famílias com recém-nascidos, é importante que a primeira consulta pediátrica ocorra ainda na primeira semana de vida do bebê.
- 42 Na anamnese pediátrica, avaliam-se, principalmente, as condições do nascimento da criança, como o tipo de parto, o local do parto, o peso ao nascer, a idade gestacional, o índice de Apgar e as intercorrências clínicas na gestação, no parto, no período neonatal e nos tratamentos realizados.
- 43 Doenças diarreicas no primeiro ano de vida são comumente associadas a mamadeiras mal higienizadas e à ocorrência de contaminações de alimentos complementares.
- 44 O teste do pezinho deve ser realizado a partir do décimo quinto dia de vida do recém-nascido, a fim de detectar hipotireoidismo, anemia falciforme, fenilcetonúria e fibrose cística.
- 45 A criança é considerada um recém-nascido desde o nascimento até completar 28 dias de vida.
- 46 Considera-se de baixo peso o recém-nascido que, ao nascer, possui peso menor que 3.000 g, o que, a depender da idade gestacional, eleva o risco de morbimortalidade.
- 47 No primeiro ano de vida do bebê, recomendam-se doze consultas de rotina. No segundo, duas e, a partir desse período, consultas anuais, que devem ocorrer próximas ao mês do aniversário da criança.

Julgue os itens a seguir, acerca da assistência de enfermagem ao recém-nascido.

- 48 A frequência cardíaca é o principal parâmetro que determina a indicação e a eficácia da reanimação.
- 49 O índice de Apgar entre 7 e 10 é considerado normal no quinto minuto após o nascimento do bebê.
- 50 A ventilação pulmonar é o procedimento mais complexo e menos adequado na reanimação do recém-nascido.
- 51 No nascimento — idade gestacional 37 semanas a 41 semanas —, o recém-nascido é considerado a termo quando está respirando ou chorando, com tônus muscular em flexão, sem líquido amniótico meconial e não necessita de qualquer manobra de reanimação.
- 52 Os equipamentos empregados para ventilar o recém-nascido em sala de parto compreendem o balão autoinflável, o balão anestésico e o ventilador mecânico manual em T.
- 53 A asfixia pode desencadear vasoconstrição periférica, hipoxemia tecidual, diminuição da contratilidade miocárdica, bradicardia e, eventualmente, parada cardíaca. A ventilação adequada do recém-nascido, na maioria dos pacientes, reverte esse quadro.
- 54 A exangüineotransfusão e a utilização de drogas capazes de acelerar o metabolismo são os tratamentos mais utilizados na hiperbilirrubinemia do recém-nascido.

Julgue os itens subsequentes, referentes à anamnese e ao exame físico.

- 55 É importante verificar a caderneta de vacinação nas consultas de rotina; caso haja intercorrências na aplicação, deverá ser feita a anotação no prontuário clínico.
- 56 A fenilcetonúria, um dos erros inatos do metabolismo, com padrão de herança autossômico recessivo, foi a primeira doença genética a ter tratamento estabelecido com terapêutica dietética específica.
- 57 O *milium* sebáceo é caracterizado por pequenos pontos brancos, localizados na base do nariz, queixo e da testa, originados pela presença de glândulas sebáceas obstruídas em função de hormônios maternos.
- 58 Os registros do peso, da estatura e do comprimento, bem como do perímetro cefálico da criança, aferidos nos gráficos de crescimento, não precisam ser utilizados em todas as consultas, estando as crianças de até dois anos de idade em risco ou não.
- 59 Verniz caseoso é o conjunto formado por pelos fininhos que geralmente recobrem a região do ombro. Eles são mais comuns em recém-nascidos prematuros e desaparecem em poucos dias.
- 60 Uma das causas mais comuns de diminuição da acuidade visual em crianças é a ambliopia.
- 61 A lavagem de mãos por todas as pessoas que têm contato com o bebê deve ser orientada em todas as visitas de puericultura, o que objetiva evitar a propagação de vírus causadores de doenças respiratórias.

Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), julgue os itens a seguir.

- 62 O ECA assegura o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde.
- 63 É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.
- 64 As crianças e adolescentes com deficiência receberão atendimento especializado promovido pelo Sistema Único de Saúde.

Acerca dos indicadores nas diferentes fases de crescimento e desenvolvimento, julgue os itens subsequentes.

- 65 A menarca expressa o desenvolvimento reprodutivo feminino e ocorre na puberdade.
- 66 Os estímulos ambientais influenciam tanto no período pré-natal quanto no pós-natal.
- 67 Na criança normossômica a relação entre o peso e a altura determina uma compleição harmônica.

A respeito dos cuidados do recém-nascido no parto e no nascimento, julgue os itens que se seguem.

- 68 Entre o quarto e o sétimo dia de vida, o bebê deve ser levado à sua unidade de saúde para fazer o teste do pezinho e receber as vacinas BCG e anti-hepatite B.
- 69 Após o parto, o recém-nascido em boas condições clínicas deve ser encaminhado, juntamente com a mãe, ao alojamento conjunto.
- 70 A fenda palatina é uma alteração que não dificulta a pega e ordenha do leite da mama para o recém-nascido.

A asma é uma das afecções crônicas mais comuns que afeta tanto crianças como adultos. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.

- 71 Uma criança de quatro anos de idade que chega ao serviço de saúde com tosse e sibilância, pela primeira vez, deve ser encaminhada ao programa de asma, pois, como o diagnóstico de asma em crianças menores de cinco anos de idade é eminentemente clínico, basta um episódio de sibilância para a criança ser considerada asmática.
- 72 Tosse relacionada com virose respiratória é uma manifestação clínica sugestiva de asma, pois a virose é um desencadeador do broncoespasmo.
- 73 O controle de tabagismo, nos familiares das crianças asmáticas, é importante medida ambiental, mais prioritária que o controle de ácaros.
- 74 Em crianças, a principal causa de morte na exacerbação da asma é o pneumotórax.
- 75 Nos casos de exacerbação clínica da asma em crianças, a oximetria de pulso deve ser adotada para a avaliação acurada da gravidade do caso, por ser um exame confiável.

Julgue os próximos itens, relativos à assistência de enfermagem à criança com diarreia.

- 76 De acordo com a Organização Mundial da Saúde, nas últimas duas décadas, ocorreu expressiva redução na mortalidade de crianças com idade inferior a cinco anos por diarreias infecciosas, em nível global.
- 77 Diarreia aguda persistente, que se estende por 14 dias ou mais e que pode provocar desnutrição e desidratação, constitui um grupo de diarreias com alto risco de complicações e de elevada letalidade.
- 78 Criança com três anos de idade, em bom estado, que apresenta diarreia de início abrupto deve ser tratada com soro oral e manutenção da alimentação habitual, pois a situação descrita é indicativa de etiologia infecciosa que durará em torno de 7 dias.
- 79 Atualmente, a solução para a terapia de reidratação parenteral recomendada é soro fisiológico e soro glicosado 5%, em partes iguais.
- 80 O zinco tem ação bacteriostática, razão pela qual deve ter administração regular, para reduzir, na criança, a duração do quadro de diarreia infecciosa e de consequente desnutrição.
- 81 A prevenção da desnutrição passa pela prevenção da diarreia infantil por meio da adoção de medidas como o acesso a saneamento básico, a imunização contra infecções por rotavírus e sarampo, o incentivo ao aleitamento natural prolongado, a introdução de suplementação de vitamina A, entre outras.

Com relação a situações de violência contra crianças, julgue os seguintes itens.

- 82 Cobranças e punições exageradas são formas de violência psicológica que podem trazer graves danos ao desenvolvimento da criança.
- 83 **Situação hipotética:** Uma criança que estava chorando muito foi levada pela mãe a um serviço de saúde, a qual relatou que a criança foi agredida pelo pai por ter tido baixo rendimento escolar. No exame, não foram observadas lesões corporais. **Assertiva:** Nessa situação, os fatos descritos não permitem considerar que tenha havido violência física contra a criança.
- 84 Para a caracterização do ato de pedofilia, é necessária alguma forma de contato físico com criança.
- 85 Considera-se uma forma de violência a situação em que a criança apresenta hemorragia de retina decorrente de ter sido sacudida pela pessoa cuidadora porque chorava muito.

A respeito da suplementação de nutrientes para as crianças, julgue os itens subsequentes.

- 86 Com a finalidade de promoção primária à saúde do binômio mãe e filho, o Programa Nacional de Suplementação de Ferro consiste na suplementação medicamentosa de hidróxido de ferro para as crianças de seis a dezoito meses de idade, as gestantes a partir da 20.^a semana e as mulheres até o 3.^o mês pós-parto.
- 87 Ainda que a prevalência da anemia por deficiência de ferro seja alta no mundo, é considerada, nos dias atuais, uma carência em regressão em todos os segmentos sociais, principalmente em crianças menores de dois anos e em gestantes.
- 88 A orientação dietética à família da criança que recebe suplementação de ferro é evitar o consumo de alimentos ricos em cálcio, que interfere negativamente na absorção do ferro dos alimentos, ao passo que o consumo de alimentos ricos em vitamina C, como as frutas cítricas, favorece a absorção do ferro contido nos alimentos de origem vegetal.
- 89 Evidências científicas do impacto da suplementação com vitamina A em crianças, independentemente da idade, apontam para a redução do risco global de morte por diarreia e de morte por todas as causas em crianças com HIV positivo.
- 90 O leite materno fornece a quantidade de vitamina A que as crianças precisam nos seis primeiros meses de vida, quando é oferecido de forma exclusiva.
- 91 Para o devido controle da administração de vitamina A por parte dos serviços de saúde, é suficiente o registro do número de doses administradas na caderneta de saúde e no prontuário da criança.

No que se refere a doenças prevalentes na infância e na adolescência, julgue os itens subsecutivos.

Espaço livre

- 92 Os critérios de diagnóstico de infecção urinária na criança, por meio de exame complementar, dependem do método utilizado para a coleta da urina.
- 93 A ingestão de pequenas doses de leite de vaca durante os primeiros dias de vida pode aumentar o risco de alergia ao leite de vaca, além da incidência de doenças atópicas no futuro, o que é evitado se a criança é submetida ao aleitamento materno exclusivo.
- 94 Deve ser solicitado exame de urina para a investigação de infecção urinária quando o lactente apresentar febre, irritabilidade, vômito, diarreia e desaceleração do crescimento pômdero-estatural.
- 95 A monitoração do excesso de peso em relação à altura não é um indicador válido para o diagnóstico de obesidade infantil, já que o indicador recomendado pelo Ministério da Saúde é a relação do peso com a idade.
- 96 As alterações da pele na dengue estão relacionadas à presença de petéquias, e não de exantemas.
- 97 Uma criança imigrante de oito anos de idade que apresenta quadro clínico compatível com sarampo deverá ser afastada da escola a partir do momento que apresentar exantema.
- 98 No sarampo, febre por mais de 3 dias, após o aparecimento do exantema, é sinal de alerta, pois pode indicar o aparecimento de complicações, como infecções respiratórias, otites, doenças diarreicas e neurológicas.
- 99 Entre as formas ectópicas da esquistossomose, a mais grave é a neuroesquistossomose, caracterizada pela presença de ovos e de granulomas esquistossomóticos no sistema nervoso central.
- 100 Os geo-helminthos que causam maior carga de morbidade e para os quais existem técnicas de diagnóstico e medidas de controle comprovadamente viáveis são o *Ascaris lumbricoides*, o *Trichuris trichiura* e os ancilostomídeos *Ancylostoma duodenale* e *Necator americanus*.