

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com relação a intervenções de profissionais de enfermagem em comunidades consideradas de risco social, julgue os itens a seguir.

- 41 **Situação hipotética:** Em atendimento pelo programa de saúde domiciliar, uma mãe de baixa renda relatou ao enfermeiro temor de perder o poder familiar sobre o filho, devido a sua condição econômica. **Assertiva:** O enfermeiro deverá informá-la de que a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para perda ou suspensão do poder familiar.
- 42 Pai preso em regime fechado apenas perderá o poder familiar do filho se o crime pelo qual responde tiver sido cometido contra a vida de terceiros.
- 43 No processo de adoção, tutela ou guarda, irmãos consanguíneos serão prioritariamente acolhidos por famílias substitutas diferentes, visando-se agilizar as adoções.
- 44 É proibida a contratação de menores de quatorze anos de idade para trabalhar em estabelecimento comercial, salvo na condição de aprendiz.
- 45 Uma criança com deficiência deve ser matriculada, preferencialmente, em escola especial destinada à educação de crianças com deficiência.

Acerca dos cuidados ao recém-nascido hospitalizado, julgue os itens que se seguem.

- 46 **Situação hipotética:** Um recém-nascido com quadro de asfixia foi entubado e colocado em ventilação sob pressão positiva ainda na sala de parto e deverá receber medicação via cateterismo umbilical. **Assertiva:** Para evitar infecção hospitalar, esse procedimento deverá ser realizado na unidade de terapia intensiva neonatal, pois é contraindicado manter material utilizado para esse tipo de procedimento na sala de parto.
- 47 **Situação hipotética:** Um recém-nascido de parto normal chorou ao nascimento, mas apresentou como única intercorrência uma cianose discreta, por isso foi colocado sob monitorização de oxímetro. Após dois minutos de monitorização, verificou-se saturação de O₂ de 89%. **Assertiva:** O recém-nascido deverá receber oxigenoterapia.
- 48 Logo após o parto normal de um recém-nascido a termo com boa vitalidade, o procedimento correto é secá-lo e, imediatamente, realizar o clampeamento umbilical, para, então, colocá-lo para mamar.
- 49 O baixo peso do recém-nascido (< 2.500 g) é o fator de risco isolado mais importante para a mortalidade infantil.
- 50 **Situação hipotética:** Foi prescrita para um recém-nascido sob oxigenoterapia com concentração de O₂ de 80% e fluxo de 8 litros a redução da concentração de FiO₂ para 60%. **Assertiva:** Nesse caso, deverá ser mantido o fluxo, mas com 4 litros de O₂ e 4 litros de ar ambiente.
- 51 Apesar de não possuírem eficácia comprovada, intervenções não farmacológicas, como sucção não nutritiva e administração de substâncias adocicadas por via oral, têm sido recomendadas para o alívio e o manejo da dor durante procedimentos relacionados à dor aguda em recém-nascidos.

Acerca do crescimento e do desenvolvimento da criança e do adolescente, julgue os itens subsequentes.

- 52 Não há necessidade de se encaminhar a um dentista uma criança que, até dez meses de idade, não tenha apresentado erupção dentária.
- 53 A saúde mental dos adolescentes está relacionada com determinantes da saúde mental na infância, que, por sua vez, estão associados a fatores maternos, como níveis elevados de ansiedade, baixa escolaridade e múltipara.
- 54 O aspecto afetivo é de extrema importância para o desenvolvimento da criança nos dois primeiros anos de vida, quando é especialmente caracterizado pelo apego aos familiares, que é o vínculo afetivo básico.
- 55 Criança que apresente crise convulsiva febril associada à vacina tríplice DTP não deverá completar o esquema vacinal para as doenças abrangidas por essa vacinação, devido ao risco de lesões neurológicas.

Julgue os próximos itens, relativos ao Estatuto da Criança e do Adolescente e ao Marco Legal da Primeira Infância.

- 56 A tendência mundial é de que mães presas tenham o direito de ficar acompanhadas de seus filhos na prisão, durante a primeira infância e enquanto durar o cumprimento da pena, evitando-se separá-los para não interromper a amamentação.
- 57 O brincar é uma das características mais distintivas da primeira infância, entretanto estudos demonstram que o ensino cognitivo, durante toda a infância, tem mais relevância para o desenvolvimento da inteligência até a fase adulta.
- 58 Resultados de pesquisas sobre o desenvolvimento integral da primeira infância demonstram que o período mais crítico da vida da criança corresponde aos primeiros mil dias de vida.
- 59 Inicialmente, gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção deverão ser encaminhadas a serviços de saúde mental e de assistência social, cujo objetivo deve ser desestimulá-las a tomar tal decisão.
- 60 **Situação hipotética:** Após ter tido conhecimento de repetidas agressões físicas de pai contra filho adolescente, uma vizinha da família denunciou as agressões ao conselho tutelar. **Assertiva:** A medida legal a ser adotada nesse caso será afastar o adolescente do convívio familiar por, pelo menos, seis meses, alocando-o em instituição pública sob os cuidados da assistência social.
- 61 São proibidas quaisquer designações discriminatórias com relação à filiação de filhos havidos por adoção, aos quais são assegurados os mesmos direitos e as mesmas qualificações pertinentes a filhos que formam família com seus pais biológicos.

A respeito da atuação do profissional de enfermagem junto a crianças e adolescentes e suas famílias, julgue os itens subsecutivos.

- 62 **Situação hipotética:** Em visita domiciliar, um profissional de saúde se deparou com criança de dois meses de idade com quadro de febre, respiração rápida (acima de 60 movimentos respiratórios por minuto) e frequência cardíaca abaixo de 100 bpm. **Assertiva:** A criança deverá ser encaminhada, com urgência, ao serviço médico de referência.
- 63 O genograma retrata graficamente a história e o padrão familiar, além de proporcionar visão clara e ampla dos membros da família e de como se relacionam entre si.
- 64 A atenção básica em enfermagem assume um papel limitado para a saúde de crianças e de suas famílias em situações de violência, pois essas ações dependem prioritariamente de profissionais da segurança.
- 65 A elevada prevalência de parasitose é a principal causa de anemia em crianças de baixa renda menores de dois anos de idade.
- 66 O leite materno possui grande quantidade de ferro, além de alta biodisponibilidade, por isso é dispensável a suplementação de ferro à criança durante o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade.
- 67 O aumento da concentração de vitamina A no leite materno é atingido exclusivamente via suplementação vitamínica da mãe, uma vez que apenas a adoção de dieta com alimentos ricos em vitamina A é insuficiente para aumentar a disponibilidade desse nutriente no leite materno.
- 68 Observados os devidos cuidados, crianças de pele negra necessitam se expor à luz solar por tempo superior ao indicado para crianças de pele branca para produzir a mesma quantidade de vitamina D.
- 69 Para criança nascida a termo, com bom peso, e que esteja em aleitamento materno exclusivo, é totalmente dispensável qualquer suplementação vitamínica até os seis meses de idade.
- 70 A amamentação como método para confortar a criança e diminuir sua irritabilidade no horário de dormir deve ser incentivada por profissionais de enfermagem, mesmo porque o leite materno noturno tem a vantagem de proteger a criança contra fatores cariogênicos.

Com relação à prevenção de infecção hospitalar, julgue os itens a seguir.

- 71 Em pediatria, o risco de se adquirir infecção em ambiente ambulatorial tem a mesma importância que no ambiente hospitalar.
- 72 O uso de luvas descartáveis é a medida mais importante para se evitar a transmissão de microrganismos no ambiente hospitalar.
- 73 Paciente portador de doença infectocontagiosa de transmissão aérea, a exemplo da tuberculose em qualquer sítio, da varicela ou do sarampo, deve ser mantido em ambiente com ventilação especial, com pressão positiva e filtro.
- 74 Se uma criança internada com pneumonia necessita de nebulização, o nebulizador de pequeno volume deverá ser enxaguado com água estéril, desinfetado e secado após cada uso, mesmo que venha a ser reutilizado pelo mesmo paciente.

Uma jovem, com dezessete anos de idade, levou seu filho, que nasceu há dois meses, com trinta e cinco semanas e quatro dias de gestação, para ser avaliado em uma consulta de enfermagem na unidade básica de saúde mais próxima de sua casa.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

- 75 O enfermeiro atendente deverá encaminhar a criança para avaliação do pediatra, mesmo que ela não apresente qualquer alteração ao exame físico.
- 76 O enfermeiro atendente deverá indicar para a criança a primeira dose de suplementação de vitamina A.
- 77 Espera-se que a criança tenha ganhado pelo menos 2,5 kg desde o seu nascimento.
- 78 Não havendo qualquer intercorrência clínica, o retorno da criança ao serviço de enfermagem deverá ser agendado para um mês após essa consulta.

Um enfermeiro foi chamado para dar o primeiro atendimento às pessoas envolvidas em um grave acidente de trânsito. No local, encontra uma mulher de cerca de trinta anos de idade e uma criança de cerca de três anos de idade, ambas desacordadas. Ao exame inicial, a criança se mantém irresponsiva, com respiração agônica, frequência de pulso de 45 bpm e cianose em extremidades.

Com base nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens.

- 79 Aspirada a cavidade oral e constatada permeabilidade de via aérea, caso se decida por intubar a criança, deverá ser priorizada a intubação nasotraqueal, que apresenta menor incidência de complicações em crianças.
- 80 Deverão ser checados simultaneamente a respiração e o pulso central da criança, preferencialmente o carotídeo ou o femoral, por no máximo 10 segundos.
- 81 Deverão ser iniciadas as manobras de compressão torácica da ressuscitação cardiopulmonar.

Acerca do processo de enfermagem, julgue os itens que se seguem.

- 82 O processo de enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, incluindo serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, entre outros.
- 83 O processo de enfermagem envolve as seis seguintes fases, distintas e sucessivas: coleta de dados, histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação.
- 84 No processo de enfermagem, os técnicos de enfermagem são responsáveis pelas duas primeiras fases, podendo solicitar a supervisão de enfermeiros.

Acerca da prevenção de acidentes por submersão, um dos principais responsáveis por óbitos em menores de quatro anos de idade no país, julgue os seguintes itens.

- 85** A maior parte dos acidentes por submersão em crianças com menos de quatro anos de idade, ocorre no domicílio e é silenciosa.
- 86** Recomenda-se que piscinas e similares sejam cercados com anteparos de 1,8 m de altura e espaços entre as grades de até 20 cm.

Catarina, com doze anos de idade, foi levada pela mãe à unidade básica de saúde para vacinação. O enfermeiro percebe escoriações nos membros superiores de Catarina; a mãe relata que Catarina, nos últimos meses, vem se arranhando propositalmente nos braços e antebraços com frequência. A mãe afirma que pede à filha que não faça isso, mas Catarina responde que é apenas um hábito e que isso não lhe faz mal. Ao tomar a vacina, no entanto, chora muito reclamando de dor. A mãe informa também que Catarina tem chorado mais que o normal nos últimos meses.

Com referência a esse caso clínico hipotético, julgue os itens subsequentes.

- 87** O quadro apresentado por Catarina sugere violência do tipo sexual.
- 88** Catarina apresenta quadro de violência autoprovocada, classificada como estereotipada.
- 89** O quadro de Catarina sugere síndrome de Munchausen por Procuração.
- 90** Catarina deverá ser encaminhada para avaliação psicológica e, possivelmente, acompanhamento terapêutico.

João nasceu há quatro dias, de parto normal a termo, e foi encaminhado para avaliação no setor de hematologia pediátrica.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

- 91** Para a avaliação do hematócrito de João, deverá ser colhido sangue preferencialmente por meio de picada no calcanhar, método menos traumático.
- 92** Espera-se que a produção de eritropoietina de João esteja muito reduzida ou mesmo ausente, em face da pressão parcial de oxigênio em seu sangue arterial.
- 93** Espera-se que a concentração de hemoglobina de João caia gradualmente nos próximos dois ou três meses, o que se denomina anemia fisiológica da infância.

José, com trinta e quatro anos de idade, e Fátima, com trinta e três anos de idade, foram ao posto de vacinação e levaram seus filhos: Antônio, de quatro anos, e Maria, de quatro meses. Fátima fez o pré-natal corretamente durante as gestações dos filhos e seu cartão mostra ter recebido todas as vacinas recomendadas. José não se lembra de quando foi vacinado pela última vez e não possui cartão de vacinação. As crianças também tomaram todas as vacinas preconizadas em seu devido tempo, como consta em seus respectivos cartões de vacinação. Nenhum deles tem qualquer contraindicação para ser vacinado.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir, com base nas recomendações do programa nacional de imunização e calendário vacinal.

- 94** José deverá receber a primeira dose de vacina contra hepatite B, a dose única de vacina contra febre amarela, a primeira dose da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e uma dose da vacina dupla adulto (dT: difteria e tétano).
- 95** Fátima não necessita ser vacinada no momento.

- 96** Antônio deverá receber o segundo reforço da DTP (difteria, coqueluche e tétano) e da VOP (oral contra poliomielite) e a dose única da vacina contra varicela.

- 97** Maria deverá tomar a segunda dose da pentavalente, a segunda dose da vacina oral contra a poliomielite, a segunda dose da vacina pneumocócica conjugada e a primeira dose da vacina contra o rotavírus.

Lígia levou seu filho Marcos, de dois anos de idade, à unidade básica de saúde próxima de sua residência, e solicitou avaliação da equipe de saúde para seu filho. Relatou que ele não se comunica adequadamente, dorme mal e mostra sinais de agressividade. Ao exame, Mônica, enfermeira da unidade, percebe que Marcos não estabelece contato visual e permanece balançando o corpo para um lado e outro durante toda a consulta.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

- 98** O quadro de Marcos sugere diagnóstico de transtorno do espectro autista.
- 99** O quadro de Marcos sugere alta gravidade, em face do surgimento precoce de sintomas, o que não é usual.
- 100** A principal atuação de Mônica nesse caso será identificar a necessidade de encaminhar Marcos para avaliação psicológica.

Espaço livre