

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca de assuntos relacionados a anatomia e fisiologia da gestação, julgue os próximos itens.

- 41 Um feto normal de vinte semanas (com intervalo de confiança de mais ou menos duas semanas) deve apresentar, entre outros, coração com as quatro câmaras definidas, estômago, rins, bexiga e face com lábios.
- 42 Decorridas vinte semanas de gestação, o líquido amniótico consiste, em grande parte, em urina fetal.
- 43 Microcefalia fetal pode ser resultado de diabetes gestacional não controlada.
- 44 A coléstase obstétrica é uma doença benigna, que não apresenta riscos para o feto.
- 45 Os problemas congênitos associados à hepatite B na gestação incluem a hipoplasia de membro.

Tendo como referência as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, julgue os itens subsequentes.

- 46 Recipientes para resíduos em salas de parto dispensam tampa de vedação.
- 47 O empregador está obrigado a afastar a trabalhadora nutriz das atividades com radiações ionizantes: ela deverá ser realocada em atividade compatível com a sua condição, formação e experiência.

Julgue os itens subsequentes, concernentes à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM).

- 48 Mulheres podem sofrer, adoecer ou morrer em decorrência de comportamentos associados aos padrões sociais prevalentes de masculinidade e feminilidade.
- 49 O governo federal, a partir de 1998, passou a considerar prioritária a saúde da mulher dando ênfase, até 2002, à saúde reprodutiva e à busca por reduzir a mortalidade materna.
- 50 A PNAISM foi elaborada tendo como referência a conclusão de que a mortalidade associada ao ciclo gravídico-puerperal e ao aborto consistia em uma das três maiores causas de óbito de mulheres em idade fértil.
- 51 Definida pela Organização Mundial da Saúde e adotada pela PNAISM, maternidade precoce é aquela que ocorre na adolescência, isto é, até os dezessete anos de idade.
- 52 Para a PNAISM, não há relação entre baixa escolaridade e classe social da mulher com a possibilidade de a mulher negociar com o parceiro o uso de preservativo nas relações sexuais.
- 53 A PNAISM prevê atenção diferenciada do Sistema Único de Saúde (SUS) às mulheres em razão de faixas etárias; porém, essa política não prevê atenção especial para a mulher em razão de raça ou etnia.

Acerca de recomendações de acolhimento em ginecologia e obstetrícia no âmbito do SUS, julgue os itens a seguir.

- 54 Inclui-se na estratégia Rede Cegonha do SUS a atenção a crianças de até vinte e quatro meses de idade.
- 55 A classificação de risco realizada no acolhimento em maternidades deve priorizar o atendimento burocrático, justo e eficaz, por ordem de chegada.
- 56 Uma recomendação para o acolhimento da usuária e de seus familiares na porta de entrada de um hospital geral dotado de maternidade é que se construa um fluxo de entrada dirigido especificamente para a maternidade.
- 57 Entre as atribuições dos profissionais envolvidos no acolhimento e na classificação de risco em obstetrícia, é considerado atribuição específica do enfermeiro o preenchimento da ficha de notificação de violência, nos casos em que houver suspeita ou confirmação, de acordo com o protocolo específico.

A respeito de epidemiologia no contexto da obstetrícia, julgue os itens que se seguem.

- 58 A principal causa de anemia na gravidez é a derivada da deficiência de ferro.
- 59 Os acidentes vasculares cerebrais são mais raros em mulheres no período pós-parto.
- 60 O citomegalovírus, um vírus da família dos herpes-vírus, possui soroprevalência superior a 30%.

Julgue os itens seguintes, tendo como referência os protocolos de avaliação clínica em enfermagem obstétrica.

- 61 A primeira etapa da classificação de risco consiste em verificar a ventilação e a respiração.
- 62 A classificação de risco das pacientes imunodeprimidas somente será elevada se elas estiverem em trabalho de parto.
- 63 Vítima de violência física e sexual, com dor abdominal ou perda de líquido ou de sangue via vaginal, se não apresentar condições que a classifiquem como vermelho, será classificada como laranja.
- 64 O protocolo de avaliação clínica que se refira exclusivamente a parada ou redução de movimentos fetais não inclui condições que elevem a classificação da paciente ao nível vermelho.

Julgue os próximos itens, com relação a diagnóstico laboratorial e de imagem no contexto da enfermagem obstétrica.

- 65 Os exames de imagem que podem contribuir para o diagnóstico da coléstase obstétrica incluem a ultrassonografia do fígado e da árvore biliar.
- 66 Entre os métodos mais confiáveis para se confirmar tendência de parto prematuro está o teste de fibronectina fetal.
- 67 Os teores de ureia e de creatinina na urina da gestante costumam apresentar-se elevados durante a gravidez normal.

Julgue os itens subsequentes, no que tange a dor e analgesia no parto.

- 68 Uma das vantagens da analgesia epidural é a possibilidade de contribuir para a redução da secreção de catecolaminas maternas, algo que pode ser positivo para o feto.
- 69 Consideradas técnicas anestésicas para cirurgias cesarianas, a raquidiana ou espinhal é tecnicamente mais complexa ou difícil de realizar que a epidural ou peridural.
- 70 Informar a gestante de forma adequada sobre o que esperar do parto pode contribuir para reduzir a estressante sensação de perda de controle.

Em relação aos cuidados mediatos e imediatos do recém-nascido, julgue os itens subsequentes.

- 71 O teste de triagem neonatal biológica, conhecido popularmente como teste do pezinho, apresenta em seu escopo várias doenças, que incluem deficiência da biotinidase, hiperplasia adrenal congênita e hipotireoidismo congênito.
- 72 De acordo com o parâmetro atual preconizado pelo Ministério da Saúde, a coleta do material para o teste do pezinho deve ser feita até o sétimo dia de vida do recém-nascido.
- 73 A profilaxia da oftalmia neonatal deve ser realizada de rotina nos cuidados com o recém-nascido, sendo a utilização de nitrato de prata a 1% a recomendação ideal segundo as atuais diretrizes nacionais de assistência ao parto normal.
- 74 Todos os recém-nascidos devem receber vitamina K para a profilaxia da doença metabólica.
- 75 Durante a recepção do recém-nascido em sala de parto, a frequência respiratória (FR) é o principal parâmetro de indicação de manobras de reanimação, sendo necessária a intubação traqueal quando a FR for inferior a 60 irpm.

As altas taxas de mortalidade materna representam um desafio à saúde pública no Brasil. Para evitar as mortes, é fundamental o atendimento adequado e ágil às emergências obstétricas. Acerca desse tema, julgue os itens seguintes.

- 76 Apesar de o indicador de mortalidade materna por causas evitáveis continuar elevado, o Brasil atingiu o quinto objetivo de desenvolvimento do milênio, especialmente a meta de reduzir em três quartos a razão da mortalidade materna entre 1990 e 2015.
- 77 A retenção de tecido placentário é a causa mais comum de hemorragia pós-parto, sendo recomendados para essa situação uterotônicos, como a ocitocina, por exemplo.
- 78 Em urgência ou emergência hipertensiva que requeira hospitalização, além do monitoramento intensivo, faz-se necessária a administração parenteral de anti-hipertensivos — preferencialmente, a metildopa.
- 79 Segundo a Organização Mundial de Saúde, a massagem uterina contínua é recomendada como intervenção para prevenir a hemorragia pós-parto em mulheres que tenham recebido ocitocina profilática.
- 80 A conduta ativa no terceiro período do parto — como, por exemplo, a tração controlada do cordão umbilical, na presença de profissionais qualificados de assistência ao parto — está associada ao menor risco de hemorragia e transfusão sanguínea.

O projeto Apice On — aprimoramento e inovação no cuidado e ensino em obstetrícia e neonatologia — foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde em 2017, servindo como nova ferramenta para melhoria das condições de vida e saúde integral das mulheres e de seus bebês. Com referência a esse projeto, julgue os itens a seguir.

- 81 Segundo esse projeto, os hospitais de ensino são considerados os mais favoráveis para a promoção de mudanças no ensino, na gestão e nos modelos de atenção.
- 82 O projeto Apice On e a Rede Cegonha apresentam estratégias semelhantes no contexto da mudança de práticas relacionadas ao parto e nascimento; entretanto, possuem necessidades divergentes relativamente à formação de novos profissionais, a partir da prática.
- 83 O objetivo geral do projeto Apice On é qualificar os processos de atenção, gestão e formação relativos ao parto, nascimento e abortamento nos hospitais de ensino, incorporando um modelo com práticas fundamentadas em evidências científicas, humanização, segurança e garantia de direitos.

A atenção em saúde reprodutiva é uma ação básica de saúde e deve levar em consideração o contexto de vida de cada pessoa, e o direito de todos poderem tomar decisões sobre a reprodução sem discriminação, coerção ou violência. Considerando esse assunto, julgue os próximos itens, relativos ao planejamento reprodutivo.

- 84 O termo planejamento reprodutivo pode ser substituído pela expressão controle de natalidade, uma vez que ambos preveem o respeito e a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres.
- 85 O DIU de cobre pode ser inserido até 48 h após o parto ou após a quarta semana pós-parto. Segundo o disposto nas resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, o enfermeiro, após treinamento específico, estará apto a realizar a consulta clínica, prescrever e inserir o DIU.
- 86 O uso de anticoncepcional injetável trimestral pode ser iniciado a qualquer momento no pós-parto, desde que a mulher não esteja grávida e esteja amamentando de forma exclusiva ou parcialmente e que a menstruação não tenha retornado. No caso da opção por essa forma de contracepção, é recomendado o uso de algum método contraceptivo de apoio por sete dias.
- 87 O anticoncepcional oral combinado não deve ser indicado para mulheres infectadas com o HIV que tenham AIDS ou estejam em terapia antirretroviral.

Segundo as recomendações de rotina no pré-natal, julgue os itens a seguir.

- 88 A dose de dTpa deve ser administrada em todas as gestações, independentemente de já ter sido realizada em gestações anteriores.
- 89 Em caso de HBsAg (–) e Anti-HBs < 10, são recomendadas as três doses da vacina contra hepatite B, devendo a primeira delas ser realizada após a 14.ª semana de gestação.
- 90 A vacina contra *influenza* deve ser administrada em qualquer período gestacional. Caso a gestante não tenha tomado no período gestacional, recomenda-se tomar no puerpério.
- 91 O teste de tolerância a glicose (75 g de glicose anidro) deve ser realizado preferencialmente entre a 27.ª e a 30.ª semana de gestação.
- 92 Caso apresente IgG e IgM reagentes para toxoplasmose, a gestante deve ser submetida ao teste de avidéz. Se este forte for e a gestação, inferior a 16 semanas, não haverá necessidade de repetir o exame.
- 93 Recomenda-se à gestante com quadro de anemia leve a moderada (entre 8 g/dL e 11 g/dL) a ingestão de 200 mg/dia de sulfato ferroso.

Uma mulher de vinte e dois anos de idade compareceu a unidade básica de saúde com queixa de corrimento com mau cheiro e coceira intensa havia três dias. No exame especular, a enfermeira obstétrica observou secreção vaginal amarelo-esverdeada, bolhosa e fétida.

Considerando esse caso clínico, julgue os seguintes itens.

- 94 Nessa situação clínica, deve-se indicar metronidazol, 2 g, via oral, em dose única, ou clindamicina creme a 2%, com aplicador, uma vez ao dia, por cinco dias.
- 95 Deve-se orientar a mulher a não fazer uso de bebida alcoólica antes, durante e logo após o tratamento.
- 96 Trata-se de uma infecção sexualmente transmissível, conhecida como tricomoníase, situação em que todos os parceiros devem ser tratados.

---

A enfermagem obstétrica possui papel fundamental nos diversos ciclos de saúde da mulher, entre eles o puerpério. Acerca das transformações nesse período, julgue os próximos itens.

- 97 A atenção da enfermeira obstétrica no período puerperal inclui o apoio emocional, uma vez que ansiedade, medos e sensação de incapacitação na relação entre a mãe e o bebê são estados emocionais comuns às mães nesse período.
- 98 Perturbação do apetite, sentimento de inadequação e rejeição do bebê, pensamentos recorrentes de morte e ideação suicida são alguns dos sintomas característicos do chamado *baby blues*.
- 99 O leite materno para doação poderá ficar, após a coleta, até dez dias no congelador ou no *freezer*.
- 100 Em caso de ingurgitamento mamário, entre algumas orientações recomendadas estão mamadas frequentes sem horários estabelecidos, uso de sutiã com alças largas, compressas mornas/quentes e ordenha manual antes da mamada.

Espaço livre