

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

De acordo com o método START (*simple triage and rapid treatment*), usado para classificar e identificar múltiplas vítimas, julgue os itens a seguir.

- 41 Conforme a classificação proposta pelo método em apreço, o adulto que, embora vitimado, consiga andar deverá ser classificado e identificado com a cor verde.
- 42 Na avaliação da respiração, vítima com frequência respiratória superior a 30 mvm deverá ser classificada e identificada com a cor amarela.
- 43 Na avaliação da capacidade de cumprir ordens, vítimas que obedecem a comandos simples deverão ser classificadas e identificadas com a cor amarela.
- 44 Na triagem de múltiplas vítimas que envolvam crianças, a criança que estiver alerta ou responder a chamado verbal ou a estímulo doloroso com localização do estímulo deverá ser classificada e identificada com a cor amarela.
- 45 Na avaliação dos sinais vitais, se a criança apresentar ausência de pulso, deverá ser imediatamente classificada e identificada com a cor amarela.

No que diz respeito à parada cardiorrespiratória (PCR) e à ressuscitação cardiopulmonar (RCP) de indivíduo adulto, julgue os itens que se seguem, considerando as diretrizes da American Heart Association, suas alterações e atualizações.

- 46 Considera-se atendimento de qualidade na RCP de indivíduo adulto as situações em que os socorristas realizam compressões torácicas na frequência de 80 a 100 compressões por minuto, deprimindo o tórax em 5 cm a 6 cm, com retorno completo.
- 47 Na RCP, são consideradas eficientes e de boa qualidade as insuflações realizadas pelo socorrista de um segundo cada uma delas, em que seja constatada elevação do tórax.
- 48 Na PCR com ritmo de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso registrado no monitor cardíaco, deve-se desfibrilar a vítima com choque único na potência máxima do aparelho (360 J, no monofásico, e 200 J, no bifásico).
- 49 A lidocaína, na dose de 1 mg a 1,5 mg, intravenosa/intraóssea, administrada em *bolus*, representa a melhor escolha como droga vasopressora na ressuscitação, nos casos de PCR com ritmo de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso.

Acerca de ambulância, veículo de atendimento pré-hospitalar móvel, julgue os itens subsequentes.

- 50 As ambulâncias do tipo B são destinadas ao transporte simples, ou seja, ao transporte de pacientes sem maiores riscos e de caráter eletivo.
- 51 As ambulâncias do tipo A deverão estar equipadas com itens como sinalizador óptico e acústico, equipamento de radiocomunicação, maca com rodas, suporte para soro e oxigênio medicinal.

Os traumas abdominais, classificados em abertos ou fechados, muito frequentemente caracterizam situações de emergência. No que se refere a traumas abdominais, julgue os itens seguintes.

- 52 Entre os sinais sugestivos de lesão fechada no abdome encontram-se sinais do cinto de segurança em forma de equimose linear transversal, dor e sensibilidade à palpação abdominal e rigidez ou distensão abdominal.
- 53 Se julgar necessário, o socorrista deverá remover objetos encravados ou empalados em ferimentos oriundos de trauma abdominal aberto.
- 54 No caso de evisceração — uma complicação comum do trauma abdominal aberto —, os primeiros cuidados são, entre outros, os seguintes: não tentar recolocar os órgãos ou as estruturas de volta na cavidade abdominal e cobri-los com compressas estéreis umedecidas com soro fisiológico a 0,9%.
- 55 A imobilização cervical adequada é uma das condutas nas situações de trauma abdominal em atendimento pré-hospitalar.

As alterações circulatórias representam desequilíbrios na homeostase dos fluidos corporais e se relacionam com distúrbios que acometem a circulação sanguínea, podendo levar o indivíduo à morte. A respeito desse assunto, julgue os próximos itens.

- 56 A cateterização umbilical é um procedimento realizado nos recém-nascidos com a finalidade de monitorar a PA, coletar sangue para exames, infundir medicamentos ou transfusão. A embolia gasosa representa uma complicação na manipulação inadequada do cateter umbilical.
- 57 A isquemia em áreas submetidas a pressão pode ocorrer durante o transporte de pacientes críticos que permanecem por longos períodos em prancha rígida.

No atendimento inicial às emergências, a avaliação objetiva identificar rapidamente o principal problema associado à lesão ou ao agravo clínico, para uma tomada de decisão quanto ao atendimento e(ou) a remoção da vítima. Com relação a esse tema, julgue os itens subsequentes.

- 58 No caso de paciente considerado em estado crítico, ao proceder à avaliação primária, o socorrista deve, detalhadamente, inspecionar o couro cabeludo, as orelhas, os ossos da face, os olhos, o nariz, a boca, as pupilas — nestas, com verificação de diâmetro, reação à luz e simetria pupilar.
- 59 Na avaliação primária do paciente com suspeita de trauma, a garantia da segurança da cena deverá ser prioridade.

O trauma de tórax caracteriza uma lesão que poderá prejudicar a função cardiorrespiratória. As lesões torácicas podem ser causadas por traumatismo fechado e por lesões penetrantes. Julgue os itens a seguir, a propósito de lesões torácicas.

- 60 No pneumotórax aberto, cobrir o ferimento com curativo oclusivo de três pontos constitui procedimento imediato.
- 61 Os sinais e sintomas mais comuns de pneumotórax hipertensivo incluem respiração superficial, queixa de dor torácica e hipóxia ou cianose.

Com referência às intoxicações agudas, julgue os itens que se seguem.

- 62 A atropina é o antídoto específico para o tratamento de intoxicações agudas por drogas de abuso.
- 63 Entre os sinais e sintomas comuns na intoxicação pela ingestão de solventes estão hipersecreção brônquica, broncoespasmo, tosse, insuficiência respiratória, cianose, bradicardia e hipotensão.
- 64 As condutas específicas no caso de ingestão de produtos corrosivos são as seguintes: provocar vômito, passar sonda nasogástrica, realizar lavagem gástrica e realizar tentativas de neutralização do agente corrosivo.

No que tange ao trauma craniocéfálico, julgue os próximos itens.

- 65 A estabilização da coluna cervical não é conduta indicada no caso de trauma craniocéfálico, sendo necessária apenas em casos de suspeita de trauma raquiomedular.
- 66 Na avaliação secundária, se a gravidade do quadro da vítima permitir, deverá ser dada ênfase à escala de coma de Glasgow.

Acerca do choque e da reposição volêmica, julgue os itens que se seguem.

- 67 Na classificação do choque hipovolêmico, a classe IV aplica-se a vítimas que apresentem perda sanguínea de 750 mL a 1.500 mL e frequência cardíaca de 100 bpm a 120 bpm.
- 68 No choque hipovolêmico secundário ao trauma, a reposição volêmica deverá ser administrada com solução injetável de glicose na concentração de 5%, aquecida a 39 °C, seguida de solução salina a 0,9%.

No que concerne ao trauma raquiomedular, julgue os itens subsequentes.

- 69 No caso de trauma raquiomedular, na imobilização, o alinhamento da cabeça deve ser mantido mesmo se ocorrer piora da dor referida, piora do padrão respiratório, resistência voluntária ao movimento, início ou aumento de déficit neurológico e espasmos dos músculos do pescoço.
- 70 Durante a imobilização, o alinhamento cervical poderá não ser possível em casos de torcicolo congênito ou outra malformação ou de deformidades degenerativas preexistentes.

Julgue os itens a seguir, acerca de traumas térmicos e queimaduras, bem como de seus protocolos nacionais de atendimento.

- 71 No atendimento pré-hospitalar a pacientes com queimadura térmica, deve-se irrigar a área queimada com soro fisiológico.
- 72 Para estimar a área corporal queimada, usa-se a regra dos 9, que atribui a cada membro inferior um total de 9%.
- 73 Em situação de emergência em paciente com queimaduras, deve-se realizar o acesso venoso mesmo em área queimada.
- 74 O enfermeiro deve instalar sonda vesical de demora para o controle da diurese em pacientes com queimaduras em área corporal superior a 10% ou em caso de queimaduras na região genital.
- 75 A enxertia de pele para tratamento de queimaduras somente é indicada em casos de queimaduras de terceiro grau.

À luz das normativas e dos protocolos nacionais de atendimento a vítimas de traumas, julgue os itens subsequentes.

- 76 Lesões faciais provocadas por esmagamentos são consideradas ferimentos fechados.
- 77 É mais comum haver contusões pulmonares graves sem concomitante fratura de arcos costais em crianças.
- 78 O paciente idoso está inserido no mesmo protocolo de atendimento em urgências que o paciente com deficiência visual.
- 79 Em caso de obstrução grave de vias aéreas em criança que esteja irresponsiva, deve-se seguir realizando a manobra de Heimlich.
- 80 Massagens de seio carotídeo podem ser executadas apenas em adultos e idosos, não devendo ser executadas em crianças.
- 81 A primeira conduta para a avaliação secundária do paciente pediátrico com suspeita de trauma é a realização de entrevista SAMPLE.

Acerca de triagem e transporte, julgue os itens que se seguem.

- 82 Quando caracterizado o parto iminente durante o transporte da gestante, deve-se considerar estacionar a viatura.
- 83 O tempo de transporte em assistência ao parto iminente é uma das variáveis de seleção de protocolos, sendo caracterizados como transportes prolongados apenas aqueles com tempos estimados superiores a 60 min.
- 84 A vítima que não respira mesmo depois de manobras de abertura de vias aéreas deve ser classificada com a cor vermelha, de acordo com o método START (*simple triage and rapid treatment*).

A respeito de normas e preceitos sobre ética a serem observados pelos profissionais de enfermagem, julgue os seguintes itens.

- 85 Unicamente em casos de iminente risco de morte, é permitido ao profissional de enfermagem executar assistência à saúde sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal.
- 86 É direito do profissional de enfermagem prestar informações verbais a respeito do quadro do paciente da forma que considerar mais apropriada ou suficiente.
- 87 Manter regularizadas as obrigações financeiras com o conselho regional de enfermagem é considerado um dever ético do profissional de enfermagem.
- 88 Salvo em casos de urgência, emergência ou eventuais situações regulamentadas, o profissional de enfermagem é proibido de executar prescrição feita a distância.

A respeito de ventilação mecânica, julgue os itens a seguir.

- 89 As duas modalidades de fornecimento de ventilação mecânica não invasiva com pressão positiva se diferenciam pelo nível de pressão, igual ou distinta, durante a inspiração e a expiração.
- 90 O ventilador mecânico que opera no modo de ventilação assistida controlada permite que o paciente respire espontaneamente nos intervalos de ciclos controlados pelo equipamento.
- 91 Registram-se lesões em ventilação mecânica invasiva por falta de umidificação do ar inspirado, porém, isso não ocorre no caso de excesso de umidificação em ventilação equivalente.

Julgue os itens seguintes, acerca de enfermagem em cardiologia.

Espaço livre

- 92 No papel de eletrocardiograma, a distância horizontal representada por um quadrado grande, ou seja, de lados mais espessos ou escuros, equivale ao lapso temporal de um décimo de segundo.
- 93 Em casos de paradas cardiorrespiratórias iminentes ou já constatadas associadas a taquiarritmias ventriculares, os cuidados de enfermagem incluem a administração de oxigênio suplementar.
- 94 São bloqueios atrioventriculares os distúrbios de condução no estímulo sinusal até os ventrículos.
- 95 As medicações administradas durante a parada cardíaca devem ser feitas preferencialmente por via intramuscular.

Acerca de atendimentos pré- e intra-hospitalar e de materiais empregados nesses atendimentos, julgue os itens seguintes.

- 96 Em serviços de urgência e emergência, deve-se manter disponível um oftalmoscópio.
- 97 Os equipamentos ou instrumentos dos serviços de urgência e emergência devem estar acompanhados de instruções por escrito para uso e manutenção ou por manuais de fabricante.
- 98 Em casos de síndrome de abstinência do álcool, deve-se, sempre, administrar diazepam 10 mg a cada 30 min, com dose máxima de 50 mg.
- 99 Paciente que apresentar sinais de autonegligência grave deve ser classificado como paciente que apresenta risco de autoagressão e suicídio.
- 100 No atendimento a urgências envolvendo acidentes com animais peçonhentos, deve-se utilizar torniquete principalmente em caso de picada por serpente.