

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Considerando as disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, julgue os itens subsequentes.

- 41 É dever do profissional de enfermagem cooperar com a paciente para a prática da interrupção voluntária de gestação, nos casos em que a legislação autorize o aborto.
- 42 O acesso às informações relacionadas à pessoa, sua família e sua coletividade é necessário ao exercício profissional da enfermagem.
- 43 Devem ser registradas no prontuário do paciente apenas as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar, de forma objetiva, cronológica, legível e sem rasuras.
- 44 É prerrogativa do profissional de enfermagem recusar-se, mesmo em situação de emergência, a executar prescrição médica na qual não constem assinatura e número de registro profissional do prescritor.
- 45 Na prestação da assistência em enfermagem, o profissional deve buscar proporcionar qualidade de vida à pessoa e a sua família, inclusive no processo de luto, em caso de morte.
- 46 É facultada ao profissional de enfermagem a decisão de participar de prática destinada a antecipar a morte de paciente em fase terminal, a chamada eutanásia.
- 47 É proibido disponibilizar o acesso a informações e documentos a terceiros que não estejam diretamente envolvidos na prestação da assistência de saúde ao paciente.

Com base na Lei n.º 7.498/1986 e no Decreto n.º 94.406/1987, que dispõem sobre o exercício da enfermagem, julgue os itens a seguir.

- 48 Ao técnico de enfermagem cabe o exercício de atividades de nível médio, entre elas a orientação e o acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- 49 Cabe ao técnico de enfermagem assistir o enfermeiro na prevenção e no controle sistemático de infecção hospitalar.

Com referência à atuação da equipe de enfermagem em centro cirúrgico, julgue os itens que se seguem.

- 50 Constitui material cirúrgico todo o conjunto de objetos, instrumentos e equipamentos que sejam utilizados para a execução de determinado procedimento cirúrgico e que entrem em contato direto ou indireto com a região operada.
- 51 É função do técnico de enfermagem auxiliar no posicionamento cirúrgico correto do paciente.
- 52 O objetivo do manejo de enfermagem para o paciente em unidade de recuperação pós-anestésica restringe-se, basicamente, à avaliação da função renal.
- 53 A sala de recuperação pós-anestésica deve ser equipada com leitos para o atendimento dos pacientes no pós-operatório até que eles estejam em condições de receber alta hospitalar.
- 54 Áreas semirrestritas correspondem àquelas que têm limites definidos para a circulação de pessoal e de equipamentos, e que são destinadas ao uso privativo do pessoal vestido com a indumentária cirúrgica completa, com rígido controle de trânsito e de assepsia.
- 55 Na preparação do paciente antes da cirurgia, deve-se auxiliá-lo a colocar meias de compressão elástica, quando indicado, pois elas são importantes na prevenção de trombose venosa profunda.
- 56 O expurgo é o local destinado à eliminação de matéria orgânica proveniente das salas de cirurgia, como secreções e excreções do paciente.

Julgue os itens a seguir, referentes a infecção hospitalar.

- 57 O programa de controle de infecção hospitalar compreende um conjunto de ações desenvolvidas com o objetivo de reduzir ao máximo possível a incidência de infecções hospitalares.
- 58 Apesar de altamente relevante, a existência de comissão de controle de infecção hospitalar em serviços de saúde é facultativa.
- 59 Em ambiente hospitalar, o uso de solução alcoólica para a higienização das mãos (álcool em gel) pode substituir o uso de lavatórios ou pias com água corrente em dias de racionamento no fornecimento de água público.
- 60 A fonte endógena, como a microbiota presente na flora da boca e na pele do paciente, é fator associado à etiologia de infecções hospitalares.
- 61 Durante a higienização das mãos, é importante que o visitante mantenha adornos como anéis e alianças nos dedos, para garantir que tanto a pele quanto os acessórios estarão livres de contaminantes após o contato com a água ou com o álcool.

Acerca da atuação de medicamentos no organismo humano, julgue os itens seguintes.

- 62 O acetaminofeno, ou paracetamol, e a dipirona são analgésicos puros capazes de aliviar dor de intensidade leve a moderada e febre, pois eles afetam a produção de substâncias conhecidas como prostaglandinas.
- 63 Antieméticos são fármacos que atuam nos rins, aumentando o volume e o grau do fluxo urinário e promovendo a eliminação de eletrólitos como o sódio e o potássio.
- 64 Medicamentos anti-histamínicos têm a função de reduzir ou eliminar os efeitos da histamina, que é um mediador químico secretado pelo corpo especialmente nos casos de reação alérgica.

Acerca do uso de curativos na enfermagem, julgue os itens a seguir.

- 65 Curativos favorecem a rápida epitelização, a diminuição da dor e a aceleração da destruição de tecidos necrosados.
- 66 As coberturas de alginatos são um tipo de curativo indicado para feridas com pouca exsudação; por isso, seu uso pode prolongar-se por até sete dias.

Acerca dos cuidados na administração de medicamentos, julgue os próximos itens.

- 67 O preparo do medicamento deve ser realizado apenas quando houver certeza quanto ao medicamento prescrito, à dose e à via de administração.
- 68 É dispensável esclarecer ao paciente o medicamento que lhe será administrado.
- 69 A absorção de determinados medicamentos é mais rápida pela via subcutânea que pela via intramuscular.
- 70 O efeito medicamentoso da droga administrada por via endovenosa é imediato; por isso, esta é uma via de escolha em casos de emergência.

Mariana, com setenta e seis anos de idade, apresenta, em atendimento hospitalar de emergência, forte dor precordial, em aperto, contínua, com irradiação para o pescoço, e leve tontura — segundo a paciente, há cerca de 30 min. Ela tem história de hipertensão arterial crônica e vem sendo acompanhada regularmente por seu cardiologista. No exame, Mariana encontra-se dispneica, agitada, com PA de 190 mmHg × 130 mmHg e oximetria de pulso em 92%.

Acerca desse caso clínico, julgue os itens a seguir.

- 71 No serviço de emergência, Mariana deverá ser mantida em posição de Trendelenburg e ser tranquilizada.
- 72 Segundo o Protocolo de Manchester, Mariana deverá ser classificada na triagem inicial como paciente em risco — cor laranja —, devendo ser reavaliada pela enfermagem a cada 10 min até que receba atendimento médico.
- 73 Deverá ser instalado na paciente acesso venoso periférico e ser-lhe oferecida oxigenoterapia.
- 74 O quadro apresentado por Mariana pode ser corretamente classificado como uma urgência hipertensiva.

Lúcia, técnica de enfermagem, foi chamada pelo acompanhante de André, um paciente com sessenta e três anos de idade, internado havia dois dias por conta de uma pneumonia. Ao chegar ao quarto de André, Lúcia percebeu que ele parecia não respirar.

Com respeito a esse caso clínico, julgue os próximos itens.

- 75 Lúcia deverá checar, imediatamente, a responsividade de André, comprimindo um dos dedos dele para verificar se ele responde ao estímulo doloroso.
- 76 Se André não for responsivo, Lúcia deverá verificar a respiração e o pulso carotídeo do paciente, simultaneamente.
- 77 Se for comprovada parada cardiorrespiratória, Lúcia deverá iniciar reanimação cardiopulmonar, com ciclos de quinze compressões eficientes — deprimindo o tórax em cerca de 3 cm, com completo retorno — e cinco insuflações eficientes, de 5 s cada uma, e com elevação visível do tórax.

Jane, com cinquenta e dois anos de idade, compareceu a um posto de vacinação juntamente com seus netos — Pedro, com quatro anos de idade, e João, com nove meses de vida. Jane não se lembra de quando foi vacinada pela última vez, mas acredita que tenha sido há mais de vinte anos, e também não sabe contra quais doenças foi vacinada, porque não possui cartão de vacinação. As crianças tomaram, em seu devido tempo, todas as vacinas preconizadas pela Política Nacional de Imunização, como demonstrado em seus respectivos cartões de vacinação. Nenhum deles tem contra-indicação para ser vacinado.

Com relação a essa a situação hipotética, julgue os seguintes itens.

- 78 Jane deverá receber dose única de vacina contra hepatite B, dose única de vacina contra febre amarela, a primeira dose da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e uma dose da vacina dupla — adulto (dT: difteria e tétano).
- 79 Pedro deverá receber o segundo reforço da dTP (difteria, coqueluche e tétano) e da VOP (oral contra poliomielite) e dose única da vacina contra varicela.
- 80 João deverá tomar apenas dose única da vacina contra a febre amarela.

Acerca do controle das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), cujas incidências têm tornado esse controle uma prioridade para os órgãos de vigilância epidemiológica brasileiros, julgue os itens subsequentes.

- 81 No Brasil, são de notificação compulsória a sífilis congênita, a sífilis em gestante e a sífilis adquirida.
- 82 Quando forem indicados para a confirmação diagnóstica de DST, os exames laboratoriais deverão ser agendados para sete dias após a primeira consulta, com o objetivo de minimizar as chances de resultados falsos-negativos decorrentes de possíveis janelas imunológicas.
- 83 Ao oferecer preservativos masculinos, o técnico de enfermagem deve orientar o paciente a utilizar lubrificantes oleosos, como vaselina, que reduzem o atrito, protegendo a integridade do látex.
- 84 A conjuntivite do recém-nascido causada pela clamídia tende a ser mais severa que a causada pela *Neisseria gonorrhoeae* e de início mais precoce.
- 85 Na rotina de assistência pré-natal, deve ser pesquisada a infecção pelo HIV na primeira consulta e no terceiro trimestre de gestação.

Julgue os próximos itens, relativos ao controle e acompanhamento de pessoas com diabetes melito (DM) ou com intolerância a glicose.

- 86 Uma mulher com quarenta e oito anos de idade, que compareça a ambulatório de clínica médica, sem queixas específicas, para fazer *check-up* de rotina, com PA de 120 mmHg × 78 mmHg, IMC = 28, e com história familiar de DM, dislipidemia, síndrome de ovários policísticos e sedentarismo, deverá ser encaminhada para consulta de rastreamento de DM e solicitação de exame de glicemia.
- 87 O Ministério da Saúde recomenda que a consulta de rastreamento para população-alvo de DM seja realizada pelo enfermeiro ou técnico de enfermagem da unidade básica de saúde, devendo os casos suspeitos ser encaminhados ao médico, em momento posterior, para confirmação ou não do diagnóstico.
- 88 Na rotina do Sistema Único de Saúde, recomenda-se que o manejo clínico do uso de insulina pela pessoa com DM do tipo 2 que necessite de múltiplas doses diárias seja prioritariamente realizado no ambulatório de especialidades.

Paula, com vinte e seis anos de idade, compareceu a unidade básica de saúde com queixa de amenorreia havia cerca de vinte dias, mas não tinha certeza da data da última menstruação. Nessa oportunidade, ela informou ter vida sexual ativa, fazer uso de anticoncepcional oral de forma irregular e nunca ter engravidado.

Acerca desse caso clínico, julgue os itens que se seguem.

- 89 Nesse caso, é indicado o teste rápido de gravidez.
- 90 Os testes rápidos para HIV e sífilis deverão ser oferecidos a Paula.
- 91 Paula deverá receber, com antecedência, informações sobre a maternidade, o parto e o direito de escolher um acompanhante, necessariamente mulher, para esse momento.

Tendo em vista que o Conselho Federal de Enfermagem publicou recentemente o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem por meio da Resolução COFEN n.º 564/2017, julgue os itens a seguir à luz das prescrições dessa nova norma.

- 92** No caso de prontuários eletrônicos, o profissional de enfermagem deve apor assinatura certificada, conforme legislação vigente.
- 93** Nos casos de violência doméstica contra criança, adolescente, idoso ou mulher, o profissional de enfermagem deverá informar os órgãos de responsabilização criminal, mesmo sem autorização do paciente ou de seu representante legal.
- 94** É dever do técnico de enfermagem manter sigilo sobre fato de que tenha tido conhecimento em razão da atividade profissional, exceto se o fato for de conhecimento público.

Acerca da prevenção de acidentes de trabalho em serviços de saúde, julgue os próximos itens.

- 95** No que concerne aos riscos ocupacionais, os microrganismos geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os príons são classificados como agentes biológicos.
- 96** O programa de prevenção de riscos ambientais deve ser reavaliado a cada dois anos ou quando houver mudança nas condições de trabalho que possa alterar a exposição aos riscos ocupacionais.
- 97** Os locais onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos devem possuir lavatório exclusivo para higiene das mãos, provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira com sistema de abertura sem contato manual.

Recentemente, foi detectado aumento significativo de casos de LER/DORT em um setor de determinado hospital, em comparação com os dez anos anteriores. Por conta disso, a direção desse hospital contratou um especialista para avaliar as condições ergonômicas de trabalho nesse setor e propor melhorias.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os próximos itens.

- 98** Com o objetivo de reduzir o adoecimento dos trabalhadores, a intervenção ergonômica deverá procurar a melhor forma de adaptar os trabalhadores do referido setor do hospital às condições do trabalho ali desenvolvido.
- 99** Caso sejam utilizados os instrumentos e as técnicas da análise ergonômica do trabalho, deverão ser considerados as regulações, as restrições e os limites implícitos ou explícitos impostos pelos próprios trabalhadores desse setor.
- 100** Se, na avaliação especializada das condições de trabalho no setor em questão, forem identificados riscos ergonômicos, estes deverão ser simbolizados no mapa de riscos em azul.

Espaço livre