

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A respeito do tratamento em esquizofrenia, julgue os itens subsequentes.

- 61 O paciente pode ser considerado refratário após o uso de dois antipsicóticos em dose adequada por pelo menos seis semanas sem redução satisfatória dos sintomas.
- 62 Para os pacientes refratários, indica-se olanzapina.
- 63 O uso de eletroconvulsoterapia associada à clozapina tem mostrado resultados positivos para pacientes ultrarretratados.
- 64 Os antipsicóticos que possuem formulação injetável incluem droperidol, haloperidol, zuclopentixol e a pipotiazida.
- 65 O uso da tioridazina durante a gestação e puerpério é seguro em pacientes diagnosticadas com esquizofrenia.

No que se refere à psicopatologia dos transtornos mentais, julgue os itens que se seguem.

- 66 A síndrome de Frégoli é um falso reconhecimento de uma pessoa estranha como uma pessoa conhecida, já na síndrome de Capgras uma pessoa conhecida é identificada como um sócio, uma cópia.
- 67 A hipermnésia é uma alteração patológica da memória: os elementos mnêmicos ganham em número, mas perdem em clareza.
- 68 A fobia simples é assim denominada por possuir tratamento mais simples do que as demais fobias.
- 69 Nos casos de histeria dissociativa, pode haver pseudocrises convulsivas, mas não alterações da consciência.
- 70 Estupor depressivo é um estado depressivo grave que pode levar à morte, no qual o paciente muitas vezes permanece imóvel e urina e defeca no local.
- 71 Nos casos de dependência a substâncias químicas, a dependência comportamental caracteriza-se pela busca da substância, seguida de tolerância e síndrome de abstinência, quando ausente a substância.

Acerca de *delirium* e demência, julgue os próximos itens.

- 72 As alterações específicas mais aceitas em relação aos neurotransmissores envolvidos no *delirium* incluem o aumento de atividade da dopamina e a redução da acetilcolina.
- 73 O ciclo sono-vigília, a memória e a aprendizagem podem estar relacionados às funções reguladoras da acetilcolina.
- 74 O paciente em *delirium* deve ser mantido em ambiente tranquilo, pouco iluminado e receber estímulos positivos.
- 75 A medicação anticolinérgica está indicada para o tratamento da demência.

Em relação ao transtorno obsessivo-compulsivo, julgue os seguintes itens.

- 76 No início do tratamento são preferíveis os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e a terapia cognitivo comportamental.
- 77 Havendo comorbidade entre transtorno obsessivo-compulsivo e tiques, a pimozida está indicada para ser acrescida ao tratamento.
- 78 A estimulação magnética profunda pode ser indicada para os casos refratários e pode ser feita no consultório de psiquiatra.

A respeito de depressão maior, julgue os itens a seguir.

- 79 A tranilcipromina está indicada para casos refratários e pode ser usada associada ao lítio.
- 80 A eletroconvulsoterapia está contraindicada nos casos em que há não psicose.

Acerca do uso de psicotrópicos na gestação e lactação, julgue os seguintes itens.

- 81 Caso a exposição a benzodiazepínicos ocorra no terceiro trimestre da gestação, principalmente em um período mais próximo ao parto, pode ocorrer a síndrome do bebê hipotônico, caracterizada por letargia, hipotonia, hipotermia e baixa responsividade ao nascimento.
- 82 Na gravidez, benzodiazepínicos de meia vida mais longa, como clonazepam, são mais indicados por ser mais fácil a retirada posterior da medicação.
- 83 O lítio praticamente não é excretado no leite materno.
- 84 O uso do topiramato pode ser usado com segurança na gravidez, pois não está associado a um risco aumentado de malformações no bebê.

Homem de 57 anos de idade, com histórico de alcoolismo crônico, chegou ao pronto-socorro levado por familiares que relataram um quadro caracterizado por confusão mental, hipersonolência, ataxia e nistagmo, iniciado há uma semana.

Em relação a esse caso clínico, julgue os itens a seguir.

- 85 O quadro clínico é compatível com a encefalopatia de Korsakoff.
- 86 O tratamento com tiamina pode reverter rapidamente o quadro de nistagmo e ataxia.

A respeito de suicídio, julgue o próximo item.

- 87 Idade acima dos 45 anos, gênero masculino, dependência de álcool e comportamento violento são fatores associados a um alto risco de suicídio.

Acerca da eletroconvulsoterapia (ECT), julgue os itens subsequentes.

- 88 O sintoma embotamento afetivo no esquizofrênico crônico apresenta melhora significativa com o uso da ECT.
- 89 A síndrome neuroléptica maligna é uma das indicações para o uso da ECT.
- 90 O lítio deve ser retirado para a realização da ECT devido a maior risco de *delirium* pós-ictal e de prolongamento da atividade convulsiva.

Julgue o próximo item, relativo a comportamento violento.

- 91 Os principais preditores de comportamento violento são ingestão excessiva de álcool, história de atos violentos com prisão ou atividade criminosa e história de abuso na infância.

---

A respeito da epidemiologia dos transtornos de humor, julgue os seguintes itens.

- 92 O transtorno bipolar tipo I é duas vezes mais prevalente em mulheres que em homens.
  - 93 Episódios maníacos são mais comuns em mulheres do que em homens.
  - 94 As mulheres têm taxas mais elevadas de ciclagem rápida em relação aos homens.
  - 95 A idade de início do transtorno depressivo maior é mais precoce que a idade de início do transtorno bipolar tipo I.
  - 96 O transtorno bipolar tipo I é mais frequente entre pessoas solteiras e divorciadas do que em pessoas casadas.
  - 97 A prevalência de transtorno depressivo maior é mais alta entre indivíduos que apresentam níveis socioeconômicos mais baixos.
- 

Acerca dos pré-requisitos para os pacientes de psicanálise, julgue os itens que se seguem.

- 98 O paciente precisa ter forte motivação para perseverar ante os rigores de tratamento intenso e prolongado.
  - 99 O paciente deve ser capaz de avaliar as próprias motivações e comportamentos.
  - 100 Pacientes com história de relacionamentos interpessoais prejudicados ou transitórios, que não conseguem estabelecer um vínculo viável com outra pessoa, são bons candidatos para a psicanálise.
- 

Espaço livre

---