

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca dos transtornos globais do desenvolvimento, julgue os itens subsequentes.

- 61 Denomina-se transtorno desintegrativo da infância o transtorno do desenvolvimento que ocorre em meninas que tenham apresentado desenvolvimento normal nos primeiros seis meses de vida e em seguida apresentem uma grave deterioração nas habilidades de comunicação e comportamento motor, com movimentos estereotipados das mãos.
- 62 Em pacientes com transtorno de Asperger, as habilidades cognitivas e as habilidades adaptativas mais importantes são compatíveis com a idade, embora existam problemas na comunicação social.
- 63 Do ponto de vista cognitivo, geralmente crianças autistas apresentam mais habilidades em tarefas que exijam raciocínio verbal do que em tarefas visuais.
- 64 O foco principal da abordagem psicofarmacológica no transtorno do espectro autista é melhorar os sintomas comportamentais associados, e não as características básicas do transtorno.

Acerca do transtorno bipolar da infância e adolescência, julgue os itens a seguir.

- 65 Nas crianças pré-púberes são frequentes os sintomas de ideias grandiosas e humor eufórico nos episódios maníacos.
- 66 O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é o transtorno comórbido mais comum entre jovens com transtorno bipolar de início precoce.

Acerca da tartamudez, julgue os itens que se seguem.

- 67 A maioria dos casos de tartamudez com início precoce apresenta remissão espontânea ao longo do tempo.
- 68 Crianças nas fases pré-escolar e escolar que gaguejam apresentam maior incidência de sintomas ansiosos.
- 69 Intervenções precoces têm resultados mais favoráveis no caso de tartamudez.

Em relação aos tiques, julgue os itens seguintes.

- 70 Pesquisas sugerem que a produção de tiques envolva uma disfunção dos núcleos da base.
- 71 Cerca de metade a dois terços das crianças com transtornos de tiques apresenta evolução desfavorável mesmo com tratamento.
- 72 Os tiques geralmente persistem durante o sono.

A respeito dos transtornos alimentares da infância, julgue o item seguinte.

- 73 A pica costuma ocorrer mais frequentemente em crianças com o transtorno do espectro autista e em crianças com retardo mental.

No que se refere à encoprese, julgue os itens subsequentes.

- 74 A encoprese pode ocorrer em crianças que já têm um controle do esfíncter anal e depositam intencionalmente fezes nas roupas ou em outros lugares por razões emocionais.
- 75 Na ausência de anormalidades fisiológicas, a encoprese não ocorre de forma involuntária.
- 76 Para o diagnóstico de encoprese, a criança deve apresentar o nível cronológico ou de desenvolvimento de uma criança de dois anos.

Segundo relato da mãe, a filha de oito anos de idade apresenta preocupações excessivas em relação aos pais. Refere temor que eles sofram algum acidente ou que sejam sequestrados, relata pesadelos e quer dormir na cama dos pais. Não quer ir para a aula e apresenta cefaleia, náuseas e diarreia quando se aproxima o horário de ir para a escola.

Em relação a esse caso clínico, julgue os próximos itens.

- 77 O diagnóstico mais provável é agorafobia.
- 78 O uso de antipsicóticos atípicos (como a risperidona) é a abordagem terapêutica mais indicada nesse caso.

Acerca do suicídio em adolescentes, julgue os itens a seguir.

- 79 Adolescentes que se matam muitas vezes foram expostos a eventos estressantes recentes, como rejeição, conflitos, término de relacionamentos e *bullying*.
- 80 São fatores de risco para suicídio em adolescentes ser do sexo masculino, ter histórico de abuso de substâncias psicoativas e de comportamento agressivo, depressão grave e histórico de tentativas prévias de suicídio.

Acerca das esquizofrenias de início precoce, julgue os itens a seguir.

- 81 O quadro clínico da esquizofrenia de início precoce costuma ser severo.
- 82 Na esquizofrenia de início precoce, anormalidades do neurodesenvolvimento são frequentes e a resposta ao tratamento costuma ser baixa.
- 83 O início da esquizofrenia de início precoce é mais súbito que o da esquizofrenia de início mais tardio.
- 84 Na esquizofrenia de início precoce, ocorrem frequentemente delírios paranoicos sistematizados.
- 85 Idade paterna avançada tem associação significativa com o desenvolvimento de esquizofrenia na criança.

Acerca do abuso de substâncias psicoativas na adolescência, julgue os itens subsequentes.

- 86 A maioria dos adolescentes com transtornos pelo uso de substâncias psicoativas apresenta comorbidades como transtornos de conduta, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de ansiedade e transtornos de humor.
- 87 Na infância e na adolescência precoce, fatores genéticos são mais determinantes para a propensão ao uso de substâncias psicoativas que na idade adulta, quando a influência do ambiente sobrepõe fatores genéticos.
- 88 O risco de desenvolvimento de dependência é maior entre jovens que iniciam o uso de drogas mais tardiamente.
- 89 A maioria dos adolescentes com transtornos pelo uso de substâncias psicoativas não desenvolve síndromes de abstinências clinicamente graves.
- 90 A prevalência do consumo de drogas e álcool é significativamente maior entre adolescentes do sexo masculino que do sexo feminino.
- 91 São fatores de risco para uso de drogas na adolescência: baixa autoestima, pouca religiosidade, falta de senso de responsabilidade.

Com relação às psicoterapias, julgue os itens que se seguem.

- 92 As psicoterapias cognitivo-comportamentais tendem a considerar os princípios da aprendizagem, os processos cognitivos e os fatores ambientais como responsáveis pela resposta ao tratamento.
- 93 A avaliação da eficácia de um tratamento nem sempre é possível nas psicoterapias não comportamentais, devido às diferentes formas de estruturação dos objetivos do tratamento.
- 94 A terapia comportamental é considerada uma psicoterapia de longo prazo, direcionada a eventos passados, geralmente traumáticos.
- 95 A análise funcional do comportamento é uma forma de avaliar a relação entre contingências e comportamento.

Acerca da psicofarmacologia para crianças e adolescentes, julgue os seguintes itens.

- 96 O mecanismo de ação dos psicoestimulantes, como o metilfenidato, é o aumento da liberação de noradrenalina e de serotonina por bloqueio de recaptação dessas catecolaminas nos terminais nervosos pós-sinápticos.
- 97 O uso de benzodiazepínicos em crianças com transtornos do desenvolvimento pode causar desinibição com grave modificação do comportamento.
- 98 A clonidina possui efeito antidiurético e tem sido frequentemente usada no tratamento da enurese na infância.
- 99 A dosagem de lítio necessária para alcançar níveis sanguíneos terapêuticos é menor na população pediátrica e adolescente que na população adulta, provavelmente por uma menor depuração do lítio em rins mais jovens.
- 100 É baixo o risco de discinesia tardia em crianças em uso de neurolépticos — ocorre em cerca de 5% dessa população.

Espaço livre