

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca da bexiga neurogênica (BNG), julgue os itens a seguir.

- 61 Paciente com BNG hipotônica (flácida) apresenta grande volume urinário, pressão baixa e bexiga sem contrações, diferentemente do paciente com BNG espástica, o qual apresenta volume urinário tipicamente normal ou pequeno e bexiga com contrações involuntárias.
- 62 A incontinência por transbordamento é o sintoma primário em pacientes com BNG flácida. Pacientes com BNG espástica podem ter noctúria e paralisia espástica com deficiências sensoriais, e a maioria deles tem contrações vesicais intermitentes que causam extravasamento da urina.
- 63 Pacientes com BNG e lesões cervicais ou torácicas altas da coluna vertebral apresentam risco de disreflexia autonômica, síndrome caracterizada por hipertensão arterial maligna, bradicardia ou taquicardia, cefaleia, piloereção e sudorese.
- 64 O tratamento cirúrgico da BNG em homens deve ser aventado precocemente: a esfínterectomia, que converte a bexiga em um condutor de drenagem aberto, e a rizotomia sacral (S3 e S4), que converte uma bexiga espástica em flácida, são alguns dos procedimentos utilizados.
- 65 O exame de imagem padrão para o diagnóstico da BNG é a tomografia computadorizada de abdome.

Acerca de tumores do testículo, julgue os itens a seguir.

- 66 Os dois principais subtipos de seminoma são o seminoma clássico, que representa mais de 95% dos casos e que incide em homens com idade entre vinte e cinco anos e quarenta e cinco anos, e o seminoma espermatocítico, que é um tipo raro de seminoma que tende a ocorrer em crianças.
- 67 Mais de 90% das malignidades testiculares se desenvolvem a partir de células germinativas.
- 68 O coriocarcinoma é um tipo muito agressivo e raro de tumor que ocorre em adultos. Em que pese seu rápido crescimento, esses tumores raramente geram metástases a distância.
- 69 Os tumores estromais do testículo se desenvolvem nos tecidos que produzem hormônios e nos tecidos de suporte dos testículos. Os dois tipos principais são: tumores de células de Leydig e tumores de células de Sertoli.
- 70 O linfoma é o tumor maligno de testículo secundário mais comum e, em homens com mais de trinta anos de idade, ocorre com mais frequência do que os tumores primários.

Acerca de trauma geniturinário, julgue os itens subsequentes.

- 71 Em geral, o rim é o órgão mais lesado nesse tipo de trauma. As lesões de ureter são mais raras e causadas, em sua maioria, por ferimentos penetrantes ou por iatrogenia.
- 72 O manuseio não operatório dos traumas renais tem sido mais frequentemente adotado, mesmo nas lesões mais graves, substituindo a tendência passada de renorrafias.
- 73 Nos traumatismos abdominais contusos, a ausência de hematúria macroscópica praticamente exclui a possibilidade de lesão renal grave.
- 74 Em pacientes estáveis hemodinamicamente, o trauma renal deve ser avaliado e estadiado por meio de TC, que, como método diagnóstico, substitui, em larga escala, tanto a urografia excretora quanto a arteriografia.
- 75 A arteriografia renal ainda é adotada no estudo de sangramentos renais tardios pós-cirúrgicos ou nos casos em que haja formação de fistula arteriovenosa, quando o exame tem papel diagnóstico e terapêutico.

Com relação ao transplante renal, julgue os itens subsequentes.

- 76 Tanto no Brasil como no exterior, o fator que mais limita a realização de transplantes é a carência de doadores, mas, em razão das campanhas de conscientização da população para a importância da doação, o tempo de espera e o número de pacientes nas filas têm decrescido continuamente.
- 77 Os três principais exames laboratoriais pré-transplante são tipagem sanguínea, tipagem (análise) do HLA e prova-cruzada de linfócitos (*cross-match*).
- 78 Infecção ou hipertensão grave são as duas principais causas para indicação de nefrectomias nos receptores, caso contrário os rins próprios (dos receptores) não serão ressecados.
- 79 Qualquer pessoa pode se dispor a ser doadora de rim, desde que satisfaça os critérios de saúde pré-estabelecidos. Quando não há parentesco entre receptor e doador, um termo de consentimento informado é documento suficiente para proceder-se à doação.
- 80 Cerca de 70% dos rins implantados não funcionam imediatamente após o transplante — somente uma ou duas semanas após o procedimento.

Em relação a litíase urinária, julgue os itens a seguir.

- 81 A neoplasia maligna é a principal causa de hipercalcúria em pacientes hospitalizados.
- 82 O cálculo de *struvita* é o mais comum em mulheres.
- 83 A obesidade é um fator de risco independente para litíase urinária, especialmente em mulheres.

Em relação às derivações urinárias com uso de seguimentos intestinais após a cistectomia radical, julgue os itens subsequentes.

- 84** A acidose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica é a principal complicação metabólica com o uso do estômago nas derivações urinárias.
- 85** A complicação metabólica observada com o uso do íleo e do cólon é a acidose metabólica hiperclorêmica.
- 86** A obesidade mórbida é uma contraindicação para a realização de um conduto ileal.

Em relação a anatomia, fisiologia e anomalias congênitas do sistema geniturinário, julgue os itens a seguir.

- 87** Devido à fusão dos seus polos inferiores, o rim em ferradura ocupa uma posição mais baixa do que o normal e sua ascensão é bloqueada pela artéria mesentérica superior.
- 88** O ureter retrocava é uma anomalia do desenvolvimento do ureter do lado direito e pode causar obstrução do trato urinário superior.
- 89** Os rins ectópicos são, na maioria das vezes, assintomáticos.
- 90** O ureter ectópico pode causar incontinência em meninos.
- 91** Normalmente, a torção de testículo extravaginal ocorre intraútero e o fator de risco é a criptorquidia.

A respeito do tratamento de pacientes com anomalias do sistema geniturinário, julgue o próximo item.

- 92** O tratamento da torção do apêndice testicular é conservador, com uso de anti-inflamatórios e repouso.

Com relação às anomalias congênitas do sistema geniturinário, julgue os itens seguintes.

- 93** O rim ferradura é formado pela fusão cruzada da linha média dos dois rins, que funcionam independentemente, um em cada lado da linha mediana e são ligados por um istmo de parênquima renal funcionante ou por tecido fibroso. Na grande maioria dos casos a fusão ocorre entre as partes superiores.
- 94** Os rins em ferradura, embora sejam assintomáticos e geralmente detectados por acaso, estão sujeitos a uma série de complicações como resultado de má drenagem, o que pode ocasionar sintomatologia clínica.
- 95** No recém-nascido, a ausência de testículo na bolsa escrotal não significa necessariamente criptorquidia.
- 96** O tratamento da criptorquidia pode ser realizado através de cirurgia ou com hormônios, conforme a opinião do profissional envolvido, mas, independentemente da escolha, há concordância geral de que, ao final do quarto ano de vida, o testículo afetado deve estar colocado na bolsa escrotal.

Em relação ao tratamento cirúrgico da hipospádia, julgue o item a seguir.

- 97** O objetivo do tratamento cirúrgico é reconstruir o canal uretral até a ponta do pênis, sendo as cirurgias, de modo geral, feitas em dois tempos.

A respeito de espermograma na avaliação da fertilidade masculina, julgue o próximo item.

- 98** Apesar de ser o exame mais utilizado na prática clínica, os parâmetros seminais avaliados possuem limitações relacionadas à etiologia da disfunção espermática, assim como na determinação da sua capacidade de fertilização.

Julgue os itens subsequentes, relativos à tuberculose do aparelho geniturinário.

- 99** Pode haver envolvimento renal como parte da disseminação sistêmica da infecção ou como doença geniturinária localizada, sendo, na primeira hipótese, a infecção pulmonar o foco primário na maioria dos casos.
- 100** A maioria dos pacientes assintomáticos apresenta EAS normal.

Espaço livre