- Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.
- Em sua prova, caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de prova poderão ser utilizados para anotações, rascunhos etc.

PROVA OBJETIVA

Considerando que a um paciente acometido com infarto agudo do miocárdio tenha sido administrada, por via intravenosa, solução de enoxaparina sódica 3 mg/mL na dosagem de 0,3 mg/kg, julgue os itens que se seguem.

- 1 A administração concomitante da enoxaparina com o ácido acetilsalicílico potencializaria a ação farmacológica da enoxaparina no referido paciente.
- 2 Se o peso desse paciente fosse de 45 kg, para atingir-se a dosagem requerida, o volume da solução de enoxaparina sódica 3 mg/mL injetado deveria ser de 15 mL.
- 3 Se o paciente pesasse 95 kg, a dose da solução do referido fármaco administrada por via intravenosa deveria ser de 28,5 mg.
- 4 Recomenda-se a administração intravenosa do anticoagulante protamina no caso de constatação de que o paciente recebeu uma superdosagem acidental de enoxaparina sódica.
- 5 O tratamento desse paciente com enoxaparina sódica justifica-se por ser esse fármaco um sal cálcico com propriedades coagulantes.

No que se refere aos serviços de saúde e às ações para promoção, proteção e recuperação da saúde, julgue os itens a seguir.

- 6 Compete aos municípios coordenar as ações de vigilância epidemiológica e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade para reduzir os agravos à saúde.
- 7 Cidadãos que contribuem para a previdência social têm prioridade de atendimento quanto aos serviços de atenção básica à saúde disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde.
- 8 A saúde é promovida por fatores que incluem alimentação saudável, acesso à educação, trabalho e renda.
- 9 O Sistema Único de Saúde é um conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas e complementado por instituições privadas, preferencialmente entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

No que se refere à Política Nacional de Atenção Básica à Saúde, julgue os itens subsequentes.

- 10 As redes de atenção à saúde permitem a integração dos diferentes níveis de complexidade de cuidados à saúde, possibilitando a continuidade assistencial.
- 11 O acesso à atenção básica em saúde é delimitado com base em aspectos culturais, étnicos e socioeconômicos.
- 12 A vacinação é um exemplo de prevenção de agravos à saúde realizada em unidades de atenção básica de saúde.
- 13 O Programa Academia de Saúde promove saúde de forma coletiva com a prática de exercícios físicos sob orientação qualificada.

Com relação à assistência farmacêutica na atenção básica à saúde, julgue os próximos itens.

- 14 Captopril e hidroclorotiazida são bloqueadores beta-adrenérgicos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde para tratamento da hipertensão arterial e para profilaxia da enxaqueca.
- 15 O levantamento da situação de saúde nos estados e municípios pode gerar dados epidemiológicos que sirvam de base para a implementação dos planos de ação da assistência farmacêutica.
- 16 O ciclo da assistência farmacêutica inicia-se com a seleção de medicamentos, realizada com o objetivo de evitar compras e perdas desnecessárias e a descontinuidade no suprimento de produtos farmacêuticos.
- 17 É atribuição da Comissão de Farmácia e Terapêutica emitir parecer técnico e relatório dos processos de compras relacionados aos produtos sob sua responsabilidade.
- 18 Prednisona e izoniazida são medicamentos anti-inflamatórios fornecidos pelo Sistema Único de Saúde para tratamento da tuberculose.

A respeito das enfermidades cardiopulmonares e da assistência farmacêutica, julgue os itens a seguir.

- 19 A farmacoterapia disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde para o tratamento do tabagismo minimiza os sintomas da síndrome de abstinência ocasionada pelo abandono do cigarro.
- 20 O tabagismo pode provocar acometimento concomitante do pulmão e do coração, provocando doenças cardiopulmonares.
- 21 A farmacoterapia disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde para a cessação do tabagismo consiste em adesivos, gomas e pastilhas de nicotina e comprimidos de cloridrato de bupropiona.

Em relação à administração de medicamentos pela via pulmonar, que pode ser realizada com sistemas inalatórios pressurizados, inaladores de pó seco e nebulizadores, julgue os itens que se seguem.

- 22 A administração via pulmonar de medicamentos por inaladores de pó seco requer coordenação da técnica de inalação pelo paciente.
- 23 Os inaladores pressurizados são apresentados em embalagens herméticas e dão maior estabilidade ao medicamento.
- 24 A administração pela via pulmonar evita a metabolização de fármacos; por isso, requer dosagem inferior que a administrada por via oral.
- 25 A administração de fármacos suspensos por via pulmonar provoca efeito local, enquanto a de fármacos dissolvidos provoca efeito sistêmico.
- 26 Os inaladores pressurizados apresentam um propelente, comprimido ou liquefeito, que permite a formação da dispersão.
- 27 O atingimento de segmentos profundos do trato respiratório é o critério para se considerar invasiva a administração pulmonar de medicamentos com sistemas inalatórios pressurizados, inaladores de pó seco e nebulizadores.
- 28 O conteúdo de um aerossol que apresenta fármaco e excipientes solúveis no propelente liquefeito consiste em um sistema trifásico.

medicamento	meses/quantidade de comprimidos consumidos				perdas
	jan.	fev.	mar.	abr.	
propranolol cloridrato (caixa com 30 comprimidos de 40 mg)	500	600	500	552	150

O quadro precedente apresenta o histórico de consumo de um medicamento disponibilizado em uma unidade de saúde. Com base nos dados apresentados, julgue os itens subsecutivos.

- 29 O consumo médio mensal do medicamento em tela é de 538 comprimidos.
- 30 O histórico de consumo apresentado no quadro consiste em uma das ferramentas utilizadas na assistência farmacêutica para a programação de medicamentos, permitindo estimar a demanda da unidade de saúde.

A imagem precedente ilustra uma molécula de budesonida, fármaco da classe dos glicocorticoides composto pelas seguintes propriedades físico-químicas: solubilidade aquosa de 0,0457 mg/mL; log P de 2,42; e pKa de 13,74. Considerando essas informações, julgue os itens a seguir.

- 31 A budesonida não pode ser formulada na forma de creme, devido ao seu baixo coeficiente de partição, indicativo de hidrofobicidade.
- 32 O valor de pKa da budesonida indica que, para que essa molécula seja veiculada em uma forma farmacêutica líquida para aplicação nasal, o sistema deve ser tamponado.
- 33 A budesonida pode ser administrada por via pulmonar para o tratamento da asma desde que completamente solubilizada nas gotículas do aerossol.
- 34 A budesonida apresenta eficácia no tratamento de rinosinusites alérgicas, visto que os mecanismos de ação dos glicocorticoides incluem a vasoconstrição e a inibição da hipersecreção e da reação alérgica.
- 35 Essa molécula encontra-se na forma não ionizada no pH fisiológico, o que contribui para a sua absorção tópica.
- 36 Um *spray* nasal de 6 mL (volume equivalente a 120 doses, cada uma com 32 µg de budesonida) pode ser facilmente formulado como uma solução aquosa, bastando, para isso, dispersar o fármaco em solução aquosa isotônica.

Acerca da dexclorfeniramina, fármaco anti-histamínico de primeira geração ou clássico, e da loratadina, fármaco anti-histamínico de segunda geração ou novo, julgue os itens que se seguem.

- 37 Tanto a dexclorfeniramina quanto a loratadina podem ser utilizadas para alívio dos sintomas da rinite alérgica, tais como coceira nasal, coriza e espirros.
- 38 A dexclorfeniramina provoca efeitos de sedação porque atravessa a barreira hematoencefálica e ocupa receptores H₁ cerebrais que estão relacionados com o controle dos estados de vigília.
- 39 A principal diferença entre a dexclorfeniramina e a loratadina é que a primeira atua sobre os receptores H₁ e H₂, ao passo que a segunda atua seletivamente sobre os receptores H₂ periféricos.
- 40 A administração desses fármacos concomitantemente à ingestão de bebidas alcoólicas potencializa o efeito depressor do álcool no sistema nervoso central.
- 41 A loratadina interfere no *clearance* mucociliar na medida em que demonstra efeito adicional antitussígeno.

A furosemida é um medicamento que bloqueia o sistema cotransportador de $\text{Na}^+\text{K}^+2\text{Cl}^-$ localizado na membrana celular luminal do ramo ascendente da alça de Henle e é eliminada, principalmente, na forma de fármaco inalterado. Com relação a esse medicamento, julgue os itens seguintes.

- 42 A furosemida é indicada para tratamento de hipertensão arterial.
- 43 Após administração oral, a biodisponibilidade da furosemida é de aproximadamente 100% em pacientes sadios, uma vez que esse fármaco não passa por biotransformação hepática.
- 44 A meia-vida desse fármaco depende, entre outros fatores, do estado funcional dos rins do usuário da medicação.
- 45 Trata-se de um medicamento diurético da classe dos poupadores de potássio, indicado a pacientes vulneráveis à hipocalcemia.

A respeito de um medicamento administrado por via oral e que contém bambuterol (pró-fármaco da terbutalina, agonista adrenérgico que estimula predominantemente os receptores beta-2), julgue os itens subsequentes.

- 46 Tremores e distúrbios cardíacos, como palpitações, são efeitos adversos comuns nessa classe de medicamentos.
- 47 Para início do efeito terapêutico, o bambuterol deve ser biotransformado, ou seja, metabolizado.
- 48 Como agonista, o bambuterol se liga a receptores fisiológicos e simula efeitos de compostos endógenos.
- 49 Esse medicamento é indicado para tratamento da asma brônquica.
- 50 Os receptores beta-adrenérgicos, quando estimulados, atuam na recaptção da acetilcolina, limitando o grau de broncoconstrição.

Acerca das formulações farmacêuticas de fármacos para administração pelas vias nasal e pulmonar, julgue os seguintes itens.

- 51 Formulações farmacêuticas de aplicação tópica nasal devem ser necessariamente isotônicas.
- 52 Soluções tópicas nasais isotônicas podem ser preparadas solubilizando-se o princípio ativo em solução de soro fisiológico.
- 53 Formulações medicamentosas de aplicação nasal que contenham polímeros mucoadesivos podem melhorar a disponibilidade local dos fármacos, devido ao aumento do tempo de permanência local.
- 54 Soluções, suspensões e emulsões podem ser utilizadas para liberação nasal de fármacos.
- 55 No tratamento de crises de broncoespasmo, as formulações administradas pela via inalatória proporcionam melhor índice terapêutico, ou seja, melhor relação entre eficácia e tolerabilidade que as formulações administradas por via oral.

A respeito de medicamentos com o princípio ativo losartana potássica, julgue os itens subsequentes.

- 56 A losartana potássica é indicada para o tratamento da hipertensão por ser um antagonista do receptor (tipo AT1) do vasoconstritor angiotensina II.
- 57 A losartana potássica pertence à classe de fármacos denominada inibidores da enzima conversora da angiotensina, ou, simplesmente, inibidores da ECA.
- 58 Caso o medicamento de referência seja apresentado na forma de comprimidos revestidos, o medicamento genérico deve ser também apresentado, necessariamente, na forma de comprimidos revestidos, mesmo que o revestimento não interfira na liberação do princípio ativo.
- 59 O medicamento registrado como referência da losartana potássica deve ter qualidade, eficácia terapêutica e segurança comprovadas por estudos clínicos, enquanto o medicamento genérico exige somente estudos *in vitro* para ser registrado.
- 60 Medicamentos similares de losartana potássica não podem ser intercambiáveis com o medicamento de referência.

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (PNAD), a asma atinge 6,4 milhões de brasileiros, sendo as mulheres as mais acometidas pela doença, que é responsável por mais de 100.000 internações no Sistema Único de Saúde (SUS). Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.

- 61 Corticoides por inalação podem ser usados com segurança por pacientes asmáticos durante a gestação e durante o período de amamentação.
- 62 Práticas de controle ambiental, como redução de poeira no local, eliminação do mofo, retirada de cortinas e tapetes que podem acumular pó, são medidas preventivas para prevenção primária e secundária de asma: elas devem ser estimuladas para reduzir a ocorrência e a gravidade das exacerbações da doença.
- 63 Os broncodilatadores com ação anti-inflamatória utilizados no tratamento da asma incluem fármacos simpatomiméticos e corticosteroides.
- 64 Os agonistas beta-2 adrenérgicos de ação curta, classificados como simpatomiméticos, são agentes de inalação e constituem a primeira opção para o alívio de crises instaladas em todos os estágios da asma, por sua ação ter rápido início (cinco minutos ou menos), pico entre trinta e sessenta minutos e duração de quatro a seis horas.
- 65 Os efeitos adversos dos broncodilatadores incluem bradicardia, aumento da saturação de oxigênio e sonolência.

Em relação à assistência farmacêutica, julgue os itens subsequentes.

- 66 A assistência farmacêutica consiste de atividades que envolvem o uso de medicamentos cujo maior beneficiário é o paciente; deve ser realizada de forma sistêmica, articulada e sincronizada e resulta da combinação de estrutura, pessoas e tecnologias para o desenvolvimento dos serviços em determinado contexto social.
- 67 No gerenciamento da assistência farmacêutica, os níveis de planejamento envolvem estratégias focadas em atividades gerenciais de curto prazo.
- 68 Os fatores que influenciam na falta de medicamentos incluem a ausência de uma lista padronizada de medicamentos, recursos financeiros escassos e perdas de medicamentos.
- 69 A melhoria na qualidade da atenção à saúde depende primordialmente da redução da perda de medicamentos.
- 70 Para o adequado exercício do cargo de gerente de farmácia, basta que o profissional tenha uma visão técnica restrita da sua profissão, dispensando-se conhecimentos e habilidades intrínsecos aos contextos administrativos e psicossociais.

A respeito da terapia antineoplásica, julgue os itens subsecutivos.

- 71 O grupo dos antineoplásicos naturais é formado por alcaloides derivados da vinca, etoposido e teniposido, antibióticos e paclitaxel.
- 72 O antibiótico antineoplásico bleomicina — que pode causar efeitos adversos, como cardiotoxicidade e nefrotoxicidade — é utilizado no tratamento de pacientes com câncer por se ligar fortemente às bases púricas e pirimidínicas, interrompendo o prolongamento da cadeia de DNA e causando distorções que bloqueiam a síntese de novo RNA nas células cancerígenas.
- 73 A via mais utilizada para a administração dos quimioterápicos é a oral.
- 74 Os principais efeitos tóxicos dos agentes alquilantes — um grupo de substâncias químicas cuja característica comum é a interrupção dos ácidos nucleicos — são estomatite e alopecia moderada.

Acerca da terapia de nutrição enteral e parenteral, julgue os próximos itens.

- 75 A principal indicação clínica para a nutrição parenteral é a insuficiência cardíaca.
- 76 O tipo de tubo utilizado para a nutrição enteral varia com a duração da nutrição: os tubos de nutrição enteral nasoentéricos são utilizados quando a alimentação tiver de ser adotada por longo tempo.
- 77 Na administração de nutrição enteral por meio de tubos nasogástricos deve-se considerar a quantidade de volume adequado de água pela parede do tubo, de 15 mL a 30 mL, conforme o calibre do tubo, observando-se a restrição hídrica dos pacientes.
- 78 A nutrição parenteral é indicada nos casos em que não é possível alimentar o paciente por via oral ou essa via é indesejada, quando a absorção de nutrientes é incompleta e, principalmente, quando as condições clínicas estão associadas ao estado de desnutrição.

Acerca da evidência clínica e da avaliação de tecnologia em saúde, julgue os seguintes itens.

- 79 Estudo de caso, opinião de especialistas e conclusões extrapoladas e elaboradas indiretamente com base nos desfechos de estudos científicos são evidências clínicas suficientes para a tomada de decisões.
- 80 No Brasil, a participação da população no processo de avaliação de tecnologia em saúde no SUS é incipiente, carecendo de investimentos para que seja inserida na rotina de incorporação, exclusão ou alteração de medicamentos, produtos e procedimentos.

Com relação aos medicamentos sujeitos a controle especial no Brasil, julgue os itens a seguir, de acordo com normatizações da ANVISA.

- 81 Os medicamentos que contenham substâncias constantes das listas C1 podem ser distribuídos, devendo as amostras grátis ser distribuídas em suas embalagens originais.
- 82 A notificação de receita A é de cor azul; a confecção do talonário e a numeração das folhas são de responsabilidade do prescritor e o tratamento pode ser prescrito por sessenta dias.
- 83 A notificação de receita B, de cor azul, tem validade de trinta dias contados a partir de sua emissão e somente dentro da unidade federativa que concedeu a numeração.

No que se refere à farmacovigilância, julgue os itens que se seguem.

- 84 Define-se reação adversa medicamentosa qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional, a determinado medicamento administrado nas doses geralmente utilizadas para profilaxia, diagnóstico ou terapia de doenças ou para a modificação de funções fisiológicas humanas.
- 85 Reações do tipo A, classificadas como idiossincrásicas, são as mais raras e não apresentam relação causal com o medicamento.
- 86 As reações adversas classificadas como graves são aquelas que ameaçam a vida, provocam ou prolongam a hospitalização e causam anomalia congênita.
- 87 Evento adverso corresponde a qualquer ocorrência médica desfavorável durante o tratamento com a utilização de determinado medicamento, mas que não apresenta necessariamente relação causal com esse tratamento.

A doença pulmonar obstrutiva crônica, em ascensão no mundo contemporâneo, é uma doença evitável e raramente atribuída à deficiência genética. Vários fatores são responsáveis pelo aumento de incidência dessa doença, como o tabagismo ativo e passivo, a poluição ambiental e ocupacional e a demora de implementação de políticas públicas eficazes para a sua prevenção.

Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto. Abr.-jun./2013 (com adaptações).

Considerando o texto precedente e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens seguintes.

- 88 O aumento de peso é consequência relacionada aos sintomas comumente manifestados por pacientes que apresentam doença pulmonar obstrutiva crônica.
- 89 A doença pulmonar crônica obstrutiva é causada pela presença de subtipos de doenças que afetam a respiração, incluindo-se a bronqueolite obstrutiva e o enfisema.
- 90 O tratamento medicamentoso da doença pulmonar obstrutiva crônica inclui a combinação de broncodilatadores de longa duração beta antagonistas, anti-inflamatórios COX-2 seletivos e fármacos colinérgicos.

Com base no Código de Ética Farmacêutica, estabelecido pela Resolução n.º 596/2014, julgue os itens que se seguem.

- 91 É vedado ao farmacêutico o exercício simultâneo da farmácia e da nutrição.
- 92 Na dispensação hospitalar interna, é permitida a dispensação de medicamento fracionado com identificação codificada, desde que sem omissão de seu nome ou de sua fórmula.
- 93 É vedado ao farmacêutico delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão farmacêutica.
- 94 A recusa do recebimento de mercadorias ou produtos sem rastreabilidade de sua origem, sem nota fiscal ou em desacordo com a legislação vigente é uma faculdade do farmacêutico.
- 95 O profissional farmacêutico responde individualmente, mas não solidariamente, quando realiza ato de dispensação em atendimento a prescrição contrária aos ditames da ciência, da ética e da técnica.

A respeito dos inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA), tais como o captopril e o enalapril, julgue os itens a seguir.

- 96 Tosse seca é um efeito adverso que acomete mais da metade dos pacientes que usam IECA.
- 97 Os IECA são contraindicados a pacientes com redução da função renal, por provocarem elevação de ureia e creatinina.
- 98 Em caso de intolerância, com exceção da intolerância renal, esses inibidores podem ser substituídos por bloqueadores dos receptores da angiotensina II (BRA) em afecções como insuficiência cardíaca sistólica e hipertensão.
- 99 Os IECA trazem benefícios cardiovasculares quando combinados com bloqueadores dos receptores da angiotensina II.
- 100 Os IECA podem ser utilizados para reduzir o remodelamento cardíaco no pós-infarto.
- 101 Esses inibidores são indicados para o tratamento da hipertensão em paciente gestante.

Com relação às disposições da Resolução n.º 586/2013 do Conselho Federal de Farmácia acerca da prescrição farmacêutica em âmbito nacional e das áreas de atuação do profissional farmacêutico, julgue os próximos itens.

- 102 Entre os produtos com finalidade terapêutica que podem ser prescritos pelo farmacêutico incluem-se as plantas medicinais cuja dispensação prescinde de prescrição médica.
- 103 É vedado ao farmacêutico prescrever medicamento cuja dispensação exija prescrição médica.
- 104 Na eventualidade de existir acordo de colaboração, é permitido ao farmacêutico alterar a prescrição de outro prescritor, desde que a justificativa seja a ele comunicada.
- 105 O uso da denominação comum brasileira ou da denominação comum internacional é obrigatório no âmbito do SUS e preferível no âmbito privado.

Entre as afecções comuns à população ambulatorial e hospitalar estão as infecções bacterianas, de modo que o aumento na resistência aos antibióticos disponíveis torna a promoção do uso racional desses medicamentos uma preocupação de saúde pública. A respeito da terapia antimicrobiana e da resistência bacteriana, julgue os itens subsequentes.

- 106 As fluorquinolonas são antibióticos tempo-dependentes que diferem dos beta-lactâmicos, cuja atuação é dependente da concentração e cujo efeito é pós-antibiótico.
- 107 A ceftazidima difere das demais cefalosporinas de terceira geração por possuir atividade superior contra bactérias gram-negativas.
- 108 O ertapeném é o carbapenêmico de escolha para o tratamento de *P. aeruginosa*.
- 109 A penicilina é a opção terapêutica com maior evidência para o tratamento de sífilis em gestantes.
- 110 A cilastatina associada ao imipeném evita a degradação do imipeném por uma enzima presente no túbulo renal.
- 111 Os principais efeitos adversos dos aminoglicosídeos são a nefrotoxicidade e a ototoxicidade.

A respeito de medicamentos beta-bloqueadores, julgue os itens subsequentes.

- 112 Os beta-bloqueadores aumentam o risco de efeito rebote observado na interrupção do tratamento com clonidina.
- 113 Esses medicamentos são contraindicados para pacientes com insuficiência cardíaca crônica.
- 114 Os beta-bloqueadores podem provocar bloqueio atrioventricular.

A respeito do tratamento medicamentoso do diabetes melito (DM), julgue os próximos itens.

- 115 A hemoglobina glicada (A1c) não deve ser utilizada regularmente no controle da resposta terapêutica ao tratamento.
- 116 A metformina é reconhecidamente segura devido ao baixo risco de causar hipoglicemia ou acidose láctica.
- 117 A gliclazida é considerada um sensibilizador da insulina e age em PPAR- γ .
- 118 A insulina periférica é capaz de reproduzir o efeito direto da insulina endógena sobre o metabolismo hepático.
- 119 A insulino terapia é indicada como opção secundária de tratamento para pacientes com DM tipo 1 se o controle com a medicação oral mostrar-se inadequado.
- 120 A glicemia varia não apenas em razão da ação da insulina, mas também de fatores como a ingestão de alimentos e a ação de hormônios contrarreguladores como a epinefrina e o glucagon.