

## PROVA TÉCNICA

No que se refere à anatomia e à fisiologia humanas, julgue os itens a seguir.

- 31 A aorta conduz o sangue desoxigenado do corpo ao coração.
- 32 A faringe tem funções tanto na respiração como na digestão.
- 33 O pâncreas faz parte do sistema endócrino.

Julgue os próximos itens, a respeito da histologia dos tecidos.

- 34 Os ossos do esqueleto contêm diversos tipos de tecidos, além do tecido ósseo.
- 35 O sangue é classificado como tecido conjuntivo.
- 36 O tecido epitelial não apresenta terminações nervosas ou vasos sanguíneos.

No que concerne a farmacologia, julgue os itens que se seguem.

- 37 Ocorre agonismo entre fármacos quando o efeito de um desses fármacos é diminuído ou anulado na presença de outro.
- 38 Os fármacos atuam com especificidade, ou seja, atuam unicamente sobre as células-alvo.

Com relação a microbiologia e parasitologia, julgue os itens seguintes.

- 39 Determinadas bactérias presentes no intestino produzem vitaminas essenciais não sintetizadas pelo corpo humano.
- 40 A malária é uma doença causada por vírus.
- 41 O que diferencia bactérias gram-positivas de bactérias gram-negativas são variações da estrutura da parede celular.

Com base nas orientações nacionais para a segurança do paciente em serviços de saúde e na norma brasileira para prevenção e controle das infecções hospitalares, julgue os itens subsecutivos.

- 42 Enquanto se mantiver assistindo um mesmo paciente, o profissional de saúde está dispensado de lavar as mãos.
- 43 A varredura seca interna às unidades de saúde só deve ser realizada nas áreas de acesso público.
- 44 O uso de preparado alcoólico adequado para as mãos pode substituir a higienização com água e sabonete em situações em que as mãos não estejam visivelmente sujas.
- 45 Na prestação de cuidados a pacientes críticos, recomenda-se a lavagem das mãos com antisséptico.

Julgue os itens subseqüentes com base na Política Nacional de Humanização (PNH) como referência da organização do processo de trabalho em saúde.

- 46 A implantação de práticas integrativas e complementares é um dos parâmetros de adesão à PNH na atenção especializada.
- 47 A garantia de visita aberta é parâmetro de adesão à PNH na atenção hospitalar.

Julgue os itens seguintes, relativos a assistência materno-infantil.

- 48 Aleitamento materno complementado é o termo utilizado para definir a situação em que a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões) e sucos de frutas.
- 49 O aleitamento materno é contraindicado em condições clínicas maternas de tratamento quimioterápico ou radioterápico, de infecção por HIV e de infecção pelo HTLV (vírus linfotrópico humano de células-T).
- 50 O tétano neonatal pode ser prevenido com a aplicação, na primeira semana de vida do neonato, da vacina contendo o toxoide tetânico.
- 51 As vias aéreas de pacientes recém-nascidos considerados graves submetidos a intubação orotraqueal em unidades de assistência podem ser aspiradas pelo técnico de enfermagem, salvo em casos de emergência.

Julgue os próximos itens, referentes à assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico.

- 52 O banho com antisséptico está indicado a pacientes que irão submeter-se a cirurgias de grande porte ou cirurgias com implantes, devendo ser realizado três horas antes do procedimento cirúrgico.
- 53 As fezes semipastosas são resíduos característicos comumente observados na bolsa coletora de pacientes submetidos à ileostomia.
- 54 No pós-operatório imediato, o curativo da incisão cirúrgica deve ser mantido ocluído por vinte e quatro horas, podendo a área permanecer exposta e ser lavada com água e sabão após esse período se na incisão estiver incisão limpa e fechada.
- 55 A aferição da pressão arterial sistêmica em mulheres submetidas a mastectomia bilateral com esvaziamento ganglionar deverá ser executada em membros inferiores.
- 56 A inserção de cateter vesical em ambiente cirúrgico é competência privativa do enfermeiro e do técnico de enfermagem.

Em relação à assistência de enfermagem ao paciente com disfunção endócrina, julgue os itens a seguir.

- 57 No caso de administração de dois tipos de insulina na mesma seringa, pode-se associar a insulina intermediária com a insulina rápida, e a insulina intermediária com análogo de insulina ultrarrápida, para uso imediato após o preparo.
- 58 Para o controle glicêmico em portadores de diabetes melito tipo 2, é recomendado que os pacientes sejam submetidos a testes de glicemia capilar pós-prandiais trinta minutos após a ingestão de alimentos no café da manhã, no almoço e no jantar.
- 59 Em se tratando de crianças e adolescentes com diabetes melito, valores entre 60 mg/dL e 70 mg/dL obtidos em teste de glicemia capilar indicam risco de hipoglicemia grave.
- 60 A ação da insulina de ação intermediária (NPH – *neutral protamina Hagedorn*) inicia-se entre 0,5 h e 1 h após a administração por via subcutânea, tem pico de ação entre 4 h e 10 h, e seu efeito dura entre 10 h e 18 h.

No que se refere a procedimentos técnicos de enfermagem, julgue os itens subsequentes.

- 61 A remoção do cateter periférico é indicada quando não há medicamentos endovenosos prescritos e se esse cateter não tiver sido utilizado nas últimas vinte e quatro horas.
- 62 A troca do equipo e do dispositivo complementar de administração de hemocomponente e de nutrição parenteral deve ocorrer a cada bolsa de infusão.
- 63 A coleta de urina de pacientes em uso de cateter urinário em sistema de drenagem fechado ocorre por meio da aspiração de urina com agulha pelo dispositivo de coleta posicionado no tubo de drenagem.
- 64 A cobertura de um cateter periférico visa proteger o sítio de punção e minimizar a possibilidade de infecção, devendo a troca da cobertura ocorrer em intervalos preestabelecidos de quarenta e oito horas.

A respeito da hipertensão arterial sistêmica, julgue os itens a seguir.

- 65 O uso de cocaína pode resultar em elevação abrupta da pressão arterial do usuário.
- 66 Pacientes que apresentam urgência hipertensiva caracterizada por pressão diastólica igual ou superior a 120 mmHg, sem alteração clínica, têm maior risco de ter comprometimento cardiovascular do que hipertensos que não a apresentam.
- 67 A gestante que apresenta pressão sistólica igual ou superior a 140 mmHg e pressão diastólica igual ou superior a 90 mmHg é considerada hipertensa.

Acerca de diabetes melito (DM), julgue os itens seguintes.

- 68 Os sinais precoces da hiperglicemia são sudorese, palpitação, cefaleia, tremores e inquietação.
- 69 Suspeita-se de DM tipo 2 em caso de ocorrência de complicações tardias como retinopatia, doença arteriosclerótica, proteinúria, neuropatia periférica e infecções recorrentes.
- 70 A glicemia capilar deve ser realizada pelo menos três vezes ao dia em pacientes portadores de DM que fazem uso de múltiplas doses de insulina.

No que se refere à atuação do técnico de enfermagem na assistência a pacientes em urgência e emergência, julgue os itens subsequentes.

- 71 No transporte de paciente com drenagem pleural, recomenda-se pinçar o dreno para evitar complicações pulmonares.
- 72 Durante uma crise convulsiva, deve-se proteger o paciente, mantê-lo em decúbito lateral, observar a duração e a característica dos movimentos, a alteração da pupila, a incontinência fecal ou vesical, o seu comportamento e se há sonolência.
- 73 Em acidente com picada de cobra, deve-se aplicar, por via intramuscular, soro antiofídico diluído em solução fisiológica, após a realização de teste de sensibilidade cutânea.

As ações para a implantação da humanização do cuidado com o paciente incluem

- 74 assegurar a presença do acompanhante, da rede social do paciente e de visita aberta, conforme a necessidade, respeitando-se a dinâmica de cada unidade hospitalar.
- 75 definir o local para a sala de acolhimento e designar o profissional responsável por esse atendimento.
- 76 adotar o modelo de gestão centralizada e hierarquizada para garantir o controle dos protocolos de atendimento sem a interferência dos familiares.
- 77 utilizar a avaliação de risco para priorizar o atendimento da demanda nas unidades de urgência, de emergência, nos prontos-socorros, nos prontos-atendimentos e nas unidades de assistência pré-hospitalares.

No que se refere a assistência em terapia intensiva, julgue os próximos itens.

- 78 Os principais riscos da cateterização uretral são o trauma e a infecção.
- 79 A hipoventilação respiratória é um sinal característico do paciente que apresenta cetoacidose diabética.
- 80 O dispositivo de contenção dos punhos ou tornozelos do paciente deve ser amarrado nas laterais da cama.

Espaço livre