

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A respeito da localização e do funcionamento das estruturas internas do corpo humano, julgue os itens seguintes.

- 51 O fígado, cuja função é a síntese da lipase, localiza-se à esquerda, com uma pequena parte ocupando o lado direito do abdome, imediatamente abaixo do diafragma.
- 52 No ato de micção, o processo de contração do músculo detrusor é um dos responsáveis pelo esvaziamento da bexiga.
- 53 A função essencial das meninges, que são as membranas conjuntivas do sistema nervoso central, é proteger os centros nervosos.
- 54 A cavidade ocupada pelo coração e o esôfago, pelos grandes vasos, nervos e vasos linfáticos é denominada mediastino.

A administração de medicamentos pela equipe de enfermagem constitui uma tarefa que demanda grande responsabilidade, competência técnica e conhecimento de fármacos. Com relação ao preparo, à administração e à ação desses produtos, julgue os itens a seguir.

- 55 Antes de administrar anti-hipertensivo, o técnico deve observar os valores da pressão arterial do paciente, visto que o efeito hipotensor desse fármaco pode ser potencializado no paciente com pressão arterial abaixo dos níveis normais.
- 56 No corpo humano, a dipirona, cujas principais vias de administração são a oral, a intramuscular e a endovenosa, tem ação analgésica e antitérmica.
- 57 O cálculo da velocidade de gotejamento de soluções a serem administradas no paciente em equipo de gotas é realizado por meio da multiplicação do volume total, em litros, pelo número total de minutos durante os quais a solução será infundida.

Acerca da infecção hospitalar, julgue os itens que se seguem.

- 58 A fim de prevenir a infecção hospitalar, o profissional deve higienizar as mãos após tocar qualquer objeto, mobília ou superfície próxima ao paciente, ainda que não tenha mantido contato direto com este.
- 59 Feridas, incisões cirúrgicas, tubos, agulhas e acessos venosos no paciente são considerados porta de entrada para o desenvolvimento de infecções e compõem parte da cadeia de infecção hospitalar.
- 60 Infecções exógenas são aquelas provenientes da própria flora bacteriana normal do indivíduo e podem ocorrer ocasionalmente devido à ruptura de órgão ou pele previamente infectado.

Tendo em vista que a realização de procedimentos em pacientes é uma prática sistematizada, que deve obedecer a princípios mínimos para garantir a eficácia e a segurança tanto ao paciente como ao profissional, julgue os itens a seguir.

- 61 Durante a realização de um enema, que consiste na introdução de uma solução no reto ou no cólon sigmoide, o paciente deve estar em posição de Sims.
- 62 O ângulo para inserção da agulha nas injeções subcutâneas varia entre 45 e 90 graus, a depender do porte físico do paciente e do comprimento da agulha utilizada.
- 63 A fim de se obter, com fidedignidade, os valores dos pulsos periféricos, é necessário que o observador verifique o pulso durante 60 segundos, o que favorece a observação de ritmos irregulares.
- 64 Durante a mensuração da pressão arterial, o primeiro som ouvido (primeiro som de Korotkoff) refere-se à pressão arterial diastólica ou pressão máxima e corresponde à abertura das válvulas cardíacas.

Com referência à utilização de técnicas e equipamentos de segurança em saúde, julgue os próximos itens.

- 65 A máscara PFF2 ou N95 é utilizada para proteção contra gotículas no atendimento de pacientes com suspeita de meningite.
- 66 As precauções-padrão devem ser utilizadas para todos os tipos de paciente, independentemente da suspeita de infecções.
- 67 Materiais perfurocortantes devem ser descartados em recipientes rígidos de material plástico, e agulhas e seringas devem ser desconectadas e reencapadas após o uso para serem descartadas, a fim de prevenir acidentes.

Com relação ao tipo de estrutura e à função de alguns tecidos humanos, julgue os itens subsecutivos.

- 68 As células-tronco hematopoiéticas, cuja função é produzir células de defesa, como os macrófagos, estão presentes no tecido liso.
- 69 As células presentes nas mucosas dos intestinos delgado e grosso são denominadas eritrócitos.
- 70 Os neurônios são as unidades celulares básicas de formação dos sistemas nervosos central e periférico.

A especificidade da enfermagem é o cuidado com o ser humano mediante a promoção de atividades para a prevenção de doenças, bem como para a recuperação e reabilitação da saúde. Com relação à organização do trabalho em saúde e enfermagem, julgue os próximos itens.

- 71 Na organização dos serviços de saúde no Brasil, a estratégia Saúde da Família e as unidades e centros de saúde são considerados serviços de atenção primária, e os hospitais especializados, os gerais e os de reabilitação são considerados serviços de atenção secundária.
- 72 A Associação Brasileira de Enfermagem é um órgão de fiscalização profissional, cujos objetivos básicos são fiscalizar o cumprimento da Lei do Exercício Profissional e o acatamento ao Código de Ética em Saúde.

No que concerne à Política Nacional de Humanização (PNH), que se fundamenta em princípios norteadores, diretrizes, dispositivos e estratégias, julgue os itens que se seguem.

- 73** Os grupos de trabalho de humanização, dispositivos da PNH com espaços coletivos organizados, participativos e democráticos, funcionam como órgãos colegiados e destinam-se a empreender uma política institucional de democratização na gestão em benefício dos usuários e dos trabalhadores de saúde.
- 74** A implementação da PNH pressupõe diversos eixos de ação que visam à institucionalização, à difusão dessa estratégia e, sobretudo, à apropriação dos resultados pela sociedade.
- 75** O princípio da inseparabilidade norteia a relação entre a atenção e a gestão do processo de produção de saúde.
- 76** Gestão compartilhada e participativa representa a cogestão do processo de produção de saúde, em que as construções dos espaços coletivos de análise das informações e de tomada de decisões incluem a sociedade civil e o Ministério da Saúde, diretamente.

Com referência aos princípios aplicados à administração de medicação a recém-nascido, julgue os itens subsecutivos.

- 77** Com a finalidade de administrar medicação com segurança, vem sendo muito difundida a utilização do cateter venoso percutâneo central em recém-nascidos.
- 78** A incidência de erros na administração de medicamentos que levam a lesões importantes ou à morte é maior em pacientes pediátricos que em pacientes adultos.
- 79** A medicação administrada ao recém-nascido por via enteral deve ser introduzida no trato gastrointestinal por via parenteral ou jejunal.

Acerca do Programa Nacional de Imunização (PNI), que oferece um conjunto ampliado de imunológicos, julgue os seguintes itens.

- 80** A vacina DPT, indicada para a prevenção da difteria, da coqueluche e do tétano, é preparada com toxoides tetânicos e diftéricos e com componente *pertussis*, e não deve ser congelada.
- 81** A vacina tríplice viral (MMR), preparada com vírus vivos atenuados, é indicada para a prevenção do sarampo, da varíola e da caxumba.
- 82** É proibida a guarda de vacinas nas portas das geladeiras e nas gavetas, para evitar deterioração e contaminação.
- 83** A vacina antirrábica, que deve ser aplicada em pessoas agredidas por animal possivelmente transmissor do vírus da raiva, é também utilizada na profilaxia pré-exposição dos técnicos de biotérios, laboratórios, treinadores ou médicos veterinários.
- 84** A vacina BCG - ID não requer proteção da ação direta da luz solar, podendo ser usada no prazo máximo de 24 h após a sua reconstituição.

Julgue os próximos itens, relativos à assistência de enfermagem em situação de trauma.

- 85** O principal objetivo da assistência em casos de entorse é controlar o processo inflamatório para reduzir o edema e a dor e para diminuir os danos à articulação.
- 86** No caso de paciente em procedimento de toracocentese, ou seja, punção da cavidade pleural para drenar um derrame, além das exigências próprias de assepsia na manipulação do frasco de drenagem, é fundamental ter cuidado de não elevá-lo acima do nível do tórax do paciente, salvo quando isso for exigido em situação de transporte, durante o qual se deve fazer o pinçamento do tubo.
- 87** No caso de politraumatismo, a equipe de enfermagem deve acompanhar rigorosamente a evolução dos sinais e sintomas, com atenção para nível de resposta, calor da pele, enchimento capilar, queixa de dor abdominal, rigidez muscular, alterações dos sinais vitais, hematúria e oligúria.

No que tange à assistência de enfermagem a pacientes com disfunções endócrinas, renais e reprodutoras, julgue os itens a seguir.

- 88** A vasectomia ou esterilização masculina, que consiste na laqueadura e transeção de parte do canal deferente, com ou sem remoção de um segmento desse canal, exige, como cuidado pós-cirúrgico, a aplicação intermitente de bolsas quentes na região escrotal, por várias horas, para reduzir o inchaço e aliviar o desconforto.
- 89** A mastectomia profilática consiste na remoção da mama para reduzir o risco de câncer de mama ou evitar o seu desenvolvimento em mulheres com predisposição genética.
- 90** O paciente com hipertireoidismo frequentemente sente a temperatura ambiente normal como muito fria devido à taxa metabólica lenta e à produção diminuída de calor.
- 91** No pós-operatório de tireoidectomia, a dificuldade na respiração ocorre em consequência de edema de glote, formação de hematoma ou lesão do nervo laríngeo recorrente.
- 92** Os pacientes com infecção do trato urinário decorrente do uso de cateteres urinários têm risco aumentado de sepse por microrganismos gram-positivos, razão pela qual os cateteres devem ser irrigados a cada quatro horas.

A respeito da assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico, julgue os itens seguintes.

- 93** As cirurgias cardíacas apresentam como complicações críticas o tamponamento cardíaco e a insuficiência renal aguda, principalmente em pacientes que permanecem muito tempo em perfusão extracorpórea.
- 94** As complicações respiratórias durante o transoperatório ocorrem, sobretudo, devido à ventilação inadequada, à obstrução das vias aéreas e à intubação inadvertida do esôfago.
- 95** Um dos principais cuidados de enfermagem na sala de recuperação pós-anestésica é a hipertensão, que resulta de perda de sangue, hipoventilação, acúmulo de sangue nas extremidades ou efeito dos analgésicos.
- 96** Na estase venosa devido à desnutrição, a imobilidade sobre as veias dos membros superiores durante a cirurgia expõe o paciente a risco de trombose venosa profunda.

Com relação ao Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas (CAPS AD III), julgue os itens a seguir.

- 97 No CAPS AD III, o acolhimento de usuários novos e já vinculados deve ocorrer em todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados, no horário de 7 h às 19 h.
- 98 O atendimento do CAPS AD III deve ser realizado por uma equipe multiprofissional, sob a ótica da interdisciplinaridade.
- 99 O atendimento psicossocial a crianças e adolescentes deve ser realizado nas unidades básicas de saúde, visto que o atendimento no CAPS AD III é destinado somente a adultos.
- 100 O funcionamento do CAPS AD III deve ser articulado com a rede de atenção às urgências e emergências, especialmente no resgate dos usuários com necessidades relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas.

Com relação a ações e programas do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens a seguir.

- 101 A avaliação do desempenho das equipes de atenção básica é responsabilidade do respectivo governo estadual.
- 102 A assistência farmacêutica é um campo de execução de ações do SUS, sendo um elemento que compõe a assistência terapêutica integral.
- 103 A promoção de cooperação nacional e internacional relativa às experiências na atenção à saúde da pessoa idosa é uma diretriz para a atenção integral à saúde do idoso descrita como prioridade no pacto pela vida.
- 104 A missão das unidades hospitalares de atendimento às urgências e emergências é descentralizar o atendimento de pacientes com quadros agudos de média complexidade.
- 105 Os locais que realizam os exames anatomopatológicos necessários ao controle e auditoria do princípio legal da lista única para transplante de órgãos e tecidos devem ser indicados pela central de notificação, captação e distribuição de órgãos estadual.
- 106 A unidade de suporte básico de vida terrestre deve ser tripulada por, no mínimo, três profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência e dois técnicos ou auxiliares de enfermagem.

Julgue os itens subsequentes, que se referem à legislação em enfermagem.

- 107 É proibido ao profissional de enfermagem recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de proteção.
- 108 A censura é uma penalidade que consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Conselho Federal de Enfermagem e dos conselhos regionais de enfermagem e em jornais de grande circulação.
- 109 Compete ao Conselho Federal de Enfermagem disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, em cada unidade da Federação.
- 110 O técnico de enfermagem pode realizar a classificação de risco, desde que esteja sob a supervisão de um enfermeiro.

No que diz respeito à segurança no trabalho, julgue os itens seguintes. Nesse sentido, considere que as siglas CIPA e EPI, sempre que empregadas, referem-se a comissão interna de prevenção de acidentes e equipamento de proteção individual, respectivamente.

- 111 Conforme prevê a norma regulamentadora pertinente, o programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) exige a realização de anamnese ocupacional e exame físico e mental para a avaliação clínica do empregado em seu retorno ao trabalho.
- 112 Nos casos em que a divulgação dos resultados dos exames médicos realizados pelo trabalhador possa gerar outros problemas para a saúde, tais como estresse e depressão, o empregador poderá omitir do trabalhador os resultados desses exames, em conformidade com o que dispõe a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego.
- 113 Os órgãos da administração direta e indireta devem constituir CIPA, a fim de promover permanentemente a saúde de seus trabalhadores, por meio de ações de prevenção de acidentes e de doenças decorrentes do trabalho.
- 114 Em caso de acidente grave ou fatal, a CIPA deve promover, na sua primeira reunião ordinária após o acidente, medidas corretivas e ações que visem à prevenção de ocorrências de mesma natureza.
- 115 Ao receber o EPI fornecido pelo empregador, o empregado será responsável pela conservação desse equipamento e terá a obrigação de comunicar ao empregador qualquer alteração que inviabilize sua utilização.
- 116 Compete exclusivamente ao SESMT analisar os riscos existentes e recomendar ao empregador o EPI adequado a cada atividade que o trabalhador irá realizar.

Acerca das principais doenças de interesse para a saúde pública, julgue os itens seguintes.

- 117 Os agentes etiológicos da leishmaniose visceral são protozoários tripanossomatídeos do gênero *Treponema*, parasitas intracelulares que, dentro do tubo digestivo do vetor, assumem formas amastigotas ou flageladas.
- 118 O fígado, em geral, é o principal órgão comprometido na fase crônica da esquistossomose, contudo essa fase da doença pode apresentar outras formas clínicas, como intestinal, hepatointestinal e hepatoesplênica.
- 119 *Mycobacterium leprae* é um bacilo álcool-ácido resistente, intracelular, gram-positivo, que é a única espécie de micobactéria que infecta os nervos periféricos, especificamente as células de Schwann.
- 120 A difteria, também denominada febre tifoide, causada pela bactéria *Salmonella typhi*, caracteriza-se por febre alta, diarreia, cefaleia e dores abdominais.