

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Assinale a opção correta acerca dos critérios utilizados para o diagnóstico de esquizofrenia.

- A Pacientes com esquizofrenia têm mais alucinações táteis, olfativas e gustativas do que visuais.
- B Em pacientes com esquizofrenia catatônica, estímulos externos podem contribuir para a ocorrência de atividade motora aparentemente sem sentido.
- C É duvidosa a validade dos sinais e sintomas prodrômicos — os quais são identificados geralmente retrospectivamente depois de diagnosticada a esquizofrenia —, visto que essa doença altera as recordações retrospectivas dos sinais e os sintomas precoces.
- D Em pacientes com esquizofrenia, as ilusões ocorrem durante as fases prodrômicas e ativas, mas não durante os períodos de remissão.
- E Os pacientes esquizofrênicos são desorientados temporoespacialmente.

QUESTÃO 32

Com relação aos sinais e sintomas característicos de *delirium* e demência, assinale a opção correta.

- A A atenção de pacientes com demência de Alzheimer é preservada nos estados iniciais dessa doença, ao passo que a atenção de pacientes com demência frontotemporal é comprometida desde o aparecimento dos primeiros sintomas dessa doença.
- B Em relação ao humor, pacientes com demência frontotemporal apresentam apatia ou euforia, e pacientes com demência vascular apresentam incontinência emocional.
- C A procura de reafirmação e a ansiedade de um bom desempenho são características de pacientes com *delirium*.
- D Os déficits cognitivos são generalizados tanto em pacientes com demência de Alzheimer como em pacientes com demência vascular.
- E O curso dos sintomas de pacientes com demência vascular tem períodos de flutuação e de deterioração progressiva.

QUESTÃO 33

A respeito das doenças e dos medicamentos que podem causar depressão e mania, assinale a opção correta.

- A A síndrome de Cushing e o hipertireoidismo podem causar depressão.
- B O carcinoma de pâncreas e os meningiomas podem causar depressão e mania.
- C O traumatismo craniano pode causar depressão.
- D A esclerose múltipla e a hemorragia subaracnoide podem causar depressão e mania.
- E A cinarizina e a cimetidina podem causar depressão e mania.

QUESTÃO 34

Considerando que, nas emergências psiquiátricas, é comum a presença de pacientes com síndromes e transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas, assinale a opção correta.

- A A fim de prevenir a ocorrência de complicações neurológicas, o paciente com síndrome de abstinência do álcool deve ser medicado com 300 mg de tiamina intramuscular durante quatro dias.
- B Em mais de 90% dos casos, as convulsões relacionadas à abstinência alcoólica ocorrem entre 7 e 48 horas após a ingestão da última dose, com pico após 24 horas, sendo a ocorrência de convulsão um indicativo de que os sintomas de abstinência serão graves.
- C A fissura de pacientes com síndrome de abstinência da cocaína permanece por até três semanas, com períodos de intensidades flutuantes, até sua completa remissão, sendo a ingestão do fármaco lamotrigina uma das formas de diminuir esse sintoma.
- D Pacientes com transtornos psicóticos causados pelo consumo de maconha são refratários à ação da risperidona, devendo ser tratados apenas com ansiolíticos.
- E O tempo de protrombina não é abrangido entre os exames laboratoriais de rotina realizados para a investigação de abstinência de álcool.

QUESTÃO 35

Sabendo que as alterações qualitativas da sensopercepção referem-se às ilusões, às alucinações, à alucinose e à pseudoalucinação, assinale a opção correta.

- A Pacientes com pseudoalucinação podem visualizar aspectos vivos e corpóreos de uma imagem perceptiva real.
- B As alucinações hipnagógicas e hipnopômicas não ocorrem em pacientes com narcolepsia.
- C O rebaixamento do nível de consciência torna a percepção imprecisa, o que gera as ilusões catafílicas.
- D Indivíduos sem transtornos mentais podem ter alucinações auditivas ou visuais.
- E Alucinose é o fenômeno sofrido por pessoas que consideram a alucinação como parte integrante de sua vida.

QUESTÃO 36

As psicoterapias, denominadas originalmente de cura pela fala, originaram-se da medicina antiga, da crença de cura pela fé e do hipnotismo. A respeito dessa modalidade de tratamento, assinale a opção correta.

- A A técnica de exposição, muito utilizada na terapia comportamental, consiste na demonstração de um comportamento desejável pelo terapeuta.
- B Em uma psicoterapia psicodinâmica suportiva breve, a ênfase etiológica incide nos eventos ambientais e nas influências interpessoais sobre um *self* fragilizado.
- C A terapia cognitiva, ao contrário da terapia comportamental, não tem caráter psicoeducativo.
- D A técnica da psicoterapia de orientação analítica não se compõe de técnicas comportamentais.
- E As terapias psicodinâmicas são empregadas exclusivamente para reorganizar a estrutura de caráter de pacientes com transtornos leves de personalidade.

QUESTÃO 37

Com relação à vitimização sexual e física de crianças e adolescentes, assinale a opção correta.

- A A avaliação de casos de violência sexual com suspeita de falsas memórias deve ser feita com ênfase na memória explícita, que armazena a memória do episódio.
- B Pessoa com síndrome de adição tem consciência de que o abuso sexual que realiza contra criança é errado e considerado crime.
- C Nos casos em que a mãe da criança vitimizada também foi abusada sexualmente durante a infância, observa-se maior capacidade de atuação protetiva no exercício do papel parental, uma vez que a mãe viveu experiência traumática semelhante à da criança.
- D Uma das formas de se obter informações precisas de crianças a respeito do abuso sexual por elas sofrido é fazer perguntas fechadas, as quais são mais adequadas a essa fase de desenvolvimento, em virtude de serem mais facilmente compreendidas e respondidas pelas crianças.
- E Em resposta a uma ameaça, como o abuso sexual, uma criança provavelmente elaborará o padrão típico de luta ou fuga, lidando, por meio desse comportamento, com o evento estressor.

QUESTÃO 38

Um medo irracional que leva o indivíduo a esquivar-se conscientemente de uma situação específica, de uma atividade ou de um objeto denomina-se fobia. Com relação a esse transtorno, assinale a opção correta.

- A As opções de tratamento do transtorno de ansiedade social diferenciam-se das opções de tratamento do transtorno de pânico.
- B A modelagem é um mecanismo de associação entre o objeto e as emoções fóbicas.
- C A hipocondria relaciona-se ao medo de contrair uma doença, enquanto a fobia específica do tipo doença relaciona-se ao medo de ser portador de uma doença.
- D O comportamento de esquiva social dos pacientes com transtorno de personalidade esquizoide é provocado pelo medo de socialização.
- E Entre as fobias, a agorafobia é a menos incapacitante, pois a mente humana utiliza diversos mecanismos de defesa inconscientes contra essa fobia.

QUESTÃO 39

Sabendo que a síndrome de Down, a síndrome do X frágil e a fenilcetonúria são os mais comuns transtornos cromossômicos e metabólicos associados ao retardo mental, assinale a opção correta.

- A Portadores das síndromes de Turner e de Klinefelter apresentam, necessariamente, retardo mental.
- B Crianças com síndrome do miado de gato são levemente retardadas e não possuem parte do sexto cromossomo.
- C O diagnóstico da síndrome de Down é relativamente fácil em crianças maiores, mas em recém-nascidos é frequentemente difícil, sendo a maioria dos pacientes diagnosticados com síndrome de Down portadores de retardo mental moderado ou severo.
- D A maioria dos pacientes com fenilcetonúria — transmitida como um traço mendeliano autossômico recessivo simples — apresenta inteligência *borderline* ou retardo mental leve.
- E Todos os portadores da síndrome do X frágil, a segunda causa isolada mais comum de retardo mental, apresentam retardo mental severo.

QUESTÃO 40

Assinale a opção correta acerca dos transtornos do sono.

- A A síndrome de apneia do sono e a síndrome de hipoventilação alveolar podem desencadear hipersonia e insônia em seus portadores.
- B A insônia, cuja causa principal é a síndrome de Kleine-Levin, caracteriza-se pela dificuldade de iniciar ou de manter o sono, podendo ser temporária ou persistente.
- C Indivíduos que necessitam de nove a dez horas de sono por noite são considerados portadores de hipersonia.
- D A parassonia é um fenômeno incomum que ocorre geralmente nos estágios 2 e 3 do sono.
- E A narcolepsia consiste em um transtorno cujos sintomas aparecem, na maioria dos pacientes, antes dos trinta anos de idade, progredindo rapidamente.

QUESTÃO 41

Com relação aos transtornos alimentares, assinale a opção correta.

- A O transtorno alimentar que apresenta melhor prognóstico é a anorexia nervosa.
- B Paciente que apresenta comportamentos de compulsão periódica e purgação exclusivamente durante episódio de anorexia nervosa deve ser diagnosticado como portador de bulimia nervosa.
- C No diagnóstico diferencial de transtorno depressivo e anorexia nervosa, deve-se observar que todos os pacientes com transtorno depressivo apresentam diminuição do apetite, ao passo que apenas os pacientes com anorexia em estágios leves apresentam diminuição do apetite.
- D Os pacientes com bulimia nervosa tendem a ser menos ambiciosos do que os pacientes com anorexia nervosa e a não responder às mesmas pressões sociais para a magreza.
- E As complicações médicas causadas por transtornos alimentares incluem lanugem, leucopenia, intervalo QT prolongado, intolerância ao frio e erosão do esmalte dentário, particularmente nos dentes frontais.

QUESTÃO 42

A respeito da eletroconvulsoterapia, assinale a opção correta.

- A A morte por eletroconvulsoterapia dificilmente decorre de complicações cardiovasculares.
- B A maior parte dos pacientes que apresentam prejuízo da memória durante o curso do tratamento mediante eletroconvulsoterapia readquire suas capacidades cognitivas básicas após seis meses do término do tratamento.
- C O uso de curare não é eficaz para a prevenção de dores musculares causadas pela atividade motora convulsiva desencadeada pelo tratamento com eletroconvulsoterapia.
- D A gravidez não é uma contraindicação ao uso da eletroconvulsoterapia, desde que seja feito o monitoramento fetal em todas as seções desse procedimento.
- E Confusão e *delirium* logo depois da convulsão são efeitos colaterais pouco associados à realização de eletroconvulsoterapia.

QUESTÃO 43

A clozapina

- A não é eficaz no tratamento de crianças esquizofrênicas.
- B apresenta atividade colinérgica e adrenérgica.
- C desencadeia crises convulsivas (dose-dependente) e hiperglicemia.
- D é eficaz para o tratamento de psicose e discinesia em pacientes com doença de Parkinson, conforme evidenciado por diversas pesquisas.
- E utilizada em doses superiores a 1.500 mg é letal aos seres humanos.

QUESTÃO 44

A respeito da responsabilidade penal e da capacidade civil, assinale a opção correta.

- A A constatação da incapacidade laborativa temporária de um funcionário deve ser feita pelo médico da empresa, enquanto a constatação de sua incapacidade definitiva deve ser feita pelo perito do INSS.
- B Um cônjuge pode pedir separação judicial caso o outro seja acometido de doença mental grave após o casamento, desde que a enfermidade tenha sido reconhecida como de cura improvável após um ano da constatação da doença.
- C A avaliação *post mortem* de testamento é uma perícia direta, isto é, retrospectiva.
- D De acordo com o Código Penal, caso um indivíduo cometa um crime sob o estado de completa embriaguez alcoólica, ele será considerado inimputável mesmo que, antes de embriagar-se, tivesse a ciência de que ficaria embriagado e de que poderia cometer um crime.
- E Considere que uma pessoa tenha cometido um delito sob o estado de abstinência alcoólica e que o delito tenha sido praticado em razão dessa abstinência, assim como em nexo de causalidade. Considere, ainda, que, em virtude do estado de abstinência, as capacidades de entendimento e de determinação dessa pessoa tenham sido cessadas. Em face dessa situação hipotética, é correto afirmar que se trata de uma pessoa com doença mental.

QUESTÃO 45

Com relação a documentos médicos legais, assinale a opção correta.

- A A finalidade do laudo médico legal é oferecer à autoridade julgadora elementos de convicção; se for ditado, diretamente, ao escrivão e diante de testemunhas é chamado de auto.
- B O parecer médico legal é constituído de todas as partes do relatório, com exceção da discussão.
- C Os casos de viciados em substâncias capazes de determinar dependência física ou psíquica, os acidentes de trabalho e a morte encefálica ocorrida em instituição de saúde pública ou privada têm de ser notificados de forma compulsória.
- D O atestado ou certificado médico é um documento particular, elaborado com compromisso prévio, independente de compromisso legal e fornecido por qualquer médico.
- E O atestado médico falso é documento de caráter culposo, emitido por médico ciente de seu uso indevido e criminoso.

QUESTÃO 46

A respeito de curso e prognóstico dos transtornos do humor, assinale a opção correta.

- A Os pacientes com transtorno bipolar I possuem prognóstico melhor do que os pacientes com transtorno depressivo maior.
- B No transtorno depressivo maior, o primeiro episódio depressivo ocorre antes dos quarenta anos de idade em 50% dos pacientes.
- C O transtorno bipolar I inicia-se, frequentemente, pelo episódio maníaco.
- D Um episódio depressivo não tratado pode durar de doze a dezoito meses, contudo a maioria dos episódios tratados perdura por cerca de um mês.
- E No transtorno bipolar I, o episódio maníaco pode durar cerca de seis meses sem tratamento, portanto a medicação não deve ser retirada antes do fim desse período.

QUESTÃO 47

Vítima de violência urbana, José passou a apresentar recordações vívidas do evento traumático, sensações físicas e emocionais semelhantes às aquelas apresentadas durante o episódio de violência, além de insônia e dificuldade de concentração.

Com base no caso clínico acima apresentado, assinale a opção correta.

- A Entre as características clínicas principais do transtorno, encontra-se um padrão de esquiva e anestesiamento emocional.
- B O estressor é o fator primário no desenvolvimento do transtorno; assim, todos os indivíduos apresentariam esse mesmo transtorno diante do mesmo evento traumático.
- C De acordo com DSM-IV, a duração mínima dos sintomas do transtorno apresentado é de dois meses.
- D O modelo comportamental considera que as pessoas afetadas são incapazes de processar ou racionalizar o trauma que precipitou o transtorno.
- E Os sintomas do transtorno de José podem variar ao longo do tempo e sua intensidade independe de períodos de estresse que José possa vir a sofrer.

QUESTÃO 48

Com relação a transtorno obsessivo compulsivo (TOC), assinale a opção correta.

- A No caso de submissão de paciente a ensaio clínico com drogas de primeira escolha, cujo resultado não seja satisfatório, confirma-se o diagnóstico de TOC refratário.
- B A terapia cognitiva comportamental de exposição e prevenção de rituais, a farmacoterapia com ISRSs e a clomipramina são considerados elementos de tratamento de primeira linha, pois, mesmo nos casos de comorbidade, a eficácia dos antiobsessivos não fica comprometida.
- C A nortriptilina e a desipramina não são considerados fármacos eficazes para o tratamento de TOC.
- D O TOC possui padrão sintomático, logo os sintomas que evidenciam o transtorno em um paciente não se sobrepõem ou mudam com o decorrer do tempo.
- E As obsessões e as compulsões não têm aspectos comuns entre si.

QUESTÃO 49

Desatenção, hiperatividade e impulsividade é a tríade sintomatológica característica do TDAH, cujo tratamento é multimodal, ou seja, combina o uso de psicofármacos com as intervenções psicossociais. Acerca desse transtorno, assinale a opção correta.

- A Nos casos em que as crianças apresentam docilidade, sonolência e falta de energia, o diagnóstico de TDAH deve ser excluído.
- B Os psicoestimulantes são os medicamentos de primeira escolha no tratamento do TDAH em crianças e adolescentes, mas nunca em adultos.
- C Os ISRSs são os psicofármacos mais eficazes no tratamento da tríade sintomatológica do TDAH.
- D A maioria das crianças que apresenta TDAH exibe amplas lesões estruturais ou doença em seu sistema nervoso central.
- E A distratibilidade, em geral, é o último sintoma a apresentar remissão, enquanto a hiperatividade, comumente, é o primeiro.

QUESTÃO 50

Após o primeiro dia de exercícios físicos na academia, Frederico apresentou, por cerca de trinta minutos, sensação de morte iminente, com taquicardia, palpitação, dispnéia, sudorese e gagueira. No entanto, ao chegar ao hospital, os sintomas haviam desaparecido. A partir daí, ele passou a exibir medo de ter um novo ataque, saindo de casa somente acompanhado por familiares. Transcorrido um mês, recusava-se, terminantemente, a sair de casa. Procurou auxílio de um psiquiatra após seis meses de crises recorrentes.

Com referência ao caso clínico hipotético acima apresentado e ao transtorno do pânico, assinale a opção correta.

- A O uso de venlafaxina é eficaz no transtorno de síndrome do pânico, mesmo não sendo considerado tratamento de primeira linha.
- B Os sintomas depressivos, frequentemente, estão presentes em transtorno de pânico, entretanto o risco de suicídio entre esses pacientes não aumenta, se comparado com o risco em pessoas sem transtorno mental.
- C Ataques de pânico ligados a situações específicas, em geral, indicam uma condição diversa, como fobia social ou específica, pois, no transtorno de pânico, os ataques de pânico inesperados são característicos.
- D O diagnóstico diferencial de um paciente com transtorno de pânico inclui muitos transtornos mentais e raros transtornos médicos.
- E Em pacientes com síndrome do pânico, os tratamentos mais efetivos são a farmacoterapia e a terapia cognitivo comportamental, contudo esses mesmos tratamentos não funcionam em pacientes com agorafobia, cuja sintomatologia é incapacitante crônica.

QUESTÃO 51

Com relação a uma criança de seis anos de idade, familiares relataram agitação, queixume e dificuldades de socialização na escola. Há dois anos, a criança vem apresentando hábitos motores e manias vocais frequentes e ininterruptos. A criança foi diagnosticada com transtorno de Tourette, medicada com clonidina e houve indicação para tratamento psicológico.

A respeito desse caso clínico, assinale opção correta.

- A Não existem evidências consistentes de eficácia da clonidina no tratamento do transtorno de Tourette.
- B De acordo com o diagnóstico do DSM-IV-TR para o referido transtorno, é necessário que estejam presentes, simultaneamente, ao menos, um tique vocal e um tique motor.
- C Segundo os critérios do DSM-IV-TR para diagnóstico do transtorno de Tourette, os tiques devem estar presentes por, no mínimo, dois anos.
- D Crianças diagnosticadas com transtorno de Tourette que mantêm relacionamento social satisfatório, bom rendimento acadêmico e autoestima adequada devem ter o diagnóstico revisto.
- E O diagnóstico do DSM-IV-TR para o transtorno em questão cita que os sintomas devem ter início antes dos dezoito anos de idade, sem relação com os efeitos de substâncias ou outra condição médica adjacente.

QUESTÃO 52

Uma mulher de vinte e oito anos de idade foi internada, em cinco ocasiões, em diferentes hospitais, em razão de sintomas clínicos que, aparentemente, não tinham correlação com o decurso da doença física diagnosticada. Observou-se, nessas internações, que sempre que havia redução na medicação ou na atenção prestada a paciente, ela apresentava piora das queixas somáticas e acentuada agitação. Após analisar o histórico da paciente, a equipe médica levantou a hipótese de que o quadro apresentado se tratava de transtorno factício.

Considerando o caso clínico acima apresentado, assinale a opção correta com base na classificação do DSM-IV-TR.

- A Abordagens não confrontacionais, que utilizam interpretações inexatas, são as mais adequadas para o tratamento do transtorno factício.
- B Diante de evidências inquestionáveis, a maioria dos pacientes admite a natureza factícia de seu transtorno.
- C A síndrome de Munchausen, variante do transtorno relatado, é a mais comum e acomete, principalmente, pacientes mulheres.
- D A variante não Munchausen de transtorno factício acomete, geralmente, homens socialmente isolados e desempregados, com traços antissociais.
- E Assim como os pacientes que se fingem de doentes, os que apresentam transtorno factício também não suportam perdas secundárias advindas de procedimentos médicos invasivos.

QUESTÃO 53

Acerca de exame pericial psiquiátrico, assinale a opção correta.

- A Avaliações transversais são aquelas nas quais o examinador deve estabelecer o risco futuro da ocorrência de determinado comportamento.
- B A insuficiência dos honorários periciais pode constituir motivo legítimo para o perito escusar-se do encargo.
- C No exame psiquiátrico forense, a entrevista com o examinado não é o instrumento mais importante e relevante, mas as provas documentais colhidas nos autos.
- D Os peritos têm os mesmos deveres de isenção e imparcialidade dos juízes, mas, diferentemente destes, os impedimentos e suspeições não estão previstos em lei, mas no código de ética médica.
- E Ao ser designado perito, o psiquiatra não terá, em princípio, o dever de aceitar o encargo, pois o fato de ser médico psiquiatria não significa que está apto a realizar qualquer perícia psiquiátrica.

QUESTÃO 54

Uma paciente recebeu atendimento de emergência após episódio de amnésia acerca de acidente relevante recente. Ela associou o episódio de amnésia ao fato de ter ficado impressionada com um espetáculo de hipnose que assistira. Nos atendimentos ambulatoriais psiquiátricos que se seguiram, a paciente foi capaz de revelar a sensação de não parecer ela mesma ao se olhar no espelho.

Considerando o caso clínico acima, assinale a opção correta.

- A A paciente apresenta sintomas de amnésia dissociativa, pois tem consciência de ter-se esquecido de algo, evidência que posterga a fuga dissociativa.
- B Ao longo do processo de tratamento psiquiátrico da paciente, será possível identificar elementos como despersonalização e transtorno dissociativo de identidade.
- C A alteração da amemória apresentada pela paciente é similar à que ocorre em pacientes após traumatismo cranioencefálico.
- D No caso apresentado, o término da amnésia deve ser lento, com recuperação incompleta, mas poucas recorrências.
- E O fenômeno da hipnose é um exemplo de estado dissociativo em pessoas normais e os pacientes com transtornos dissociativos são mais suscetíveis à hipnose que os mentalmente saudáveis.

QUESTÃO 55

Uma mulher primípara idosa, com diagnóstico de transtorno bipolar, iniciou um quadro de psicose puerperal no décimo dia do puerpério, com sintomas maniatiformes, desorganização do pensamento, comportamento bizarro e delírios autorreferenciais e persecutórios. Apesar da profusa medicação psicotrópica empregada, decorrido um mês de internação, não houve melhora clínica e a paciente foi submetida a ECT.

Com base no caso clínico acima apresentado, assinale a opção correta.

- A O caso relatado constitui uma urgência psiquiátrica; assim, não há necessidade de solicitar tomografia axial computadorizada cranioencefálica e eletroencefalograma, pois esses exames só atrasariam o início do tratamento.
- B Não há dados que sugiram um estreito relacionamento entre a psicose puerperal e os transtornos de humor.
- C Antipsicóticos foram utilizados no tratamento da paciente, mas não estabilizadores de humor, pois os níveis residuais de estabilizadores no leite são semelhantes aos do plasma.
- D O início dos quadros de transtorno como o relatado, em geral, é insidioso.
- E A eletroconvulsoterapia é muito eficaz nos casos de psicose puerperal, pois, mesmo com fármacos utilizados na indução anestésica, não é preconizada a interrupção da amamentação após a recuperação pós-anestésica.

QUESTÃO 56

No que se refere a transtornos do desenvolvimento da linguagem, assinale a opção correta.

- A No transtorno expressivo de linguagem, a compreensão da linguagem se encontra além dos limites normais de compreensão.
- B No transtorno misto da linguagem receptivo-expressiva, as disfunções da linguagem, em geral, não excedem aquelas associadas a retardo mental.
- C No diagnóstico do transtorno da linguagem expressiva, o uso de audiograma é adequado para crianças muito pequenas ou com aparente comprometimento da acuidade auditiva.
- D Em geral, o prognóstico da linguagem expressiva é desfavorável.
- E Em crianças pequenas, o transtorno misto da linguagem receptivo-expressiva é, em geral, mais positivo que o prognóstico do transtorno isolado da linguagem expressiva.

QUESTÃO 57

Maria revelou que, há dez anos, furta pequenos objetos, sem relevância econômica, na casa de familiares, objetos esses que são descartados posteriormente. Ele complementou que, há pelo menos um ano, os episódios de furto tornaram-se cada vez mais recorrentes e acontecem em vários contextos, como casa de amigos e lojas, até que, recentemente, foi indiciada por furto em uma loja de departamentos.

Com base no caso clínico relatado, assinale a opção correta.

- A Na cleptomania, a finalidade é o ato de furtar e não o objeto furtado em si mesmo.
- B Os impulsos, nesses casos, são recorrentes e irresistíveis, mas não intrusivos.
- C Os furtos são planejados; logo, não ocorrem se houver alto risco de flagrante imediato.
- D As prisões por furto melhoram consideravelmente a resistência do indivíduo ao impulso de furtar.
- E No transtorno apresentado, após o ato de furto, presume-se que deve haver gratificação e redução da tensão, sempre com sentimentos de culpa, depressão e remorso.

QUESTÃO 58

Sabendo que a existência do DSM-IV e CID-10 não exclui a utilidade clínica da abordagem dos quadros mentais pela perspectiva sindrômica, assinale a opção correta.

- A As alucinações visuais e com conteúdo de grandeza são sintomas comumente observados nos casos de síndromes maníacas.
- B Nas síndromes psicóticas, os sintomas paranoides são infrequentes.
- C A reinstalação lenta de tolerância, após o período de abstinência, é um aspecto característico da síndrome de dependência de álcool, em comparação a outras síndromes de dependência.
- D As síndromes ansiosas são ordenadas em três grandes grupos: quadros em que a ansiedade é constante, quadros em que a ansiedade é flutuante e quadros em que há crises de ansiedade abruptas.
- E A irritabilidade aumentada, com relação a vozes e ruídos, é um sintoma afetivo de síndromes depressivas.

QUESTÃO 59

A avaliação de uma criança inclui entrevista clínica com os pais e com a família, informações sobre o rendimento escolar e outras conquistas acadêmicas. Acerca de exames em psiquiatria da infância, assinale a opção correta.

- A A escala de inteligência de Stanford-Binet deve ser adequadamente utilizada somente na faixa etária dos dois aos quatorze anos.
- B Alucinações visuais e auditivas transitórias em crianças muito pequenas não devem ser investigadas detalhadamente, porque fazem parte da atenção comumente fraca nessa faixa etária.
- C A avaliação neuropsiquiátrica deve combinar as informações de um exame neurológico, um exame físico e um exame do estado mental da criança.
- D A importância dos sinais neurológicos leves deve-se ao fato de que eles são específicos a certo diagnóstico psiquiátrico.
- E Uma testagem psicológica é sempre necessária para avaliar sintomas psiquiátricos em crianças.

QUESTÃO 60

A respeito de interações medicamentosas do ácido valproico/valproato de sódio, assinale a opção correta.

- A A administração conjunta de ácido valproico e antitireoidianos aumenta o risco de ocorrência de síndrome anticolinérgica central.
- B O uso adicionado de ácido valproico aos antirretrovirais didanosina, estavudina ou zalcitabina aumenta o risco de ocorrência de pancreatite.
- C O uso de ácido valproico diminui em até 50% a concentração de nimodipina no organismo humano.
- D O uso de bupropiona pode diminuir, significativamente, o nível plasmático do ácido valproico no organismo humano.
- E O uso de ácido valproico pode causar aceleração no metabolismo da progesterona por meio da indução da CYP 3A4.

PROVA DISCURSIVA

- Na prova a seguir, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, no local apropriado, pois **não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos**.
- Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
- Na **folha de texto definitivo**, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
- Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até **dez pontos**, dos quais até **um ponto** será atribuído ao quesito apresentação e estrutura textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

A família de um jovem de dezoito anos de idade ajuizou petição junto ao tribunal regional federal de seu estado no intuito de receber benefício assistencial do Instituto Nacional do Seguro Social. No documento, a família alegou que o rapaz era incapacitado para o trabalho. Com base em histórico clínico, exame psíquico, estudo dos autos, relatórios e exames, o perito médico responsável concluiu que se tratava de periciando com história vital de atraso no desenvolvimento psicomotor e dificuldades cognitivas relevantes, portador de F 71 — retardo mental moderado (CID, 10.^a revisão). Sob o ponto de vista jurídico, os retardos mentais são a parada do desenvolvimento intelectual por causa inata ou adquirida até os dezoito anos de idade, o que impede o indivíduo de se conduzir com autonomia na vida e de ter uma boa discriminação dos estímulos recebidos, ao compreender, criar ou criticar fatos.

Considerando a situação hipotética acima, redija um texto dissertativo de forma fundamentada acerca do assunto em tela, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

- ▶ conceito de perícia médica administrativa previdenciária; [valor: 3,00 pontos]
- ▶ conclusões acerca da situação hipotética apresentada, em relação ao grau e à duração da incapacidade, com fundamentação pertinente; [valor: 4,00 pontos]
- ▶ avaliação e descrição de capacidade laboral residual. [valor: 2,00 pontos]

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	