



MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)

Concurso Público – Aplicação: 27/1/2002

ÁREA: MÉDICA

EMPREGO: MÉDICO

ESPECIALIDADE: CIRURGIA GINECOLÓGICA

Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Na Folha de Respostas, a indicação do campo **SR** é facultativa e não contará para efeito de avaliação; servirá somente para caracterizar que o candidato desconhece a resposta correta. Use a Folha de Rascunho para as devidas marcações e, posteriormente, a **Folha de Respostas**.

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto LP-I – questões 1 e 2

1 A geração atual é muito menos romântica, muito mais
objetiva que a de há cinco décadas. Recordo-me da emoção com
que olhávamos, e ainda olhamos, as mulheres, em contraste com
4 a tranqüilidade dos jovens de hoje, em face do sexo. Refiro-me,
é claro, à mocidade pioneira e não à massa geral das populações
7 do interior, mais conservadora. Há hoje uma frieza, que talvez
seja providencial, em face da explosão demográfica. A libido se
desgenitaliza. Os homens estão mais frios. Mas o grande
elemento de equilíbrio é a mulher. Quando os homens eram
10 ardentes demais, elas encompridavam as saias e reduziam os
decotes. Em face de homens frios, elas levantam as saias e
baixam os decotes, em uma tentativa de homeostase. Quando os
13 jovens tendem à intersexualidade, elas, compensadoramente,
procuram masculinizar-se, pelo menos no vestuário. Quem não
vê as coisas mais a fundo pensa mesmo que elas se
16 masculinizaram. Na realidade, nunca foram mais femininas do
que nesse esforço patético de reequilíbrio.

J. Fernando Carneiro. *Psicologia do brasileiro*. São Paulo: Agir, 1971, p. 75 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Depreende-se do texto LP-I que

- A as mulheres, melhor do que os homens, adaptam-se às circunstâncias novas; por isso, reagem sedutoramente ao frio comportamento masculino.
- B o sexo perdeu o valor e a importância para os jovens, desde que a libido passou a ser mais intelectualizada.
- C o romantismo é coisa do passado; no mundo contemporâneo, o que importa é a frieza nas relações intersexuais.
- D o movimento em favor das minorias sexuais teve início quando as mulheres passaram a vestir-se de forma masculinizada.
- E quem pensa que as mulheres se masculinizaram entende que a atitude do homem moderno é contrastante com a do homem do século passado.

QUESTÃO 2

Assinale a opção cuja expressão substitua “de homeostase” (R.12), no texto LP-I, sem alterar o sentido do período.

- A da tranqüilidade
- B de pioneirismo
- C da explosão demográfica
- D de equilíbrio
- E de masculinização

Texto LP-II – questões de 3 a 5

1 Pouco maior do que um par de ameixas secas, com
formato semelhante ao de uma gravata-borboleta e pesando
entre 15 g e 25 g, ela comanda algumas das mais
4 importantes funções do corpo humano. Exemplos? A
capacidade de respirar, de mover as pernas, regular a
temperatura corporal, manter o coração batendo no ritmo certo,
7 o raciocínio pronto para qualquer desafio... É preciso mais?
Claro que não. Está comprovadíssima a nobreza da pecinha de
que estamos falando. E para não espichar o assunto, vamos
10 logo à ficha da moça. Trata-se da glândula tireóide (ou tireóide),
domiciliada à frente da traquéia, bem abaixo do pomo-de-adão,
ou gogó, para os íntimos.

13 O primeiro médico a descrevê-la foi o belga Vesalius, pai
da anatomia moderna, em 1543. Ele observou que a pequena
estrutura se movimenta para cima e para baixo durante o ato de
engolir, mas não chegou a descobrir as tarefas desempenhadas
16 por ela no organismo. Séculos depois, os cientistas perceberiam
que, além de dançar no pescoço, a glândula fabrica dois
19 hormônios fundamentais: o T3 (triodotironina) e o T4 (tiroxina).
Lançadas na corrente sanguínea, essas substâncias atingem,
uma por uma, todas as células do corpo, estimulando-as a
22 produzir energia. Isso mesmo. O T3 e o T4 atuam como a
gotinha mágica que induz o metabolismo celular a transformar
nutrientes em combustível vital. Assim, o organismo encontra
25 forças para desempenhar todas as suas funções — de piscar o
olho a correr a mais disputada das maratonas.


Armando Luiz Antenore. In: *Saúde!*, dez./1990, p. 71 (com adaptações).

QUESTÃO 3

A partir da leitura interpretativa do texto LP-II, assinale a opção correta.

- A Ao descrever a glândula tireóide, o autor apresenta-lhe a origem, o histórico, as características, as funções e os principais empecilhos a seu funcionamento.
- B Denominam-se hipertireoidismo e hipotireoidismo o excesso ou a carência, respectivamente, dos hormônios fundamentais da tireóide, segundo o movimento ascendente e descendente dessa glândula.
- C O fragmento estrutura-se a partir de analogias, com ameixas e borboletas, e de comparações, com o coração e o cérebro, por exemplo.
- D Os efeitos principais do mau funcionamento da tireóide são, para os membros, a fraqueza e a imobilidade gradativas e, para o tórax, as dificuldades de funcionamento do diafragma.
- E O texto trata de um assunto especializado, de natureza científica, em linguagem adequada ao público leigo.


QUESTÃO 12







A figura acima ilustra uma janela do Outlook Express sendo executado em um computador cujo sistema operacional é o Windows 98. Acerca desse *software* e do Windows 98 e com base na figura mostrada, assinale a opção **incorreta**.

- A Para que esse *software* possa funcionar adequadamente no ambiente Windows 98 e possa enviar um *e-mail* para um destinatário localizado em um outro país, é necessário que o computador no qual ele está sendo executado tenha nele instalado um microprocessador com frequência de relógio — *clock* — superior a 1 GHz.
- B O *software* cuja janela é mostrada acima é capaz de enviar e receber mensagens de correio eletrônico no formato textual, em forma de arquivos anexados e na forma de páginas *Web* no corpo do *e-mail*.
- C Caso se queira responder o *e-mail* recebido, que está sendo mostrado na figura acima, basta clicar no botão **Respost.** na janela que será aberta em decorrência dessa ação, digitar a mensagem no local apropriado, configurar adequadamente as opções de envio disponíveis e, finalmente, enviar a mensagem de resposta, acionando o botão destinado para esse fim na referida janela.
- D A partir desse *software*, é possível criar um catálogo de endereços de *e-mail* que facilite o envio de correio eletrônico a um determinado contato.
- E Caso se deseje enviar a mensagem recebida e mostrada na figura a um determinado destinatário, é suficiente clicar no botão **Env.** na janela que será aberta em decorrência dessa ação, configurar adequadamente as opções de envio disponíveis, tais como o endereço eletrônico do destinatário e, finalmente, enviar a mensagem, acionando o botão destinado para esse fim na referida janela.

QUESTÃO 13




A figura acima mostra parte da área de trabalho do Windows 98, em que se observa aberta a janela Meu computador. Com base nessa figura e acerca do Windows 98, julgue os itens abaixo.

- I Para excluir  da pasta Meu computador, é suficiente que o usuário se certifique de que a tecla **Num Lock** esteja desabilitada, clique sobre o referido objeto e pressione a tecla **Del**.
- II Para visualizar toda a área de trabalho do Windows 98, é suficiente que o usuário clique em  no canto superior direito da janela Meu computador. Contudo, com essa ação, a referida janela será fechada.
- III Executando-se um clique duplo sobre o ícone , será visualizada a pasta denominada Painel de controle. Nessa pasta, o usuário tem acesso a várias opções para a configuração de *software* e de *hardware* do seu computador.
- IV Clicando em **Iniciar** o usuário tem acesso a uma lista de opções, entre elas, à janela Executar. Essa janela pode ser utilizada para carregar um programa executável ou abrir um documento contendo texto.
- V Na pasta , são guardados os arquivos excluídos pelo usuário ao longo de uma sessão de trabalho. Os arquivos armazenados nessa pasta são automaticamente excluídos pelo Windows 98, sem possibilidade de recuperação, sempre que o disco rígido do computador apresenta um índice de ocupação de 90%.




Estão certos apenas os itens

- A I, II e V.
- B I, III e IV.
- C I, IV e V.
- D II, III e IV.
- E II, III e V.


QUESTÃO 14








A figura acima mostra parte de uma janela do Word 97, com o fragmento de um texto que foi editado por um usuário. Com relação a essa janela e ao Word 97, assinale a opção correta.

- A O documento em apreço é composto por apenas uma página, como pode ser visto na seqüência de caracteres **Pág 1**, no canto inferior esquerdo da janela, e foi editado no dia primeiro de abril, como pode ser visto na seqüência de caracteres **1/4**.
- B Caso o usuário deseje maximizar a tela de trabalho, de forma que ela ocupe toda a área da tela do monitor de vídeo, é suficiente que ele clique em .
- C Caso o usuário selecione o título “A Ciência da Dedução” e clique em , será exibida a caixa de diálogo Fonte, que permite alterar a fonte utilizada no título.
- D Caso o usuário deseje que o Word 97 procure por erros gráficos no primeiro parágrafo, é suficiente que ele, após selecionar o referido parágrafo, clique em .
- E Caso o usuário deseje selecionar a palavra “cordas”, é suficiente que ele execute a seguinte seqüência de ações com o mouse: posicionar o ponteiro imediatamente à esquerda da letra “c”, no início dessa palavra; pressionar o botão esquerdo e, mantendo-o pressionado, posicionar o ponteiro entre a letra “s”, no final da palavra, e o ponto final à sua direita; liberar o botão esquerdo.

QUESTÃO 15



A figura acima mostra uma planilha elaborada no Excel 97 por um empregado de um hospital, contendo informações acerca de alguns materiais hospitalares que foram adquiridos. Com referência à janela mostrada e ao Excel 97, assinale a opção correta.

- A Caso o empregado deseje aumentar a largura da coluna B, é suficiente que ele clique, sucessivamente, no cabeçalho da referida coluna —  — e em .
- B O preço total pago pelos “Cateteres” pode ter sido obtido por meio da seguinte seqüência de ações: clicar na célula D5; digitar sucessivamente as teclas **B**, **5**, **X**, **C** e **5**; teclar **<<**.
- C Caso o empregado deseje calcular o total gasto nos itens listados, pondo o resultado na célula D6, é suficiente que ele realize a seguinte seqüência de ações: clicar na célula D6; clicar em ; teclar **<<**.
- D Para selecionar as células B2, C2 e D2, é suficiente que o empregado realize a seguinte seqüência de ações: clicar na célula D2; clicar três vezes seguidas em .
- E Caso o empregado deseje copiar o conteúdo da célula C2 para a área de transferência, é suficiente que ele clique nessa célula e, em seguida, clique em .

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

Um paciente, com vinte anos de idade, deu entrada na emergência de um hospital e, no momento em que estava sendo examinado, apresentou parada cardiorrespiratória. Nessa situação, a primeira providência a ser tomada é

- A abrir as vias aéreas.
- B fazer compressões torácicas.
- C puncionar uma veia periférica.
- D realizar uma desfibrilação.
- E realizar ventilações com pressões positivas.

QUESTÃO 17

Uma paciente, com dezoito anos de idade, apresenta, há 24 h, temperatura de 39° C, associada a calafrios e dor localizada em flanco direito. O exame físico mostra um quadro de astenia e fácies de dor. Não se encontra dor à pesquisa do sinal de Giordano. O hemograma apresenta leucocitose, e o exame de urina revela a existência de piúria maciça, com teste do nitrito positivo. Com base nessa história clínica, julgue os seguintes itens.

- I Um diagnóstico diferencial a ser considerado, nesse caso, é o de abscesso renal.
- II O fato de não haver disúria e o resultado negativo para sinal de Giordano prejudicam o diagnóstico de pielonefrite.
- III O teste do nitrito é altamente sensível para o diagnóstico de infecção do trato urinário.
- IV A realização de ecografia renal traz boa contribuição para o diagnóstico do caso em questão.
- V O emprego de antibiótico pode ser iniciado antes mesmo do resultado da cultura de urina.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.

QUESTÃO 18

Um paciente, com vinte anos de idade, tabagista, que ingere, com alguma frequência, bebida alcoólica, realizou uma consulta em ambulatório de clínica médica, quando se verificou que a medida de sua pressão arterial era de 150 mmHg × 95 mmHg. Na revisão de prontuário, descobriu-se que se tratava da terceira visita do paciente ao hospital no espaço de quatro semanas e que seus níveis de pressão arterial sistólica e diastólica sempre se situavam, respectivamente, entre 145 mmHg e 150 mmHg e entre 90 mmHg e 95 mmHg. A respeito do tratamento não-farmacológico para esse caso, julgue os itens a seguir.

- I A perda de peso é potencialmente a medida mais eficaz, independentemente de o paciente ser obeso.
- II A dieta hipossódica é uma recomendação cujo benefício ainda não está claramente demonstrado na literatura médica.
- III Uma dieta que contemple a ingestão de alimentos ricos em potássio pode promover uma significativa redução da pressão arterial.
- IV O paciente deve ter recomendação expressa de não mais fumar e de restringir o uso de bebidas alcoólicas.
- V Exercícios aeróbios devem ser realizados, obedecendo ao limite de 85% da frequência cardíaca máxima, pelo menos três vezes por semana.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.

QUESTÃO 19

O alcoolismo é um grave problema de saúde pública no Brasil e ocorre em todas as classes socioeconômicas, acarretando diversos problemas na esfera médica. A respeito desse assunto, julgue os itens subseqüentes.

- I Alguns indivíduos podem desenvolver hiperglicemia como conseqüência do metabolismo do álcool.
- II Muitos indivíduos estão sujeitos a desenvolver essa doença, motivados por fatores genéticos.
- III A presença de sinais neurológicos focais demanda urgente realização de uma tomografia computadorizada de crânio.
- IV Estudos vêm demonstrando que o alcoólico tem um melhor prognóstico terapêutico quando inserido em um programa de reabilitação.
- V O tremor é o sinal mais comum da abstinência e costuma ocorrer acompanhado de hiperatividade parassimpática.

Estão certos apenas os itens

- A I, II e III. C I, IV e V E II, IV e V.
B I, III e V. D II, III e IV.

QUESTÃO 20

O diabetes melito é uma das principais causas de procura de um consultório médico, e as estatísticas mostram ser essa uma doença de grande morbimortalidade. Os fatores que demandam uma pesquisa acerca de seu diagnóstico incluem

- I obesidade.
- II infecções recorrentes de pele.
- III poliúria.
- IV antecedentes familiares dessa enfermidade.
- V idade acima de sessenta anos.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.

QUESTÃO 21

Acerca das parasitoses intestinais, que ainda representam grande prevalência no Brasil, assinale a opção que apresenta a correta relação entre a doença e a droga para seu tratamento.

- A ascaridíase ÿ mebendazol
B strongiloidíase ÿ metronidazol
C esquistossomose ÿ cambendazol
D teníase ÿ mebendazol
E amebíase ÿ tiabendazol

QUESTÃO 28

A disgenesia gonadal é caracterizada pela presença de gônadas em estria com pouca quantidade ou ausência de células germinativas. A respeito desse tema, julgue os itens subseqüentes.

- I Na disgenesia gonadal mista, o fenótipo é variável desde o feminino até o masculino normais. O cariótipo mais freqüentemente encontrado é 45,x / 46,xy, e a cromatina é negativa.
- II Na disgenesia gonadal pura com cariótipo 46,xx, o fenótipo é feminino, a estatura é normal ou aumentada e há ausência de estigmas da síndrome de Tunner.
- III Na síndrome de Tunner, a gonadectomia está indicada quando houver a presença do cromossoma y e deve ser realizada, preferencialmente, na idade adulta.
- IV Na disgenesia gonadal mista, a gonadectomia deve ser realizada logo após o diagnóstico.
- V Na disgenesia gonadal pura com cariótipo 46,xy, não é necessária a gonadectomia, exceto nos casos em que houver sinais de virilização.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.

QUESTÃO 29

Em um quadro de dor pélvica aguda, é fundamental o equilíbrio entre a observação clínica e a conduta ativa. Tanto a precipitação quanto a demora em adotar uma conduta ativa podem ocasionar danos irreversíveis ao paciente. Nesse sentido, e com relação à doença inflamatória pélvica aguda (DIPA), julgue os itens a seguir.

- I Em um quadro de prenhez tubária com massa anexial maior que 3,5 cm e menor que 5 cm e ascensão dos títulos de BHcg no intervalo de 24 h, uma boa conduta seria o uso de metotrexate intramuscular, na dosagem de 1 mg/kg em dose única.
- II Na apendicite aguda, a dor, em geral, começa no hipogástrio, e a náusea e os vômitos são tardios; na DIPA, a dor inicia-se no epigástrio, e a náusea e os vômitos são precoces.
- III Para uma triagem rápida que possa orientar a antibioticoterapia, pode-se lançar mão da coloração pelo Gram. Se existe odor pútrido no exsudato, é porque há anaeróbios. No caso de resultado gram-negativo, os germes mais prováveis são os peptococos; no caso de gram-positivo, são os bacteróides. Na ausência de odor, a infecção é por aeróbios e, se o resultado for gram-negativo, o germe mais provável é o estafilococo.
- IV Os principais critérios para indicação cirúrgica são ausência de resposta ao tratamento clínico, massa pélvica que persista ou aumente, suspeita de ruptura de abscesso tubo-ovariano, presença de abscesso que permita drenagem extraperitoneal.
- V Apendicite aguda, prenhez ectópica, cisto de ovário roto, endometrioma, infecção e litíase renal devem ser considerados opções de diagnóstico diferencial.

Estão certos apenas os itens

- A I e II. C II e IV. E IV e V.
 B I e III. D III e V.

QUESTÃO 30

A endometriose é uma doença caracterizada pela presença de tecido com características histológicas semelhantes às do endométrio, porém em local ectópico. Com referência a essa doença, julgue os itens abaixo.

- I A endometriose apresenta como principal sintomatologia dor pélvica e infertilidade.
- II Uma das possíveis causas de infertilidade nas portadoras de endometriose seria a ocorrência de fenômenos imunológicos que podem interferir no transporte de gametas e na nidação.
- III Na endometriose, quase sempre há correlação entre a severidade da doença e a intensidade dos sintomas.
- IV No diagnóstico laboratorial, o CA 125, um antígeno glicoprotéico de alto peso molecular, formado contra linhagens celulares de câncer epitelial de ovário, é um dos marcadores mais utilizados devido a sua boa sensibilidade e excelente especificidade no diagnóstico de endometriose mínima.
- V A videolaparoscopia, embora seja útil tanto no diagnóstico quanto no tratamento cirúrgico da endometriose, não oferece vantagens significativas sobre o tratamento por meio da laparotomia.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.

QUESTÃO

Prolapso genital e incontinência urinária de esforço (IUE) constituem, ainda nos dias atuais, afecções de numerosas implicações médicas e sociais. Uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos ginecologistas é avaliar de forma precisa e objetiva as mulheres portadoras de prolapso genital. Acerca dessa enfermidade, assinale a opção **incorreta**.

- A A manutenção da continência urinária na mulher depende de duas condições básicas: que a bexiga seja estável e a pressão intra-uretral mantenha-se superior à vesical, exceto durante a micção.
- B A IUE é definida pela Sociedade Internacional de Continência (ICS) como a perda involuntária de urina quando há ocorrência de aumento de pressão abdominal demonstrável objetivamente e ausência de contração do detrusor, causando desconforto social ou higiênico para a mulher.
- C Na gênese da IUE e prolapso genital, a importância dos músculos do assoalho pélvico pode ser evidenciada pela menor incidência dessas afecções em mulheres chinesas, uma vez que envolvem, além de predisposição racial, atividade física e costumes posturais.
- D A colporrafia com aplicatura de Kelly seria efetiva nas lesões de fásia, notadamente nas fâscias retrovaginal e lateral. Quando realizada na presença de lesão de fásia pubocervical central ou transversa, o resultado é insignificante.
- E A posição do colo vesical, aliada a idade da paciente, mobilidade da vagina e ocorrência de distopias, pode ser o fator preponderante na escolha da técnica cirúrgica a ser empregada. Nos casos em que o colo cervical estiver elevado e tiver mobilidade dentro dos limites da normalidade, a técnica mais adequada seria um suporte para a uretra, o qual se consegue com a técnica de Sling.

QUESTÃO 32

No que se refere ao prolapso genital, julgue os itens subseqüentes.

- I Na sistematização das lesões do assoalho pélvico, é mais importante identificar o defeito do aparelho de sustentação que causa determinada alteração do que simplesmente classificar o grau de prolapso da cúpula vaginal ou do útero.
- II Frequentemente, o prolapso da cúpula vaginal está oculto e se encontra associado a grande cistocele ou retocele.
- III O exame retal permite avaliar a existência de retocele, sentindo-se a frouxidão da parede vaginal posterior e a prociência do reto para dentro da vagina, quando se faz força.
- IV A colpopexia sacral abdominal e a fixação ao ligamento sacroespinhoso são considerados padrões cirúrgicos aceitáveis, devido aos bons resultados na correção do prolapso vaginal.
- V Considerando que os defeitos do assoalho pélvico são, em geral, múltiplos, consegue-se sucesso na abordagem cirúrgica com a reconstrução do assoalho como um todo e não em partes.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.

QUESTÃO

Atualmente, a infecção genital causada pelo papiloma vírus humano (HPV) é a doença sexualmente transmissível viral mais freqüente na população sexualmente ativa. Em 1996, o *Center for Disease Control and Preventions* (CDC) estimava entre 500 mil e 1 milhão de casos novos por ano, nos Estados Unidos da América. No que concerne a essa patologia, assinale a opção correta.

- A Quando uma lesão por HPV progride de baixo grau para alto grau, ocorre alteração na relação infecção-hospedeiro, e o vírus passa de forma epissomal (circular) para linear e incorpora-se ao DNA das células epiteliais.
- B A neoplasia intra-epitelial de alto grau começa na zona de transformação, provavelmente em área de metaplasia escamosa madura. Movimentos centrípetos do epitélio metaplásico seriam forte fator preditivo de progressão da doença.
- C A avaliação de três aspectos fundamentais (aspereza de superfície, lesões satélites e captação irregular) tem especificidade suficiente para distinguir entre infecção pelo HPV e neoplasia intra-epitelial cervical (NIC).
- D O tipo de HPV, a carga viral e a detecção persistente do HPV não parecem ser marcadores importantes para o risco de progressão para câncer (CA) invasivo.
- E Lesões por HPV-6 e HPV-11 possuem risco significativamente aumentado para progressão, quando comparadas com infecção por HPV-16.

QUESTÃO 34

Nos países em vias de desenvolvimento, a ocorrência de CA do colo de útero adquiriu proporções epidêmicas, estimando-se a ocorrência de cerca de 460.000 casos novos por ano, o que representa 77% do total mundial. O Instituto Nacional de Câncer previu que em 1996 seriam diagnosticados mais de 20.000 casos desse CA no Brasil. Com referência a essa patologia, julgue os itens que se seguem.

- I A maioria dos CA do colo do útero é de células escamosas, e sua incidência está entre 85% e 90%. O adenocarcinoma é menos comum, menos conhecido e tem sua incidência entre 10% e 15%.
- II No exame colposcópico, é fundamental que se visualize a fonte de células anormais situadas na zona de transformação. Portanto, para que o exame seja satisfatório, é necessário que se veja a junção escamocelular (JEC).
- III Após o diagnóstico, é importante estadiar a neoplasia antes da instituição da terapêutica. De acordo com o estadiamento FIGO-1998 para o câncer do colo uterino, no estágio II, o tumor estende-se além do colo do útero, porém não atinge a parede pélvica e pode envolver a vagina sem atingir o seu terço inferior.
- IV O tratamento cirúrgico do carcinoma microinvasor no estágio clínico Ia1 (FIGO,1988) é similar ao da neoplasia intra-epitelial (NIC III), ou seja, amputação cônica do colo uterino ou histerectomia total abdominal.
- V A terapêutica cirúrgica do CA do colo do útero nos estadiamentos clínicos Ib e IIa consiste na histerectomia radical, linfadenectomia pélvica e retirada dos terços superior e médio da vagina. Geralmente, essa cirurgia é efetuada em pacientes abaixo de 65 anos, não-obesas, e em condições clínicas adequadas, com tumores menores que 5 cm.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.

QUESTÃO 35

A neoplasia maligna dos ovários constitui um dos grandes desafios da cirurgia ginecológica, não só pela dificuldade de seu diagnóstico precoce, como pelo alto índice de mortalidade. Acerca dessa patologia, assinale a opção correta.

- A A denominação CA de ovário, na realidade, engloba uma série de neoplasias malignas com tipos histológicos variados. Os de linhagem epitelial são os mais freqüentes.
- B O cistoadenocarcinoma mucinoso constitui o mais comum dos carcinomas primários de ovários. Quase sempre, são identificadas excrescências na face externa do tumor, e a bilateridade ultrapassa 30% dos casos.
- C Entre as neoplasias epiteliais primárias do ovário, os carcinomas de células claras são freqüentes e correspondem a cerca de 20% dos casos. Acredita-se que esses tumores sejam derivados do epitélio cenômico, uma vez que são, com freqüência, encontrados associados à endometriose principalmente em pacientes no período de menacme.
- D Entre os marcadores tumorais, o CA 125 é o mais utilizado universalmente, por apresentar uma alta sensibilidade e especificidade na detecção dos tumores ovarianos primários.
- E Na neoplasia ovariana, a base do tratamento cirúrgico é a histerectomia total abdominal com anexectomia bilateral. Porém, em casos selecionados até o estágio II, será permitido o tratamento conservador em pacientes que desejam procriar.

QUESTÃO 36

Denomina-se reprodução assistida (RA) a utilização de métodos tecnológicos de aproximação dos gametas no tratamento de casal infértil. Esses métodos podem ser de alta ou baixa complexidade. A respeito da RA, julgue os itens abaixo.

- I O fator tubário é uma das principais indicações para o procedimento de fertilização *in vitro* com transferência de embriões.
- II Após as técnicas de preparo do sêmen, quando o número de espermatozoides recuperados estiver entre 5 milhões e 10 milhões, pode-se utilizar, com excelentes resultados, a técnica de inseminação intra-uterina.
- III Após a indução da ovulação, faz-se a coleta dos oócitos, que deve ser realizada cerca de 24 h após a aplicação de gonadotrofina coriônica (HCG) com a função de simular o pico endógeno de LH.
- IV Quando o número de espermatozoides recuperados estiver em quantidades inferiores a 1 milhão, está indicada a técnica de micromanipulação de gametas, em especial, a injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICS).
- V Para identificação da fertilização, observa-se que, após o período entre 12 h e 18 h, o oócito penetrado pelo espermatozoide apresentará em seu interior a formação do pronúcleo masculino e feminino.

Estão certos apenas os itens

- A I, II e IV. C I, IV e V. E II, IV e V.
 B I, III e V. D II, III e IV.

QUESTÃO 37

Em ginecologia, a videolaparoscopia desempenha um papel essencial, porque, além de ser uma ferramenta importante no diagnóstico das patologias pélvicas, propicia a realização de biópsias dirigidas e procedimentos cirúrgicos. Com relação a esse procedimento, julgue os itens seguintes.

- I A insuflação adequada é essencial para uma cirurgia laparoscópica segura, e o gás carbônico (CO₂) é o mais utilizado, pois tem inúmeras vantagens, tais como: biodegradabilidade, disponibilidade, baixo custo, além de não ser inflamável.
- II Alguns serviços têm realizado o pneumoperitônio, utilizando a insuflação com o gás hélio, no intuito de minimizar os efeitos relacionados ao CO₂, como acidose respiratória, hipercapnia e instabilidade cardiovascular. Para alguns autores, o gás hélio pode ser agente de escolha para realização de pneumoperitônio, por eliminar os efeitos adversos hemodinâmicos e respiratórios associados com a insuflação de CO₂.
- III Na técnica clássica, a introdução do trocáter da ótica deve ser feita com compressão intra-abdominal de 10 mmHg, pois pressão acima desse valor aumenta o risco de êmbolos de carbono.
- IV Após o término do procedimento laparoscópico, antes da síntese da pele, deve-se proceder sistematicamente ao fechamento da aponeurose, mesmo nas incisões menores que 10 mm.
- V Pacientes com miomas uterinos maiores que 7 cm de diâmetro e localizados próximos às artérias ou cornos tubários são candidatas à miomectomia laparoscópica.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.

QUESTÃO 38

A videohisteroscopia é uma técnica endoscópica aplicada à ginecologia. Seus objetivos principais são o exame direto dos elementos do colo uterino, canal cervical e cavidade uterina e procedimentos cirúrgicos, utilizando aparelhagem própria para essa finalidade. A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir.

- I O meio de distensão de escolha para realização de histeroscopia diagnóstica é o gás carbônico, porém pode-se usar o soro fisiológico a 0,9% ou o *ringer* lactato, que são úteis principalmente na presença de pequenos sangramentos.
- II Na histeroscopia diagnóstica, as complicações oriundas da insuflação decorrem da entrada excessiva de CO₂ no sistema circulatório, o que pode determinar elevação da pressão arterial e dispnéia grave. Por isso, o CO₂ insuflado não deve ultrapassar 10 mL/min e pressão média de 50 mmHg.
- III A DIPA é uma contra-indicação relativa para realização da histeroscopia diagnóstica.
- IV Os pólipos endometriais sintomáticos ou assintomáticos devem ser ressecados, e a histeroscopia cirúrgica é a opção natural para essa ressecção.
- V As histeroscopias cirúrgicas devem ser realizadas com a cavidade uterina distendida por meio líquido. Quando a corrente elétrica monopolar for utilizada, recomenda-se o uso de soro fisiológico a 0,9%.

Estão certos apenas os itens

- A I e II. C II e III. E IV e V.
 B I e IV. D III e V.

QUESTÃO 39

Apesar de as técnicas de RA serem bastante difundidas e aplicadas em mais de cem clínicas especializadas, o Brasil não possui ainda uma legislação específica para essa prática. O que norteia os princípios éticos e morais dessa modalidade é a Resolução n.º 1.358, de 11/11/1992, do Conselho Federal de Medicina (CFM). Acerca dessa resolução, julgue os itens subseqüentes.

- I As técnicas de RA podem ser utilizadas desde que exista probabilidade efetiva de sucesso e não incorram em risco grave de saúde para a paciente ou possível descendente.
- II As técnicas de RA podem ser aplicadas com a intenção de selecionar o sexo ou qualquer outra característica biológica do futuro filho, desde que haja consentimento informado e esclarecido do casal.
- III O número ideal de oócitos e pré-embriões a serem transferidos para a receptora não deve ser superior a cinco, com o intuito de não diminuir os riscos de multiparidade.
- IV Em casos de gravidez múltipla decorrente do uso de técnica de RA, é permitida a utilização de procedimentos que visem à redução embrionária.
- V A doação de gametas ou pré-embriões será permitida, desde que os doadores conheçam a identidade dos receptores ou vice-versa.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.

QUESTÃO 40

Com referência à Lei n.º 9.263, que regula o parágrafo 7.º do art. 226 da Constituição da República e que trata do planejamento familiar, assinale a opção **incorreta**.

- A É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade por sucessivas cesarianas anteriores.
- B Será permitida a esterilização voluntária quando houver risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro conceito, testemunhado em relatório escrito assinado por dois médicos.
- C A esterilização cirúrgica será permitida em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico.
- D Toda instituição que possua as condições técnicas para procedimentos cirúrgicos estará legalmente apta a realizar a laqueadura tubária ou vasectomia.
- E Toda esterilização cirúrgica será objeto de notificação compulsória à direção do Sistema Único de Saúde (SUS).