

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com relação ao tratamento moral e à reabilitação psicossocial na área de terapia ocupacional, julgue os itens seguintes.

- 81** O terapeuta ocupacional que trabalha sob a lógica da reabilitação psicossocial possui noção de intersectorialidade, atua em rede com outros profissionais e realiza o encaminhamento implicado.
- 82** A ideia de trabalho protegido sugere uma aproximação com os princípios do tratamento moral e, por isso, não favorece a reinserção social de pessoas com transtornos mentais em situação de confinamento.
- 83** O terapeuta ocupacional alcança a totalidade da proposta da reabilitação psicossocial quando realiza atividades laborais destinadas aos pacientes com transtornos mentais em situações de confinamento.
- 84** O tratamento moral, embasado nas filosofias humanista e da libertação, enfatiza que o trabalho orienta os pacientes a manterem ou restabelecerem hábitos saudáveis de vida além de incentivar a disciplina.

Tendo em vista que, na população carcerária, há altos índices de prevalência de doenças como hanseníase, diabetes, tuberculose e DSTs/AIDS, e que os métodos e técnicas de avaliação em terapia ocupacional são necessários para atender as pessoas privadas de liberdade que estejam acometidas por essas doenças, julgue os itens que se seguem.

- 85** Na avaliação de componentes de desempenho sensorial e neuromuscular, o terapeuta ocupacional poderá utilizar o Teste de Monofilamento de Semmes-Weinstein e a Avaliação Cognitiva de Terapia Ocupacional de Lowenstein.
- 86** Uma vez que cada um dos instrumentos padronizados nas avaliações dos pacientes em terapia ocupacional normalmente é construído a partir de uma teoria específica, as intervenções propostas para lidar com os problemas detectados por cada um desses instrumentos devem, também, estar embasadas nas respectivas teorias.
- 87** A avaliação da terapia ocupacional com pessoas acometidas pela tuberculose deve incluir a observação da quantidade de gasto de energia empregada em atividades da vida diária que contribui para a diminuição da resistência desses indivíduos.
- 88** As atividades da vida diária e os aspectos cognitivos e sensoriomotores são elementos de observação e análise em uma avaliação terapêutica ocupacional que busque intervir com a finalidade de promover independência funcional e desenvolvimento de habilidades do paciente.
- 89** O histórico laborativo antes e durante a prisão é utilizado por terapeutas ocupacionais para fins de execução de atividades laborais e escolares em que o reeducando porventura venha a ser inserido.
- 90** A Medida de Independência Funcional e o Questionário de Avaliação da Saúde são instrumentos padronizados utilizados para avaliar o desempenho ocupacional dos pacientes.

Considerando que terapeutas ocupacionais utilizam constantemente abordagens grupais em suas práticas cotidianas, e que, para um efetivo e qualitativo trabalho com a população privada de liberdade, é preciso que esses profissionais saibam diferenciar os potenciais e limites das diferentes propostas teóricas e práticas sobre essa temática, julgue os itens a seguir.

- 91** Grupo paralelo e grupo de projetos são classificações propostas pela terapeuta ocupacional Mosey, que segue uma perspectiva desenvolvimentista sobre grupos.
- 92** De acordo com o Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário (PNSSP), os grupos terapêuticos são considerados ações de média complexidade em saúde.
- 93** No grupo de atividades, os pacientes fazem uma atividade em conjunto; e, na atividade grupal, cada paciente do grupo faz uma atividade que deseje de modo individual.

O Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário (PNSSP) enfatiza a importância da mudança da orientação do modelo assistencial até então prestado às pessoas privadas de liberdade. Percebe-se assim que o papel da terapia ocupacional nas equipes interdisciplinares deve estar de acordo com os princípios dessa nova orientação. A respeito desse assunto, julgue os itens subsequentes.

- 94** Em uma equipe multidisciplinar, a evolução, o planejamento e a terapia direcionados ao paciente devem ser discutidos coletivamente.
- 95** De acordo com a nova proposta assistencial, as equipes de saúde, incluindo o terapeuta ocupacional, devem investir suas ações, essencialmente, nos programas relacionados ao tratamento dos agravos causados pelas DSTs/AIDS e na redução de danos associados ao uso abusivo de álcool e outras drogas.
- 96** Na equipe interdisciplinar, os membros da equipe tomam decisões em conjunto, embora cada profissional possa conduzir suas próprias avaliações.
- 97** O foco principal do modelo assistencial preconizado pelo PNSSP está na promoção de saúde, com atuações nos programas de atenção básica e na articulação intersectorial.

Os diversos tipos de oficinas e as cooperativas são relevantes no trabalho do terapeuta ocupacional com o reeducando do presídio. Com relação a esses dispositivos, julgue os próximos itens.

- 98** No regime penitenciário federal, a segurança pública sobressai em relação ao aspecto ressocializador dos presos; por isso, ao realizar uma oficina terapêutica ou atividade que vise a reintegração do reeducando, aquele que tiver histórico de liderança de facções criminosas não poderá participar das atividades propostas.
- 99** Os pacientes com transtornos mentais que estejam confinados podem se beneficiar das cooperativas como alternativa de trabalho terapêutico e assistido, o que favorecerá sua adaptação ao mercado de trabalho.
- 100** Trabalhar a contratualidade e a inserção social é inviável nas oficinas terapêuticas realizadas em presídios, dada a necessidade, nesse tipo de trabalho, de convívio do preso com a sociedade e da articulação intersectorial dos técnicos com a rede externa de atenção psicossocial.

Com relação ao traumatismo craniocéfálico (TCE), julgue os itens seguintes.

- 101** Cadeiras de rodas, óculos prismáticos e agenda eletrônica são recursos de tecnologia assistiva que devem ser indicados, respectivamente, para casos de perda de mobilidade, déficits visuais e alteração de memória em pacientes com TCE.
- 102** A avaliação cognitiva de terapia ocupacional de Loewenstein (LOTCA) constitui uma avaliação formal passível de ser utilizada pelo terapeuta ocupacional em pacientes com TCE.
- 103** Limitações na amplitude de movimento (ADM) articular e(ou) o risco potencial para contraturas dos tecidos moles em pacientes com TCE são indicadores para prescrição de órtese ou gesso.
- 104** Para melhorar o controle da coordenação motora, pacientes com quadro clínico de TCE que apresentam ataxia como seqüela devem diminuir ao máximo o peso dos utensílios utilizados rotineiramente no desempenho das suas tarefas.
- 105** A apraxia ideativa, uma das seqüelas do TCE, caracteriza-se pela incapacidade do paciente de identificar objetos familiares colocados na palma de sua mão.
- 106** A escala de coma de Glasgow é utilizada como um indicador de consciência na fase aguda do TCE, ao passo que a escala Rancho Los Amigos é aplicável em qualquer fase após a ocorrência desse traumatismo.

Julgue os próximos itens, relativos à intervenção da terapia ocupacional no campo social.

- 107** No campo social, a terapia ocupacional pode contribuir para o equacionamento de questões relacionadas a desigualdades, contradições sociais e confrontos culturais.
- 108** No campo social, intervenções moduladas por procedimentos técnicos preestabelecidos não devem ser priorizadas pelo terapeuta ocupacional.
- 109** Vulnerabilidade e desfiliação são termos sinônimos usados no campo social que dizem respeito à ruptura das redes sociais de suporte.
- 110** A intervenção que objetiva a substituição de uma identidade criminal por uma identidade ocupacional é um exemplo de prática terapêutica ocupacional embasada no conceito de justiça punitiva.

Com relação aos processos de saúde, de doença e de envelhecimento no âmbito da terapia ocupacional, julgue os itens que se seguem.

- 111** O impacto da maioria dos problemas de saúde em indivíduos idosos recai sobre a independência nas atividades de vida diária desse grupo populacional.
- 112** Confusão e perda significativa de memória são consequências normais do envelhecimento.
- 113** A etiologia da queda em idosos pode estar relacionada a fatores intrínsecos, extrínsecos e comportamentais.
- 114** Bradicinesia, diminuição ou perda dos mecanismos posturais e tremores das mãos são características da doença de Alzheimer.
- 115** Os sintomas de depressão em idosos incluem fadiga, queixas referentes a perda de memória e dificuldade para dormir.

Um paciente com sessenta e quatro anos de idade, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, em tratamento clínico de 2 L de oxigênio por uma cânula nasal, vinte e quatro horas por dia, apresentou, durante uma avaliação da terapia ocupacional, reduzida capacidade motora e dificuldade para desempenhar atividades da vida diária. O paciente informou ainda que, por anos, trabalhou em uma mineradora.

Com relação ao caso clínico apresentado, julgue os itens a seguir.

- 116** No uso de técnicas de conservação de energia, deve-se considerar que o aumento da demanda de oxigênio é inversamente proporcional ao recrutamento de grandes músculos durante a execução de uma atividade.
- 117** Postura de controle de dispneia, respiração com a boca semifechada e respiração diafragmática são exemplos de técnicas de intervenção para pessoas com a doença pulmonar do referido paciente.
- 118** Adaptações para banheiros, como elevação da altura do vaso sanitário, instalação de barras de apoio e introdução de cadeira para banho, são recursos de tecnologia assistiva para pacientes com doenças pulmonares.
- 119** O caso clínico em questão abre a possibilidade de se estabelecer umnexo causal entre a doença apresentada pelo paciente e seu antigo trabalho.
- 120** Para avaliar o nível de desempenho do paciente em questão nas atividades de vida diária, o terapeuta ocupacional deve usar os seguintes instrumentos: Escala de Ashworth Modificada, Medida de Independência Funcional e Escala de Katz.

Espaço livre