

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens a seguir, relativos à assistência em saúde mental e à rede de atenção psicossocial do Ministério da Saúde.

- 81** Os centros de atenção psicossocial diferenciam-se pela denominação numérica em I, II, III e IV atribuída de acordo com extensão territorial abrangida por cada centro — e destinam-se ao atendimento de pacientes com transtornos mentais severos e persistentes, excetuados os casos de dependências químicas por álcool ou drogas, que devem ser acompanhados em unidades de internação hospitalar.
- 82** De acordo com a legislação vigente, os leitos destinados à prestação de serviços voltados à saúde mental em hospitais gerais deverão ser extintos em um prazo máximo de cinco anos, e todo tratamento ao doente mental deverá ser realizado nos centros de atenção psicossocial.
- 83** O serviço residencial terapêutico é prestado fora das unidades hospitalares gerais ou especializadas e tem por objetivo acolher pessoas com transtornos mentais egressas de hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia.

Acerca das características dos microrganismos e dos parasitas, julgue os itens que se seguem.

- 84** Os fungos desenvolvem-se em ambientes geralmente inadequados às bactérias, podendo causar, por exemplo, as micoses sistêmicas.
- 85** Os helmintos são seres eucarióticos, multicelulares, que podem ou não conter sistema digestório e que são capazes de absorver nutrientes a partir dos alimentos, fluidos corporais e tecidos do hospedeiro.
- 86** Bactérias são organismos unicelulares e procariotos que pertencem ao reino Monera e que podem causar doenças como hanseníase, tétano, tuberculose, diarreia e cólera.

Julgue os próximos itens, referentes a controle de infecção hospitalar.

- 87** Os compostos clorados, indicados para desinfecção de nível médio em artigos e superfícies, apresentam redução de atividade em presença de matéria orgânica.
- 88** Quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas por fluidos corporais, as mãos devem ser limpas pela técnica de fricção antisséptica com álcool.
- 89** Materiais com elevado potencial de provocar infecção são considerados artigos críticos, como agulhas, instrumentos cirúrgicos, endoscópios e equipamentos de anestesia, que são introduzidos em tecidos normalmente estéreis.

Acerca de aspectos diversos relativos a farmacologia, julgue os seguintes itens.

- 90** Ocorre interação medicamentosa quando a ação de um medicamento é alterada pela ação de outro, como no caso de dois medicamentos que são administrados de maneira combinada para promover um efeito sinérgico.
- 91** A farmacocinética representa o segmento da farmacologia que estuda as interações entre os medicamentos e seus respectivos receptores, bem como a série de eventos que resulta na resposta farmacológica.
- 92** Placebo é uma preparação farmacêutica que não contém princípio ativo e pode provocar no indivíduo um efeito nocebo.

Uma mulher com cinquenta e seis anos de idade foi submetida a uma cirurgia eletiva para a retirada de nódulos pulmonares. O procedimento cirúrgico iniciou-se como exploração endoscópica, tendo sido necessária, posteriormente, a realização de incisão torácica. A anestesia foi geral. Foi instalado cateter venoso central, com infusão de cristalóide, e cateter vesical de demora no transoperatório. Na chegada à sala de recuperação, a paciente apresentou agitação, tremores, pele fria, respiração superficial, saturação por oximetria de pulso de 95%, pressão arterial de 110 mmHg × 60 mmHg, 104 bpm e 12 irpm. Posteriormente, a paciente passou a apresentar fortes dores torácicas e, após vinte minutos, mostrou-se sonolenta, com respiração superficial, ausência de resposta aos chamados, diminuição da frequência respiratória (10 irpm) e diminuição na saturação por oximetria de pulso (85%), mesmo com o fornecimento de oxigênio suplementar por meio de máscara.

Com relação ao caso clínico apresentado, julgue os itens subsecutivos.

- 93** A paciente em questão deverá ter seus sinais vitais monitorados, especialmente a função respiratória e o nível de consciência, devendo-se, também, adotar medidas para seu aquecimento corporal.
- 94** De acordo com a descrição do processo cirúrgico apresentada, a paciente submeteu-se a uma toracoscopia que foi ampliada para uma toracotomia.
- 95** Embora a ocorrência de dor seja esperada para o tipo de cirurgia a que essa paciente foi submetida; a administração de medicamentos analgésicos deve ser evitada nesse tipo de situação clínica.
- 96** A evolução narrada, no caso em apreço, mostra melhora clínica da paciente, pois houve diminuição da agitação e melhora do padrão respiratório e da saturação de oxigênio de acordo com a oximetria de pulso.

Julgue os itens subsequentes, que dizem respeito a procedimentos técnicos de enfermagem.

- 97** O uso de cateter nasal do tipo óculos é o método mais prático para o fornecimento de oxigênio ao paciente, podendo ofertar aproximadamente 90% de fração inspirada de oxigênio (FiO<sub>2</sub>) com fluxos de até 10 L/min.
- 98** O enema é indicado para promover a defecação por estímulo à peristalse, devendo-se orientar o paciente a ficar na posição de decúbito lateral esquerdo durante a sua aplicação.
- 99** Quando o paciente encontra-se acamado, a técnica de higiene corporal que pode ser adotada é a do banho no leito, que se deve iniciar pela lavagem dos olhos do paciente com gazes umedecidas em água morna, mediante movimento de limpeza que vá do canto interno para o limite lateral externo de cada olho.
- 100** Para se realizar a instilação ocular de um colírio, deve-se solicitar que o paciente olhe para cima e, em seguida, proceder ao gotejamento da solução no ponto médio do saco conjuntival.

Julgue os itens a seguir com relação a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes melito (DM).

- 101** A HAS em pacientes jovens está diretamente relacionada à história familiar de acidente vascular encefálico, doença arterial coronariana prematura (homens com idade abaixo de cinquenta e cinco anos e mulheres de até sessenta e cinco anos de idade) e morte prematura e súbita de familiares próximos.
- 102** O teste laboratorial que deve ser realizado em paciente com suspeita de DM é a glicemia de jejum, em que se quantifica a glicose sanguínea, normalmente após jejum de oito a doze horas.
- 103** Embora os sinais clínicos poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicada de peso estejam exclusivamente presentes na DM tipo 1, para que se estabeleça o diagnóstico diferencial dessa patologia em relação à DM tipo 2, é indispensável a dosagem dos níveis sanguíneos de glicose.
- 104** O diagnóstico de HAS é definido quando, em pelo menos três aferições de pressão arterial realizadas em um intervalo mínimo de uma semana entre cada medida, a média aritmética é maior ou igual a 140 mmHg × 90 mmHg.

A respeito da assistência aos pacientes com doenças sexualmente transmissíveis (DST), julgue os próximos itens.

- 105** A maioria dos indivíduos com infecção aguda por HIV apresenta carga viral elevada, o que aumenta a chance de infecção de seus parceiros.
- 106** O tratamento da infecção por papilomavírus humano é capaz de remover as lesões condilomatosas e impedir a transmissão da doença, porém não leva à cura dos pacientes.
- 107** O objetivo do atendimento ao paciente com DST é prover diagnóstico, tratamento e aconselhamento adequados em uma única consulta, sendo dispensável a avaliação laboratorial.
- 108** Entre as formas de transmissão do vírus da hepatite B (HBV) estão as transmissões por relação sexual e por via parenteral.
- 109** Não deverão receber a imunoprofilaxia para hepatite B indivíduos que tenham sofrido violência sexual de forma repetida pelo mesmo agressor, que seja comprovadamente vacinado, situação frequente em casos de violência sexual intrafamiliar.

Julgue os itens subsecutivos, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS).

- 110** As unidades prestadoras de serviços têm autonomia e exclusividade para definir as necessidades e prioridades das suas representações nas instâncias gestoras municipais e regionais, assim como nos conselhos de saúde, e decidem sobre a gestão da produção ambulatorial, seus serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, a clientela e suas vagas.
- 111** A atenção em saúde orientada conforme os princípios de humanização é um dos objetivos da Política Nacional de Atenção às Urgências.
- 112** Com o objetivo de evitar a institucionalização da participação social, o SUS assegura à população a participação direta nas regionais de saúde.
- 113** As Leis n.º 8.080/1990 e n.º 8.142/1990 foram promulgadas com intuito de se fortalecer a rede pública de serviços de saúde em todos os níveis de complexidade.

No que tange ao SUS e à Política Nacional de Humanização (PNH), julgue os itens que se seguem.

- 114** A qualificação das equipes de acolhimento é um requisito para a implantação da classificação de risco.
- 115** Corresponsabilidade e vínculos solidários são termos utilizados na PNH que apresentam equivalência semântica com o termo parceria, utilizado no Programa Paciente pela Segurança do Paciente, e que se referem ao envolvimento do paciente e de seus familiares no cuidado.
- 116** O respeito à diversidade na produção de saúde e à autonomia de usuários e trabalhadores do SUS é princípio importante para a assistência ao paciente, embora não esteja explicitamente contemplado na PNH.
- 117** A tanatologia possibilita a pacientes e a profissionais de saúde que a qualidade de vida seja redimensionada, prepara para a vivência de perdas e do sentido de viver e auxilia a comunicação em momentos de crise.
- 118** No contexto atual de gestão e humanização do SUS, funções tipicamente gestoras — definição de clientela, decisões a respeito dos modos de financiamento dos programas e ação no sistema de saúde e na sua rede de serviços — deixam de ser atribuições dos hospitais.

No que diz respeito ao código de ética dos profissionais de enfermagem e à segurança no trabalho, julgue os itens subsequentes.

- 119** O profissional de enfermagem não poderá, em situações de emergência, recusar-se a executar procedimentos técnicos, ainda que esses procedimentos não sejam de sua área de competência.
- 120** Em caso de falta de material ou de equipamentos de proteção individual e coletiva, o profissional de enfermagem tem o direito de recusar-se a desenvolver atividades profissionais.