



## INCA

# CARGO 51: TECNOLOGISTA JÚNIOR – ÁREA: MEDICINA – ESPECIALIDADE: CIRURGIA DE CABEÇA E

## PESCOÇO

### Prova Discursiva

Aplicação: 7/3/2010

## PADRÃO DE RESPOSTA

O maior componente da fístula linfática são os triglicérides. O volume de linfa produzida em 24 horas varia produzida em 24 horas varia de 1,5 a 4 litros. A perda de proteína e eletrólitos pode levar a uma significativa desordem metabólica.

Ao dissertar sobre o tratamento conservador, o candidato deveria elencar a necessidade da adoção dos seguintes procedimentos:

- reposição de eletrólitos;
- dieta restrita a triglicérides de cadeia média;
- decúbito elevado da cabeceira da cama e curativo cervical compressivo.

Ainda sobre o tratamento conservador, o candidato poderia citar o uso de dieta enteral e também uso somatostatina.

Por fim, o candidato deveria mencionar que, em caso de falência do tratamento conservador, o paciente deve ser submetido a exploração cirúrgica cervical a procura do ducto linfático aberto. Caso o referido ducto seja facilmente localizado, esse deve ser ligado. Porém, se houver dificuldade em sua localização – o que não é comum – o cirurgião deve solicitar ao anestesiológico para aumentar a pressão torácica do paciente a fim de aumentar a drenagem de linfa para localizar o vaso. Ainda dentro dos procedimentos intraoperatórios, pode haver necessidade de rotação do retalho muscular local e até uso de cola biológica.