

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens seguintes, a respeito da classificação diagnóstica em psiquiatria.

- 51 De acordo com o DSM-IV, um paciente que apresenta episódio depressivo em decorrência de hipotireoidismo deve ter essa condição médica geral mencionada tanto no eixo I como no eixo III.
- 52 Um paciente que representa perigo persistente de ferir gravemente a si mesmo ou a terceiros deve ser classificado com código 10 na escala de avaliação global de funcionamento (AGF) do DSM-IV-TR.
- 53 Na classificação internacional de doenças – 10.^a edição (CID-10), o transtorno obsessivo-compulsivo pertence à classe de transtornos neuróticos relacionados a estresse e somatoformes.
- 54 O DSM-IV-TR é utilizado para descrever e explicar os transtornos mentais com base em teorias da psiquiatria biológica.

Com relação à psicopatologia, julgue os próximos itens.

- 55 No delírio sensitivo de relação, descrito por Kretschmer, um indivíduo hiperemotivo, histriônico e impulsivo desenvolve crença autorreferente no contexto de um relacionamento interpessoal.
- 56 A vontade não está associada aos impulsos, pois se trata de uma elaboração cognitiva influenciada por fatores intelectivos e socioculturais.
- 57 Os estados crepusculares, assim como o estado hipnótico e de transe, são alterações qualitativas da consciência.
- 58 A psicopatologia fenomenológica tem como foco as vivências subjetivas e inconscientes dos pacientes, sem levar em consideração as origens e consequências dessas experiências.
- 59 O delírio intuitivo, ou catatímico, é secundário a um distúrbio básico do humor e ocorre nas síndromes depressivas e maníacas.

No que se refere às opções de tratamento dos transtornos mentais, julgue os itens que se seguem.

- 60 Todos os pacientes candidatos a eletroconvulsoterapia suspeitos de serem portadores de lesão cerebral expansiva devem ser submetidos a exames de imagem, pois tais lesões são contraindicações absolutas ao referido procedimento.
- 61 O pindolol, antagonista seletivo dos receptores 5HT1A e 5HT1B, tem sido estudado na potencialização do efeito dos antidepressivos e conta com evidências consistentes de eficácia no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
- 62 O ácido valproico, um estabilizador de humor, é causa da síndrome do valproato fetal, sendo contraindicado durante a gestação e a amamentação.
- 63 Antes da prescrição de metilfenidato deve-se solicitar um eletroencefalograma e um eletrocardiograma ao paciente, pois essa medicação é contraindicada para indivíduos portadores de epilepsia ou de arritmia cardíaca.
- 64 O conceito segundo o qual a eletroconvulsoterapia (ECT) só deve ser usada em casos refratários ao tratamento farmacológico não mais se aplica, pois esse método pode ser utilizado como primeira opção em várias situações clínicas.

Julgue os itens a seguir, acerca de perícias em psiquiatria.

- 65 O servidor que apresentar indícios de doença mental e prejuízo de sua capacidade laboral, identificados por sua chefia imediata, deverá submeter-se a avaliação pericial independentemente de sua concordância.
- 66 Um servidor que apresente incapacidade parcial, permanente e multiprofissional poderá ser readaptado em outra função, segundo a legislação vigente.
- 67 O médico assistente deve prestar as informações acerca do diagnóstico, evolução, tratamento e prognóstico da doença com o objetivo de complementar a avaliação pericial, mas não cabe a ele estender-se sobre o tempo estimado de recuperação do periciado, atribuição esta exclusiva do perito.

No que diz respeito às emergências psiquiátricas, julgue os itens a seguir.

- 68** Durante o atendimento psiquiátrico, embolia pulmonar e feocromocitoma fazem parte do diagnóstico diferencial da ansiedade.
- 69** A síndrome serotoninérgica que resulta do agonismo aumentado dos receptores 5HT1A cursa com sintomas neurológicos como mioclonias, tremores, calafrios e hiperflexia e está associada a alta taxa de mortalidade.
- 70** Parkinsonismo, miocardite e diabete insípido nefrogênico estão entre os sintomas de intoxicação crônica pelo lítio.

Em relação ao *delirium*, julgue os itens subsequentes.

- 71** Anticolinérgicos, betabloqueadores e digitálicos são medicamentos considerados como causas farmacológicas do *delirium*.
- 72** O paciente com *delirium* pode apresentar, além de rebaixamento do nível de consciência, alterações da percepção sensorial, do humor e da psicomotricidade.
- 73** O sintoma de desorientação espacial geralmente antecede o sintoma de desorientação temporal.

Acerca de transtornos relacionados ao uso do álcool, julgue os itens subsecutivos.

- 74** A fenitoína deve ser utilizada como tratamento padrão e profilático de convulsões por abstinência de álcool.
- 75** Estudos sugerem que filhos de pai alcoolista apresentam grande vulnerabilidade de desenvolverem dependência ao álcool.
- 76** O *delirium tremens* inicia-se geralmente após uma semana contada da interrupção ou redução do consumo de bebidas alcoólicas.
- 77** A doença de Wenicke costuma ser reversível com o tratamento adequado, ao contrário da síndrome de Korsakoff.

Julgue os itens seguintes, que versam acerca dos transtornos psiquiátricos no idoso.

- 78** O tratamento com lítio é contraindicado para idosos, já que apresenta baixa eficácia nessa população.
- 79** O alto nível socioeconômico, o estado civil solteiro ou divorciado, o gênero masculino e o declínio da saúde física são fatores associados à ocorrência de depressão no idoso.
- 80** A depressão de início na terceira idade geralmente está associada a alterações neuropsicológicas e estruturais do cérebro.

Com relação à avaliação psiquiátrica de crianças e adolescentes, julgue os seguintes itens.

- 81** Os sintomas psiquiátricos de uma criança geralmente são mais perturbadores para ela do que para quem está próximo dela.
- 82** O grau de prejuízo no funcionamento psicossocial da criança é determinante para estabelecer o significado clínico de determinados sintomas.
- 83** A psicopatologia com anormalidades qualitativas ocorre na maioria dos transtornos psiquiátricos da infância e da adolescência.
- 84** O quadro mórbido infantil se manifesta de diferentes formas, variando de acordo com o momento evolutivo e o ambiente familiar em que a criança está inserida.

Julgue os itens a seguir, acerca do abuso físico e sexual de crianças e adolescentes.

- 85** Deve ser investigada a ocorrência de abuso físico em crianças que apresentem lesões nas costas, nas nádegas, nos órgãos genitais e no dorso das mãos.
- 86** Entre os casos de abuso sexual denunciados, o de menor incidência é o que envolve o incesto entre pai e filha.
- 87** Casos de voyeurismo, de produção de fotos pornográficas e de exibicionismo que envolvam crianças não configuram abuso sexual, visto que neles não se estabelece contato físico com a vítima.

No que se refere às políticas públicas de saúde mental da infância e adolescência, julgue os itens subsequentes.

- 88** A educação especial e a saúde mental representam os setores que se destacam no desenvolvimento de ações de prevenção e de promoção de saúde e na identificação de casos nos quais as intervenções precoces podem reverter ou evitar o agravamento dos problemas mentais.
- 89** Nos centros de atenção psicossocial infanto-juvenis (CAPSi), os atendimentos de transtornos de maior prevalência na infância e adolescência, como os transtornos hipercinéticos e os transtornos ansiosos, devem ser priorizados.
- 90** Crianças e adolescentes que apresentam problemas de conduta devem ser atendidos, concomitantemente, pela justiça e pela saúde mental.

Os transtornos de ansiedade são patologias prevalentes na psiquiatria. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.

- 91** Indivíduos com prolapso de válvula mitral apresentam, estatisticamente, maiores chances de desenvolver transtorno de pânico que indivíduos saudáveis.
- 92** Para o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, segundo o DSM-IV, é necessário que o indivíduo apresente sensação de preocupação excessiva, na maioria dos dias, por um período mínimo de seis meses.
- 93** O caso clínico denominado o pequeno Hans, que tratava de um garoto de cinco anos com medo de cavalos, foi um modelo utilizado por Freud para descrever as teorias da ansiedade histérica.
- 94** Estudos em animais auxiliam no entendimento de certos mecanismos humanos. A estimulação e a ablação, em animais, da área denominada *locus ceruleus*, produz, respectivamente, resposta de medo e bloqueio à resposta de medo.
- 95** O início do transtorno obsessivo compulsivo pode ocorrer na infância ou na adolescência, havendo casos de ocorrência desse transtorno em crianças com dois anos de idade.

Em relação às diversas formas de transtornos do humor, julgue os itens que se seguem.

- 96** Sintomas de transtorno depressivo são prevalentes em, no mínimo, 50% dos indivíduos diagnosticados com doença de Parkinson.
- 97** A utilização de antidepressivos inibidores da enzima monoaminoxidase (MAO) causa, frequentemente, pico hipertensivo potencialmente letal em indivíduos que ingerem alimentos ricos em taurina.
- 98** Entre os efeitos colaterais dos antidepressivos que desenvolvem efeito de bloqueio alfa-1-adrenérgico constam hipotensão postural, tremores e vertigem.
- 99** Se um indivíduo que tratou transtorno depressivo maior apresentar, após alguns anos, transtorno distímico, ele deve ser diagnosticado com depressão dupla.
- 100** É correto afirmar que, geralmente, o transtorno depressivo ocorre em indivíduos jovens e o transtorno bipolar do tipo I em indivíduos idosos.
- 101** Para o diagnóstico de episódio de hipomania, segundo o DSM-IV, é necessário que o indivíduo apresente humor não depressivo e claramente distinto do habitual, por um período mínimo de quatro dias.

A respeito de transtornos psicóticos e esquizofrenia, julgue os itens subsequentes.

- 102** A psicose puerperal é um quadro clínico leve e, portanto, não tem indicação para eletroconvulsoterapia (ECT).
- 103** A síndrome de Cotard é caracterizada por um quadro delirante, no qual o indivíduo acredita na existência de um impostor, um duplo, se passando por ele.
- 104** De acordo com o DSM-IV, o transtorno esquizofreniforme é caracterizado por um quadro sintomático equivalente à esquizofrenia, exceto pelo período de apresentação de sintomas, que, no caso do transtorno esquizofreniforme, ocorre por, no máximo, dois meses.
- 105** O conceito de duplo vínculo, formulado por Theore Lidz, descreve alterações no comportamento familiar na tentativa de explicar a esquizofrenia.

No que se refere a transtornos alimentares, julgue os itens a seguir.

- 106** Para ser diagnosticado com bulimia nervosa, o indivíduo deverá apresentar episódios bulímicos pelo menos uma vez por semana, durante o período de dois meses.
- 107** Os antidepressivos tricíclicos, inibidores da recaptção de serotonina, em razão de sua eficácia, devem ser indicados para o tratamento de pacientes com anorexia nervosa.
- 108** A incidência da anorexia nervosa é maior no período pré-púbere e no final da adolescência.
- 109** A mortalidade por anorexia nervosa é causada, principalmente, por desnutrição e alterações eletrolíticas.

Acerca de transtornos do sono, julgue os itens subsecutivos.

- 110** As alucinações hipnagógicas, consideradas alucinações auditivas, ocorrem, na maioria das vezes, ao despertar.
- 111** O terror noturno decorre de pesadelos que ocorrem, na maioria das vezes, no terço final da noite, durante o sono REM.
- 112** O sonambulismo inicia-se, geralmente, na terceira ou quarta fase do sono.

Julgue os itens seguintes, relativos ao transtorno da identidade de gênero.

- 113** Indivíduos com transtorno da identidade de gênero costumam apresentar genitália ambígua ou hipogonadismo.
- 114** Em meninos, a identificação com o gênero oposto é geralmente manifestada por acentuado interesse por atividades femininas.
- 115** A identificação com o gênero oposto geralmente é desencadeada pelo desejo de obtenção de vantagens culturais percebidas por quem é de outro gênero.
- 116** Homens heterossexuais com transtorno de identidade de gênero apresentam, na maioria das vezes, início do transtorno em meados da vida adulta.

No que diz respeito à simulação, julgue os itens subsequentes.

- 117** Em casos de simulação, o indivíduo produz sintomas físicos e psicológicos por motivações inconscientes.
- 118** Ao suspeitar de simulação, o entrevistador deve utilizar questões abertas e evitar o confronto com o indivíduo.
- 119** De acordo com a classificação internacional de doenças (CID-10), a simulação é classificada como um transtorno mental.
- 120** Constituem indícios de simulação a confirmação indiscriminada de sintomas, a afirmação de sintomas óbvios e o elevado número de sintomas raros.

PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, no local apropriado, pois **não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido**.
- Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
- Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
- Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até **40,00 pontos**, dos quais até **2,00 pontos** serão atribuídos ao quesito apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

O termo esquizofrenia, cunhado por Eugen Bleuler, substituiu a dementia precoce na literatura. O termo foi escolhido para expressar a presença de cisões (*schisms*) entre pensamento, emoção e comportamento. De acordo com a teoria de Bleuler a respeito das cisões mentais, os sintomas fundamentais específicos da esquizofrenia incluíam perturbações associativas, perturbações afetivas, autismo e ambivalência. Também foram identificados sintomas acessórios (secundários), que incluíam aqueles que Kraepelin considerava os principais indicadores de dementia precoce: alucinações e delírios.

Kaplan. **Compêndio de psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria clínica**. 9ª Edição, Artmed, 2007 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca das alterações do estado mental de um paciente que sofre de esquizofrenia. Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

- ▶ alterações do humor e do afeto; [valor:12,00 pontos]
- ▶ alterações da sensopercepção; [valor:10,00 pontos]
- ▶ alterações do pensamento, incluindo conteúdo, forma e processo do pensamento.[valor:16,00 pontos]

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	



cespeUnB

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos