

## **EMPREGO 6:**

**Médico · Especialidade: Cirurgia de cabeça e pescoço**

### **LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.**

- 1 Confira atentamente se os seus dados pessoais e se os dados identificadores de seu emprego transcritos acima coincidem com o que está registrado em sua folha de respostas. Confira também o seu emprego e o seu nome em cada página numerada deste caderno de provas.** Em seguida, verifique se este caderno contém a quantidade de itens indicada em sua **folha de respostas**, correspondentes às provas objetivas. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito, ou haja divergência quanto aos seus dados pessoais ou quanto aos dados identificadores de seu emprego, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- 2 Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da folha de respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:**  
**A calúnia e a injúria são armas da ignorância.**
- 3 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização de fiscal de sala.**
- 4 Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas.**
- 5 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de provas.**
- 6 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das suas provas.**

### **OBSERVAÇÕES**

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido em edital.
- Informações adicionais: telefone 0((XX))61 3448-0100; Internet – [www.cespe.unb.br](http://www.cespe.unb.br).
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas respostas.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

### Texto para os itens de 1 a 20

1 É comum um bebê chorar até três horas por dia.  
 Afinal, essa é a única forma que ele tem para se comunicar —  
 4 informar que está com sono, fome ou incomodado com o  
 barulho, por exemplo. No interior de muitos lares, porém, essa  
 manifestação é rebatida por adultos com violentas sacudidas.  
 Um ato condenável, que acontece com uma frequência muito  
 7 maior do que se imagina. De tão recorrente, virou alvo de um  
 projeto internacional para preveni-lo. A campanha, que teve  
 início na Austrália, já está em mais de 150 países e foi lançada  
 10 recentemente no Brasil.

O objetivo é chamar a atenção de pais, babás, outros  
 cuidadores, educadores e médicos para o problema e suas  
 13 consequências. No meio científico, ele é chamado de síndrome  
 do bebê sacudido. A violência pode provocar danos  
 neurológicos, cegueira e até a morte do bebê. “Essa também é  
 16 a causa mais comum de traumatismo craniano não acidental  
 entre crianças menores de três anos”, afirma o psicoterapeuta  
 João Figueiró, presidente do Instituto Zero a Seis, voltado para  
 19 a promoção de ações em favor de crianças na faixa etária de  
 0 a 6 anos.

Os prejuízos ocorrem principalmente porque, no  
 22 primeiro ano de vida, o organismo do bebê está em pleno  
 desenvolvimento. Os nervos e vasos sanguíneos são mais  
 frágeis, por exemplo, assim como as estruturas do pescoço. Até  
 25 os neurônios estão desprotegidos — a membrana que os  
 recobre ainda está em construção. “Ao ser chacoalhado, o  
 cérebro se desloca, já que tem volume menor do que a caixa  
 28 craniana”, explica o terapeuta. “E um dos resultados pode ser  
 a ruptura de vasos e hemorragia intracraniana.”

Muitos médicos, no Brasil e no mundo todo,  
 31 desconhecem a síndrome. “Por isso queremos divulgar mais  
 informações a esses profissionais”, afirma a pediatra Evelyn  
 Eisenstein. Em relação às famílias, a campanha pretende  
 34 orientar sobre formas de acalmar a criança durante as crises de  
 choro. “A mãe que tem um vínculo forte com o filho protege.  
 Queremos criar meios para fortalecer essa relação e evitar os  
 37 maus-tratos”, diz a especialista.

Greice Rodrigues. **Mais proteção aos bebês.**  
 Internet: <www.istoe.com.br> (com adaptações).

A respeito dos sentidos e das estruturas linguísticas do texto, julgue os itens a seguir.

- 1 Crianças acometidas pela síndrome do bebê sacudido são vítimas de abuso físico cometido por adultos.
- 2 A despeito de ser frequente, a síndrome do bebê sacudido é ignorada por um número considerável de médicos.
- 3 As orações introduzidas por travessão (l.2 e 25) poderiam ser postas entre parênteses, sem que isso acarretasse prejuízo para a correção gramatical do texto.
- 4 Os vocábulos **findada** e **recém**, por serem, respectivamente, sinônimos dos vocábulos “rebatida” (l.5) e “recentemente” (l.10), podem substituí-los no texto, mantendo-se seu sentido e sua correção gramatical.
- 5 Segundo o texto, em crianças menores de três anos de idade, traumatismos cranianos decorrem, quase sempre, da síndrome do bebê sacudido.
- 6 As formas verbais “acontece” (l.6) e “virou” (l.7) têm o mesmo sujeito.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma proposta de reescritura para determinado trecho do texto, indicado entre aspas, que deve ser julgada quanto à manutenção do sentido original no texto e à correção gramatical.

- 7 “Um ato condenável, que acontece com uma frequência muito maior do que se imagina. De tão recorrente, virou alvo de um projeto internacional para preveni-lo” (l.6-8): Um ato condenável que devido à sua frequência, virou alvo de um projeto internacional para preveni-lo.
- 8 “O objetivo é chamar a atenção de pais, babás, outros cuidadores, educadores e médicos para o problema e suas consequências” (l.11-13): O intuito é atentar pais, babás, outros cuidadores, educadores e médicos para o problema e para seus efeitos.
- 9 “Até os neurônios estão desprotegidos — a membrana que os recobre ainda está em construção” (l.24-26): Até mesmo os neurônios estão desprotegidos, pois, a membrana que recobre-os já está em formação.

Ainda a respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue os itens subsequentes.

- 10 Por apontar detalhes da síndrome do bebê sacudido, o texto caracteriza-se como predominantemente descritivo.
- 11 Infere-se do texto que a irritação provocada pelo choro do bebê é a principal causa da violência praticada contra ele.
- 12 Os termos “ele” (l.13) e ‘Essa’ (l.15) apresentam referentes distintos.
- 13 De acordo com o texto, o ato de balançar bebês para acalmá-los pode resultar na síndrome do bebê sacudido e, por isso, deve ser evitado.
- 14 Na expressão “em favor de” (l.19), a substituição de “em” por **a** preserva a correção gramatical e a coerência do texto.
- 15 Infere-se do texto que a brincadeira de lançar um bebê para o alto, embora não seja um ato consciente de violência, também pode ser perigosa, devido à possibilidade de, com esse movimento, haver deslocamento do cérebro no crânio da criança.

Com relação aos aspectos morfofossintáticos do texto, julgue os itens que se seguem.

- 16 O período ‘A mãe que tem um vínculo forte com o filho protege’ (ℓ.35) contém uma oração subordinada adjetiva explicativa.
- 17 O substantivo ‘maus-tratos’ (ℓ.37) só pode ser empregado no plural.
- 18 Para manter a correção gramatical do trecho, caso se substituísse a expressão “um bebê” (ℓ.1) por **bebês**, as formas verbais do primeiro período do texto deveriam ser flexionadas no plural.
- 19 Os vocábulos “recorrente” (ℓ.7) e “presidente” (ℓ.18) pertencem à mesma classe de palavras.
- 20 Na linha 18, o vocábulo “para” pode ser omitido se, nesse caso, a partícula “a” que o segue receber sinal indicativo de crase, para que seja mantida a correção gramatical do período.

Quase duas décadas após o início do processo de institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), a implantação e a implementação evoluíram muito, especialmente em relação aos processos de descentralização e municipalização de ações e serviços de saúde. A respeito do Pacto pela Saúde, julgue os itens que se seguem.

- 21 As prioridades do Pacto pela Vida podem ser estabelecidas por meio de metas nacionais, estaduais, regionais ou municipais.
- 22 As prioridades do Pacto pela Vida incluem a saúde do idoso e a promoção da saúde e o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e às endemias, com ênfase em dengue, hanseníase, tuberculose, malária e *influenza*.
- 23 Segundo as diretrizes do Pacto pela Vida, pessoa idosa é aquela com idade a partir de 65 anos.
- 24 O Pacto pela Saúde é constituído pelos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão.
- 25 O Pacto pela Vida baseia-se em prioridades que têm impacto sobre o planejamento do SUS.

Julgue os itens de 26 a 31, relativos ao Pacto de Gestão do SUS, que define as diretrizes e responsabilidades referentes a descentralização, regionalização e financiamento, entre outras.

- 26 A regionalização, como diretriz do SUS e eixo estruturante do Pacto de Gestão, deve orientar a descentralização de ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores.
- 27 A descentralização da gestão do SUS deve ser pactuada por meio de votações nas comissões intergestores bipartites e tripartites.
- 28 Um dos princípios do financiamento para o SUS é a redução das iniquidades macrorregionais, estaduais e regionais, a ser contemplada na metodologia de alocação de recursos, considerando-se as dimensões étnico-raciais e sociais.

- 29 No que se refere ao financiamento das ações de vigilância em saúde, o Pacto de Gestão prevê repasses específicos para campanhas de vacinação.
- 30 Na estruturação da gestão do trabalho no SUS, prevista pelo Pacto de Gestão, são priorizados estados, capitais, Distrito Federal (DF) e municípios, independentemente do número de empregos públicos, desde que possuam ou venham a criar setores de gestão do trabalho e da educação nas secretarias municipais e estaduais de saúde.
- 31 O Pacto de Gestão prevê, por meio de ações fortalecedoras, a participação e o controle social.

A respeito de condições para promoção, proteção e recuperação da saúde e da organização e funcionamento dos serviços correspondentes, julgue os itens subsequentes à luz da Lei n.º 8.080/1990.

- 32 A implementação do Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados compete à União, aos estados, ao DF e aos municípios.
- 33 À direção nacional do SUS compete estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo essa execução ser complementada pelos estados, pelo DF e pelos municípios.
- 34 A iniciativa privada não pode participar do SUS, mesmo que em caráter complementar.
- 35 Vigilância epidemiológica é o conjunto de ações que visam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde coletiva, não individual, objetivando medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

Os determinantes sociais e econômicos da saúde resultam, principalmente, da interação entre determinantes estruturais da vida cotidiana e as condições em que essa vivência ocorre. A esse respeito, julgue os itens seguintes, considerando os indicadores de saúde no Brasil.

- 36 O padrão socioeconômico da população brasileira nos últimos vinte anos apresenta queda dos níveis de emprego e de escolarização, apesar de um discreto aumento da renda.
- 37 O número de óbitos por agressões e por armas de fogo na população brasileira tem apresentado elevação nos últimos vinte anos, havendo relação com o aumento do consumo de drogas, principalmente em populações urbanas.
- 38 A pobreza é considerada um dos principais determinantes do perfil epidemiológico de uma população.
- 39 Embora recentemente tenha sido evidenciada tendência de redução da pobreza, a proporção de pobres na população brasileira atinge níveis elevados em todas as regiões do país, com exceção da região Sul.
- 40 O crescimento do espaço urbano como referência de moradia e de local de trabalho é considerado determinante de relevância sobre o perfil de saúde na população brasileira.
- 41 O grau de escolaridade do indivíduo e da comunidade não constitui variável a ser considerada para estudo dos determinantes de desigualdades em saúde.

Indicadores são medidas síntese que contêm informações relevantes acerca de determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. No que se refere aos indicadores de saúde no Brasil, julgue os próximos itens.

- 42 Nos últimos vinte anos, a transmissão sexual do HIV apresenta-se como forma secundária de transmissão, assim como a transmissão vertical, que tem apresentado redução, apesar da ampla variação regional.
- 43 O coeficiente de mortalidade por acidentes de trabalho tem apresentado decréscimo, especialmente para o sexo masculino.
- 44 O índice de mortalidade infantil, um dos mais sensíveis indicadores de condição de vida, pouco se alterou nos últimos vinte anos.
- 45 Tem sido observado crescimento da prevalência da esterilização masculina, o que evidencia maior participação masculina na prática anticoncepcional. Essa mudança de comportamento deve-se, ainda, ao aumento da escolaridade.

A Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS) n.º 1/2001 regulamenta a assistência, considerando os avanços obtidos no processo de implantação do SUS e enfocando os desafios a serem superados na sua consolidação e aprimoramento. A esse respeito, julgue os itens a seguir.

- 46 A organização de fluxos de referência e contrarreferência coordenada pelo gestor estadual pode adotar critérios que permitam a superposição de serviços, de maneira a ampliar a garantia ao acesso.
- 47 A organização da assistência no âmbito estadual define como município polo aquele que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresenta papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.
- 48 O Plano Diretor de Regionalização constitui instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência em cada estado e no DF.
- 49 O Plano Diretor de Regionalização deve conter a descrição da organização do território estadual em regiões ou microrregiões de saúde.
- 50 Na organização dos serviços de média complexidade, cabe ao gestor estadual a adoção de critérios para a organização regionalizada das ações, desde que considerados a necessidade de qualificação e especialização dos profissionais, a complexidade e o custo dos equipamentos, além de métodos e técnicas requeridos para a realização das ações.

## CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES

O conceito de morte tem sofrido mudanças ao longo do tempo. Vários critérios clínicos e laboratoriais são utilizados para determinar a morte encefálica (ME). Na Resolução n.º 1.480/1997, do Conselho Federal de Medicina (CFM), há uma proposta de protocolo para avaliações clínicas e laboratoriais com o objetivo de caracterizar a ME. Com respeito a esse tema e com base em resoluções do CFM, julgue os itens que se seguem.

- 51 Em pacientes maiores de 18 anos de idade, a resolução do CFM em tela estabelece um intervalo mínimo de 24 horas entre duas avaliações clínico-laboratoriais realizadas necessárias para a caracterização da ME.
- 52 Toda suspeita de ME deve ser obrigatoriamente comunicada pelos estabelecimentos de saúde às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos para transplantes da unidade federada.
- 53 É ética e legal a suspensão de procedimentos de suporte terapêutico quando estabelecida a ME em não doador de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante, o que deve ser precedido de comunicação e esclarecimento sobre a ME aos familiares (ou representante legal), conforme resolução do CFM de 2007.
- 54 Nos casos de paciente em coma irreversível por doença definida, a presença de arreatividade supraespinal, pupilas paralíticas, ausência de reflexo corneopalpebral e reflexos oculovestibulares são achados sugestivos de ME.
- 55 Angiografia encefálica por cateterismo das artérias carótidas e vertebrais, avaliação de potencial evocado, cintilografia cerebral com tomografia computadorizada por emissão de pósitron simples e a prova da apneia são exemplos de exames e testes complementares que podem ser utilizados para a confirmação de ME.

O erro médico resulta de inadequada conduta profissional e pode decorrer de imperícia, negligência ou imprudência. Acerca do erro médico, julgue os itens a seguir.

- 56 O erro médico por negligência geralmente tem características de omissão e está associado ao descaso, ao descuido e à inação.
- 57 Uma ação médica mal executada, quando deveria ter sido bem realizada, caracteriza um erro por imprudência.
- 58 Considera-se erro médico o resultado lesivo que, dentro das mesmas circunstâncias, não pode ser previsto ou evitado e que independe de seu autor.

Segundo dados de hospitais norte-americanos, a incidência média de infecção hospitalar é de 5%, sendo que cerca de 10% dessas infecções são da corrente sanguínea e estão associadas a elevadas taxas de mortalidade. Com relação às infecções da corrente sanguínea e aos cateteres vasculares, julgue os itens subsequentes.

- 59 A cultura de cateter, devido a sua alta sensibilidade e especificidade, é obrigatória para a confirmação diagnóstica de infecção relacionada a acesso vascular periférico em pacientes com esse tipo de acesso venoso e sem concomitante IPCS.
- 60 Correta higienização das mãos, antissepsia com clorexidina e reavaliação diária da necessidade de manutenção do cateter (com remoção imediata daqueles desnecessários) são medidas úteis, corroboradas por evidências científicas, para a prevenção das IPCS.
- 61 As infecções primárias da corrente sanguínea (IPCS) são aquelas associadas a consequências sistêmicas graves, com bacteremia ou sepse, e que apresentam foco infeccioso primário claramente identificado, podendo ou não estar associadas a cateter central.
- 62 Considere que um paciente de 58 anos de idade, internado na enfermaria de clínica médica para tratamento de crise hipertensiva grave teve cateter intravascular implantado na veia subclávia direita há 72 horas, e passou a apresentar febre (39 °C), calafrios e hipotensão. Durante a investigação verificaram-se duas hemoculturas positivas (obtidas com intervalo de 24 horas) para estafilococos coagulase-negativo. Nesse caso, essa situação clínica pode ser definida como IPCS laboratorialmente confirmada.

No Brasil, estimativas recentes indicam que cerca de 5% a 15% dos pacientes internados apresentam algum tipo de infecção hospitalar. Acerca de infecção hospitalar, julgue os próximos itens.

- 63 Um procedimento cirúrgico que envolva o aparelho digestório, realizado em tecidos corporais de difícil descontaminação e que necessite de drenagem aberta pode ser classificado (segundo o potencial de contaminação) como uma cirurgia potencialmente contaminada.
- 64 No contato com pacientes com diagnóstico confirmado de tuberculose pulmonar e laríngea ativas, recomenda-se o uso de máscara com filtro especial (tipo N95) até que seja constatada pelo menos uma cultura negativa para o *Mycobacterium tuberculosis*.
- 65 O escore hematológico de Rodwell (1988) auxilia no diagnóstico de sepse em recém-nascidos.
- 66 A ocorrência de crescimento e multiplicação de um microrganismo nas superfícies epiteliais do hospedeiro, sem expressão clínica ou indução de resposta imunológica significativa, caracteriza o fenômeno da contaminação.

Em relação às emergências clínicas e cirúrgicas, julgue os itens subsequentes.

- 67 A detecção de nível sérico de dímero-D abaixo de 500 ng/mL (pelo método ELISA quantitativo) em paciente cujo escore de Wells indique baixa probabilidade pré-teste é útil para descartar o diagnóstico de embolia pulmonar.
- 68 A reposição de hormônio tireoidiano é a base do tratamento de pacientes em coma mixedematoso. Essa reposição somente deve ser iniciada após a confirmação laboratorial desse diagnóstico, pois os efeitos colaterais associados a essa hormonoterapia são mais graves e frequentes comparativamente às baixas taxas de mortalidade dessa disfunção tireoidiana.
- 69 Se, após a instalação do monitor eletrocardiográfico em um paciente com parada cardiorrespiratória, for identificada atividade elétrica sem pulso, a primeira medida a ser tomada terá de ser a desfibrilação elétrica.
- 70 Em paciente com abdome agudo, a presença de dor intensa e defesa abdominal à palpação do ponto cístico, no hipocôndrio direito, durante a inspiração, é um sinal sugestivo de colecistite aguda.
- 71 Considere que um paciente com cirrose avançada tenha apresentado febre, dor abdominal difusa, alteração do estado mental e ascite importante, e que a análise de líquido ascítico, colhido por paracentese, tenha apresentado: cultura positiva para bactérias, contagem absoluta de leucócitos polimorfonucleares igual a 300 células/mm<sup>3</sup>, concentração de proteína total maior que 1 g/dL, concentração de glicose menor que 50 mg/dL e dosagem de lactato desidrogenase acima do limite superior da normalidade para o plasma. Nesse quadro clínico, esses achados laboratoriais permitem confirmar a peritonite bacteriana espontânea.
- 72 Para um paciente de 58 anos de idade, atendido no pronto-socorro com dor epigástrica, que tenha confirmado o diagnóstico de pancreatite alcoólica aguda e constatado, no momento da internação, leucocitose (18.000 células/mm<sup>3</sup>), desidrogenase láctica sérica igual a 400 U/dL, glicemia de 210 mg/dL e nível sérico de aspartato aminotransferase igual a 95 UI/dL, há risco aumentado de desenvolvimento de necrose pancreática.
- 73 Na reanimação cardiopulmonar de crianças com menos de um ano de idade, a compressão cardíaca deve ser realizada no terço inferior do esterno por meio da técnica dos dois polegares ou dos dedos indicador e médio. A primeira técnica, entretanto, é considerada menos cansativa e mais eficiente, conforme demonstrado por recentes evidências científicas.
- 74 Os reflexos de Bezold-Jarish e dos seios carotídeo e aórtico (barorreflexo) geralmente são envolvidos nos processos etiofisiopatogênicos desencadeantes da síncope neurocardiogênica.
- 75 Paciente com intoxicação por acetaminofen pode evoluir para necrose hepática, e seu tratamento inclui, como antídoto específico, o uso (por via oral) de N-acetilcisteína.

Julgue os itens subsequentes, de acordo com a psicologia médica.

**76** Os cinco estágios ordenados de sentimentos e comportamentos que o indivíduo apresenta em resposta a uma perda, ou à previsão da perda, são: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação.

**77** Reações como ansiedade, depressão, regressão, negação, raiva e dependência são mecanismos considerados universais de enfrentamento predominantes, tanto adaptativos quanto mal-adaptativos.

**78** Os profissionais da área médica devem entender o constructo hipotético da transferência, identificado na teoria psicanalítica, que descreve o processo em que os pacientes conscientemente atribuem a seus médicos certos aspectos de relacionamentos passados importantes, na prática profissional, sentimentos estes que podem dificultar ou favorecer o relacionamento interpessoal e a obtenção de resultados satisfatórios no tratamento.

**79** Considere que o seguinte diálogo tenha sido travado em uma consulta de tratamento terapêutico:

Paciente: — Tenho me sentido muito deprimido nas últimas semanas.

Médico: — Por que você não tenta sair com seus amigos, fazer coisas divertidas como ir ao cinema, fazer uma caminhada?...

Nessa situação, o referido diálogo caracteriza uma escuta terapêutica, objetiva e solidária.

**80** Essencial na prática clínica, a empatia consiste na capacidade do terapeuta de sentir em si mesmo aquilo que o outro sente no seu interior, pelas adequadas identificações, projetivas e introjetivas.

Quanto aos aspectos psicológicos da relação entre médico e paciente, julgue os itens de **81** a **85**.

**81** A proposta da humanização da relação entre o médico e o paciente é centrada na concepção do modelo biomédico, que valoriza os aspectos psicossociais da doença, isto é, a experiência de adoecimento, sintomas, medos e ansiedades, bem como os aspectos familiares, emocionais, culturais e sociais.

**82** A comunicação e o atendimento do profissional médico envolvido com o usuário de forma assimétrica, com caráter informativo e dependente, contribuem para maior cooperação, compreensão e adesão do paciente às terapêuticas propostas.

**83** A experiência profissional, a atualização científica e tecnológica, o desenvolvimento de habilidades interpessoais e a consideração dos aspectos culturais da doença na relação profissional-paciente são fatores associados a uma melhor qualidade do atendimento.

**84** O vínculo entre profissional e paciente é fundamental para a atenção integral em saúde. O profissional de saúde deve ter um envolvimento pessoal profissional com o paciente, construindo, assim, uma relação firme, de responsabilização e de investimento afetivo com o paciente.

**85** O acolhimento é um dos dispositivos da política de humanização para a melhoria da qualidade das ações de saúde, que tem entre as suas dimensões a postura e a prática nas ações de atenção e gestão nas unidades de saúde. Essas ações favorecem a construção de uma relação de confiança e compromisso dos usuários com as equipes e os serviços, o que contribui para a promoção da cultura de solidariedade e para a legitimação do sistema público de saúde.

A asma é uma doença inflamatória que cursa com obstrução recorrente das vias aéreas em resposta a estímulos irritantes. O paciente acometido por essa patologia apresenta crises de sibilos, falta de ar e, muitas vezes, tosse noturna, sendo necessário receber tratamento medicamentoso. A respeito dos fármacos utilizados no tratamento dessa patologia, julgue os seguintes itens.

**86** O salbutamol é um broncodilatador de longa duração que atua como agonista fisiológico dos mediadores espasmogênicos.

**87** Os glicocorticoides impedem a progressão da asma crônica por meio da diminuição da formação de citocinas.

**88** A aminofilina é uma metilxantina, cujo mecanismo de ação tem sido atribuído à inibição da fosfodiesterase e ao bloqueio dos receptores de adenosina.

**89** Assim como na doença pulmonar obstrutiva crônica, a obstrução observada na asma é completamente revertida por broncodilatadores.

**90** Os broncodilatadores revertem o broncoespasmo da fase imediata da asma porque são antagonistas dos receptores  $\beta$ -2 adrenérgicos presentes nos músculos lisos.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A respeito dos nervos que compõem a anatomia do pescoço e suas correlações com músculos e órgãos dessa região, julgue o item seguinte.

**91** O nervo hipoglosso, em seu trajeto para a língua, cruza a superfície anterior do ventre posterior do músculo digástrico e segue profundamente à glândula submandibular em direção à musculatura lingual.

Em cirurgia de cabeça e pescoço, as traqueostomias são procedimentos costumeiros e passíveis de complicações, muitas vezes letais. A respeito desse assunto, julgue o item abaixo.

**92** Pneumotórax é a complicação intraoperatória mais comum em traqueostomias pediátricas.

Dados epidemiológicos mostram que algumas categorias profissionais são mais propensas ao desenvolvimento de neoplasias na cabeça e pescoço. Com base nessa informação, julgue o item abaixo.

**93** Há incidência significativa, em trabalhadores de lavanderias que fazem lavagem a seco, de câncer de boca, de faringe, de laringe e de esôfago, por exposição ao percloroetileno.

Considere que um paciente de 60 anos de idade, tabagista inveterado e etilista social, tenha comparecido ao ambulatório depois de notar uma massa alta, indolor e de consistência endurecida em seu pescoço, cujo surgimento foi observado somente três meses antes da consulta. Diante desse quadro clínico, julgue os itens que se seguem.

**94** Nesse caso, é provável o diagnóstico de linfadenomegalia neoplásica, e o procedimento correto a ser seguido pelo médico é a solicitação de uma ecografia cervical, antes mesmo de indicar a biópsia.

**95** A abordagem cirúrgica da massa deve ser feita precocemente para compensar o longo período de evolução clínica sem tratamento. Nesse sentido, é indicado o exame histopatológico, que possibilitará o estabelecimento da estratégia terapêutica adequada.

Algumas infecções em cabeça e pescoço podem evoluir desfavoravelmente, atingindo os espaços profundos e estendendo-se ao mediastino, com altos índices de mortalidade, quando inadequadamente tratadas. A respeito desse tema, julgue o item seguinte.

**96** A maioria dos abscessos contém flora bacteriana mista. Nos de origem odontogênica, devem ser considerados os germes anaeróbios, como os *Bacteroides*. No estabelecimento da antibioticoterapia, deve-se valorizar, ainda, o aumento da incidência atual de bactérias aeróbicas produtoras de beta-lactamase.

No Brasil, a radioterapia em cabeça e pescoço é realizada, comumente, com equipamentos de alta energia, como o telecobalto e o acelerador linear. Com relação a essas técnicas, julgue o item abaixo.

**97** A técnica com campo único de entrada, quando realizada com cobalto 60 para irradiação de glândulas salivares, provoca mais radiodermite e mucosite do que a técnica com dois campos homolaterais e filtros compensadores.

O papel da quimioterapia antineoplásica neoadjuvante e adjuvante vem-se consolidando e representa uma alternativa importante nos estágios avançados (III e IV) dos tumores malignos de cabeça e pescoço. A respeito desse assunto, julgue os itens subsequentes.

**98** A cisplatina, apesar de ser uma importante droga antineoplásica no tratamento do carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço, pode provocar disacusia neurosensorial bilateral e irreversível por lesão no órgão de Corti.

**99** O 5-fluorouracil, quando utilizado como monoterapia em carcinoma epidermoide recorrente de cabeça e pescoço, apresenta resposta positiva em cerca de 50% dos casos e, quando associado com cisplatina, manifesta efeito sinérgico.

Na avaliação pré-operatória de um paciente portador de neoplasia maligna de cabeça e pescoço, costumam-se analisar três aspectos básicos para a indicação cirúrgica: operabilidade, ressecabilidade e radicalidade. A respeito desses três aspectos, julgue o item seguinte.

**100** Condições de ressecabilidade e radicalidade costumam envolver mutilações nem sempre aceitas pelo paciente e seus familiares. Nessas situações, portanto, devem ser indicados outros tratamentos não-cirúrgicos e o caso deve ser considerado inoperável.

A invaginação endodérmica mediana da faringe anterior embrionária, migrando em direção cervical como ducto tireoglosso, mantém íntima relação com o osso hioide, que se funde na linha média por volta da sétima semana de vida intrauterina. Com relação a esse tema, julgue o próximo item.

**101** O tratamento da maioria dos cistos tireoglossos exige a inclusão da porção média do corpo do osso hioide, além do trajeto até a base da língua (forame ceco); no entanto, os cistos mais superficiais, por não estarem aderidos ao osso, podem ser removidos sem osteotomia, evitando-se, dessa forma, expor o paciente, geralmente pediátrico, a um procedimento cirúrgico mais agressivo. Nesses casos, mesmo sem a ressecção óssea, é necessário que se remova o trajeto até a base da língua.

Cuidados pós-operatórios rigorosos são essenciais para evitar a ocorrência de complicações em cabeça e pescoço. Com relação aos procedimentos mais frequentemente adotados nesses casos, julgue o item seguinte.

**102** Cabeceira do leito elevada (cerca de 30°), deambulação precoce e dieta hiperproteica são condutas que minimizam a ocorrência de complicações.

O avanço nas técnicas de cirurgia reconstrutiva tem permitido que o cirurgião de cabeça e pescoço pratique ressecções mais alargadas e ofereça um resultado funcional e estético mais satisfatório aos seus pacientes. No que se refere às diversas alternativas de reconstrução, julgue os itens a seguir.

**103** Em tumores circunferenciais de hipofaringe, os transplantes pediculados de tubo gástrico com anastomose faringogástrica são alternativas mais limitadas quando comparadas com os transplantes microcirúrgicos de alça jejunal, cuja amplitude de transposição permite reconstruir defeitos da mucosa faríngea, inclusive na base do crânio.

**104** O retalho miocutâneo peitoral maior é um exemplo de retalho randomizado nutrido por ramos perfurantes da artéria acromiotorácica.

Sabendo que é comum a ocorrência de otalgia ipsilateral em pacientes portadores de neoplasia tonsilar e da base da língua, julgue o item subsequente.

**105** Essa otalgia é veiculada pelo ramo timpânico (nervo de Jacobson) do nervo glossofaríngeo, que propicia inervação sensitiva para a orelha média.



As sialolitíases são patologias não neoplásicas das glândulas salivares, de etiologia desconhecida. As técnicas de tratamento dessas patologias vêm evoluindo no sentido da preservação glandular. No que se refere a esse tema, julgue os itens seguintes.

**106** Os cálculos têm em sua composição alta porcentagem de fosfato, não estão relacionados ao tabagismo e predominam nas glândulas submandibulares, em que a saliva é mais alcalina e viscosa.

**107** Atualmente, os cálculos distais da glândula parótida são passíveis de tratamento conservador mediante o uso da sialoendoscopia associada à litotripsia, enquanto os cálculos proximais costumam ser removidos por papilotomia transoral.

Considerando que um paciente do sexo masculino, branco, tabagista inveterado, com 50 anos de idade, apresente lesão nodular de consistência semelhante a borracha, móvel, indolor e bem delimitada no polo inferior da glândula parótida, julgue o próximo item.

**108** Nesse caso, está indicada a realização de uma cintilografia com tecnécio 99, que evidencia hipercaptação na região do tumor, e o provável diagnóstico clínico é de linfoma parotídeo.

A incidência de melanoma cutâneo vem aumentando, embora o diagnóstico precoce, influenciado pelos cuidados da população em relação às lesões pigmentadas, tenha reduzido a sua taxa de mortalidade. Acerca desse tema, julgue o próximo item.

**109** Um melanoma cutâneo com espessura inferior a 1,5 mm raramente (2% a 3 % dos casos) se metastatiza.

A respeito das neoplasias malignas das fossas nasais, julgue o item seguinte.

**110** O carcinoma epidermoide é a neoplasia maligna predominante e acomete mais frequentemente a parede lateral da fossa nasal, envolvendo os cornetos.

Por acometerem uma região anatômica de difícil visualização pela propedêutica desarmada, as neoplasias malignas da nasofaringe costumam cursar silenciosamente, tendo o seu diagnóstico firmado geralmente após o aparecimento de linfonodomegalias cervicais suspeitas. A esse respeito, julgue o item subsequente.

**111** Os nervos cranianos mais acometidos por esse tipo de neoplasia são o ramo maxilar do trigêmeo e o nervo troclear, sendo frequente a perda auditiva condutiva em consequência de otite média serosa.

O carcinoma labial, quando precoce e adequadamente tratado, é uma das neoplasias malignas mais curáveis, com sobrevida superior a 5 anos em, aproximadamente, 90% dos casos. Entre os objetivos do tratamento, além da manutenção da competência vocal, mastigatória e esfínteriana labial, está a obtenção de um efeito cosmético satisfatório. Com base nessa afirmação, julgue o item seguinte.

**112** A labioplastia a Karapandzic, indicada para defeitos que atinjam menos da metade do lábio, consiste em um retalho miocutâneo do músculo orbicular oral, de fácil delimitação, que preserva a inervação motora e sensitiva labial. A desvantagem dessa técnica é que ela provoca relativa microstomia.

A maioria dos tumores malignos dos seios da face acomete o seio maxilar. Embora a frequência de metástases regionais e à distância seja baixa, o prognóstico, nesses casos, costuma ser ruim, pelo fato de o comportamento insidioso e o crescimento ocorrerem dentro de cavidades, o que acaba por protelar o diagnóstico. Acerca desse assunto, julgue o item abaixo.

**113** A linha de Öhngren divide o perfil do esqueleto facial do canto interno da órbita ao ângulo da mandíbula, e funciona como um plano de malignidade. Os tumores situados acima desse plano são de melhor prognóstico que os localizados abaixo dele, os quais costumam invadir a parede nasal lateral e o complexo etmoidal.

Os pacientes portadores de carcinoma glótico que compromete o terço médio da prega vocal (T1a) podem ser tratados com sucesso pela radioterapia exclusiva. A respeito desse tumor, julgue o próximo item.

**114** Quando esse tumor acomete também a comissura anterior, a eficácia da radioterapia é bastante reduzida, sendo preferível a indicação cirúrgica, pois a cirurgia permite remover a cartilagem cricoide, a qual, frequentemente, está comprometida nesses casos.

A respeito de câncer da glândula tireoide, julgue o item a seguir.

**115** O carcinoma medular ocorre, em sua maioria, como casos esporádicos e acomete preferencialmente mulheres adultas de meia-idade, sendo geralmente bilateral nessa modalidade.

Acerca de carcinoma de paratireoide, uma enfermidade rara, detectada em 0,5% a 4% dos pacientes com hiperparatireoidismo primário, julgue o item subsequente.

**116** Metástases regionais e a distância, para pulmões, fígado e ossos, ocorrem em até 30% dos pacientes, sendo recomendável, no ato cirúrgico, associar a lobectomia tireoidiana ipsilateral e a excisão dos linfonodos paratraqueais (cadeia recorrential).

Os osteossarcomas são tumores de alta malignidade que afetam mais comumente os ossos longos do corpo, mas que, em casos raros, podem envolver ossos da face e órbita. Em relação a esse tema, julgue o próximo item.

**117** O tratamento de escolha para o osteossarcoma da região orbitária é a ressecção cirúrgica seguida de quimioterapia sistêmica. Seu prognóstico é extremamente ruim, devido à elevada malignidade e à dificuldade de se realizar a completa ressecção do tumor.

Os neurilemomas, também denominados schwannomas, são tumores benignos da bainha nervosa, que acometem a cabeça e o pescoço em 25% a 48% dos casos. A respeito dessas neoplasias, julgue o item seguinte.

**118** Na cabeça e no pescoço, essas neoplasias localizam-se, mais frequentemente, na língua, seguida do palato mole e da mucosa jugal.

O tratamento locorregional das neoplasias malignas que acometem a cabeça e o pescoço implica, na maioria das vezes, a realização de dissecações cervicais (esvaziamentos cervicais). Hoje, a tendência, devido a um melhor conhecimento da incidência e do comportamento das metástases cervicais, é a prática de esvaziamentos cervicais radicais modificados e esvaziamentos cervicais seletivos. Isso tem contribuído para melhorar a qualidade de vida do paciente, sem, contudo, comprometer a radicalidade do tratamento. Em relação a esse tema, julgue o item abaixo.

**119** O esvaziamento supraomoióideo é a indicação adequada para o tratamento eletivo do pescoço, nos carcinomas epidermóides (T1/T2) do andar inferior da boca, com pescoço NO.

No que se refere a rabiomiossarcoma, um tumor sólido que, na infância e na adolescência, pode acometer a cabeça e o pescoço, julgue o item abaixo.

**120** Esse tipo de tumor é o sarcoma de partes moles mais frequente nessa faixa etária, e os sítios mais comumente acometidos na cabeça e pescoço são, em ordem decrescente de frequência, órbita, nasofaringe, orelha média/mastoide e cavidade nasossinusal.