

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Texto para as questões 31 e 32

Um homem com sessenta e cinco anos de idade possui histórico de três episódios depressivos nos últimos 10 anos. Ele obteve remissão de todos os episódios com uso de farmacoterapia por cerca de um ano. Todos os episódios foram graves, acompanhados de risco de suicídio, e se desenvolveram em um contexto de importante estressor psicossocial. Durante acompanhamento ambulatorial foi identificado um novo episódio depressivo grave com presença de pensamentos ocasionais de suicídio, sem plano específico. O paciente tem bom suporte familiar e a internação não foi considerada necessária naquele momento. Diferentemente dos episódios anteriores, no atual a família não identifica fatores estressores que podem ter funcionado como gatilho. Sua história médica é positiva para hipertensão arterial sistêmica de difícil controle e arritmia atrial.

QUESTÃO 31

Com base no caso clínico relatado acima, assinale a opção correta.

- Ⓐ Venlafaxina e bupropiona também estão indicados como primeira escolha.
- Ⓑ O tratamento de escolha envolve o uso de um ISRS com dose escalonada progressivamente a depender dos efeitos colaterais.
- Ⓒ Deve-se prescrever um ISRS associado a carbonato de lítio, para que o risco de suicídio seja reduzido.
- Ⓓ É obrigatório o tratamento com terapia de base analítica, para que conflitos psíquicos inconscientes sejam abordados e resolvidos, pois estes são provavelmente a causa das recaídas frequentes.
- Ⓔ Tendo em vista a gravidade do quadro depressivo, a primeira escolha deve ser um antidepressivo tricíclico em alta dose.

QUESTÃO 32

Ainda com relação à situação hipotética descrita, assinale a opção correta.

- Ⓐ A idade do paciente é um fator protetor quanto ao risco de suicídio.
- Ⓑ O tratamento psicoterápico associado à farmacoterapia tem se mostrado ineficaz nos casos de depressão recorrente.
- Ⓒ Um estabilizador de humor deve ser associado ao antidepressivo, pois se trata, provavelmente, de um quadro de transtorno bipolar não diagnosticado.
- Ⓓ Caso um ISRS tenha sido escolhido, deve ser usado por 12 meses e retirado gradualmente ao longo de várias semanas.
- Ⓔ Caso tenha boa resposta com farmacoterapia, deve fazer uso da medicação por vários anos ou indefinidamente.

QUESTÃO 33

Acerca da psicopatologia da afetividade, assinale a opção correta.

- Ⓐ As emoções são estados afetivos extremamente intensos, que dominam a atividade psíquica como um todo, captando e dirigindo a atenção e o interesse do indivíduo.
- Ⓑ O nojo é um sentimento da esfera da tristeza.
- Ⓒ O humor está associado a conteúdos intelectuais, valores, representações e, em geral, não implica concomitantes somáticos.
- Ⓓ O afeto é definido como a qualidade e o tônus emocional que acompanha uma ideia ou representação mental.
- Ⓔ Os sentimentos podem ser definidos como reações afetivas agudas, momentâneas, desencadeadas por estímulos significativos.

QUESTÃO 34

A respeito das alterações da linguagem, assinale a opção correta.

- Ⓐ A alexia é a perda da capacidade de escrita.
- Ⓑ Glossolalia é a repetição automática e estereotipada pelo paciente da última ou das últimas palavras que ele próprio emitiu em seu discurso.
- Ⓒ A disfemia é a alteração da linguagem falada sem qualquer lesão ou disfunção orgânica, determinada por conflitos e fatores psicogênicos.
- Ⓓ A afasia ocorre principalmente por fatores psicogênicos.
- Ⓔ A agrafia é a perda da capacidade de leitura.

QUESTÃO 35

Com relação às características de personalidade, assinale a opção que apresenta aquelas classicamente associadas à epilepsia ou síndrome de Geschwind.

- Ⓐ formação de vínculos afetivos intensos e pobreza de discurso
- Ⓑ hipergrafia e circunstancialidade
- Ⓒ hiporreligiosidade e hipersexualidade
- Ⓓ inibição social e pensamento vago
- Ⓔ placidez e embotamento

QUESTÃO 36

Assinale a opção que indica fator de predição de boa resposta ao lítio no transtorno afetivo bipolar.

- Ⓐ mania eufórica ou pura
- Ⓑ abuso de substâncias
- Ⓒ depressão seguida de mania
- Ⓓ traços de personalidade *borderline*
- Ⓔ ciclagem rápida

QUESTÃO 37

Maria é uma paciente de quarenta e cinco anos de idade que desenvolveu um episódio depressivo no contexto de sua separação conjugal. Após o divórcio, ela passou a evitar atividades antes prazerosas e a interpretar eventos de sua vida diária de um ponto de vista negativo. Em seu tratamento psicoterápico, têm sido utilizados formulários de registro de pensamentos, exame das evidências, programação de atividades e psicoeducação.

Com relação ao caso clínico apresentado, assinale a opção que indica a psicoterápica a que Maria está sendo submetida.

- A** terapia do tipo *Gestalt*
- B** terapia cognitivo-comportamental
- C** terapia interpessoal
- D** terapia psicodinâmica
- E** terapia holística

QUESTÃO 38

Assinale a opção que relaciona corretamente o fármaco com suas indicações.

- A** amantadina: sintomas extrapiramidais, transtornos ansiosos e tratamento da infecção por *influenza*
- B** biperideno: sintomas extrapiramidais, acatisia e insônia
- C** bupropiona: transtornos fóbicos, cessação do tabagismo e depressão maior
- D** clonidina: TDAH, transtorno de estresse pós-traumático e depressão maior
- E** propranolol: tremor induzido por lítio, comportamento agressivo e acatisia

QUESTÃO 39

Assinale a opção que apresenta um medicamento antipsicótico considerado de 1.^a geração.

- A** reserpina
- B** trifluoperazina
- C** risperidona
- D** olanzapina
- E** asenapina

QUESTÃO 40

Um paciente apresenta quadro depressivo, boa saúde geral e no seu formulário de encaminhamento ao psiquiatra não consta referência a episódios depressivos prévios.

Em relação ao caso clínico apresentado, assinale a opção correta.

- A** Os vários ISRS diferem entre si em termos de eficácia.
- B** A fluoxetina pode ser usada como parte de uma estratégia eficaz para redução de peso.
- C** Os ISRS afetam a função das plaquetas e podem aumentar o risco de sangramentos.
- D** A acatisia é um sintoma frequente com antidepressivos da classe dos ISRS.
- E** Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina (ISRS) aumentam o risco de suicídio nas primeiras 4 semanas de tratamento.

QUESTÃO 41

Considere que um paciente seja admitido em um pronto-socorro de psiquiatria, encaminhado pelo departamento de clínica médica, com histórico de tentativa de suicídio por envenenamento. Acerca desse quadro clínico, assinale a opção correta em relação ao risco de suicídio.

- A** A diminuição de metabólitos da dopamina no líquido cefalorraquidiano é um dos fatores biológicos mais consistentemente associados ao suicídio consumado.
- B** O fato de o paciente ser do sexo masculino confere um risco aumentado para o suicídio.
- C** Uma tentativa de suicídio realizada de forma impulsiva é sinal de mau prognóstico em relação ao risco de suicídio consumado.
- D** Caso o paciente seja portador de esquizofrenia, o risco de morte por suicídio ao longo da vida é de 20%.
- E** Quando pacientes portadores de esquizofrenia cometem suicídio, o fazem geralmente em decorrência de alucinações auditivas de comando.

QUESTÃO 42

Assinale a opção que apresenta o exame que deve ser solicitado na avaliação emergencial de um paciente com suspeita de lesão vascular cerebral.

- A** PET *scan*
- B** SPECT cerebral
- C** ressonância magnética de crânio
- D** tomografia computadorizada
- E** raio X simples de crânio

QUESTÃO 43

A respeito da neuroimagem nos transtornos mentais, assinale a opção correta.

- A** O córtex órbito-frontal é a estrutura cerebral mais relacionada ao transtorno obsessivo compulsivo.
- B** Estudos de neuroimagem funcional têm sido consistentes em demonstrar redução da atividade do córtex frontal e aumento da atividade nos gânglios da base em pacientes com transtornos de humor.
- C** Apesar da certeza da disfunção no funcionamento cerebral, estudos de neuroimagem não detectaram nenhuma alteração consistente na estrutura do cérebro de pacientes com esquizofrenia.
- D** Estudos de neuroimagem no transtorno de pânico têm demonstrado dilatação dos vasos cerebrais durante o episódio de pânico.
- E** O uso crônico de benzodiazepínicos para tratamento de transtornos de ansiedade tem sido relacionado ao aumento dos ventrículos cerebrais.

QUESTÃO 44

Um paciente de cinquenta e cinco anos de idade foi internado no setor de ortopedia havia dois dias, após ter sido submetido à cirurgia para correção de fratura de fêmur ocorrida durante um acidente automobilístico. Foi submetido à avaliação psiquiátrica, durante a qual se queixou de que, nas últimas doze horas, os pacientes do quarto ao lado haviam falado coisas maldosas a seu respeito e visitado seu quarto durante a noite para assustá-lo. O paciente mantinha o sensorio claro e admitiu fazer uso de seis a sete latas de cerveja diariamente. Sua frequência cardíaca e pressão arterial tinham se mantido estáveis. Após prescrição de benzodiazepínico, as queixas do paciente haviam remitido após o sexto dia de internação.

Acerca desse caso clínico, assinale a opção que apresenta o diagnóstico mais provável.

- A reação de ajustamento
- B transtorno dissociativo
- C *delirium tremens*
- D transtorno psicótico induzido pelo álcool
- E esquizofrenia paranoide

QUESTÃO 45

Dalva, paciente de sessenta e seis anos de idade, no segundo dia de internação hospitalar para pós-operatório de histerectomia, desenvolveu quadro de ansiedade, sintomas autonômicos, flutuação no nível de consciência e alucinações visuais. A acompanhante relatou que a paciente é usuária de longa data de bromazepam para controle de ansiedade. No prontuário médico da paciente não havia referência à complicações cirúrgicas e nenhuma prescrição de benzodiazepínico no pós-operatório.

Com relação ao caso clínico descrito, assinale a opção que apresenta o neurotransmissor mais diretamente afetado no caso.

- A serotonina
- B GABA
- C noradrenalina
- D acetilcolina
- E dopamina

Texto para as questões de 46 a 48

Eduardo é um paciente de setenta e cinco anos de idade que se encontra no quarto dia de internação hospitalar para quadro de pneumonia adquirida na comunidade. Nas últimas 24 horas, apresentou insônia, comportamento errático, por vezes agressivo, com flutuação do nível de consciência e presença de alucinações visuais e auditivas. Familiares afirmam que ele mantinha razoável independência em suas atividades diárias antes da internação, apesar do déficit cognitivo progressivo que tem apresentado nos últimos dois anos.

QUESTÃO 46

Assinale a opção que apresenta diagnóstico psiquiátrico que justifica os sintomas desse paciente.

- A demência dos corpos de Lewy
- B *delirium* devido a uma condição médica geral
- C alteração comportamental na doença de Alzheimer
- D transtorno de ansiedade paroxística
- E transtorno psicótico breve

QUESTÃO 47

Ainda com relação ao caso clínico descrito, assinale a opção que apresenta o neurotransmissor e a área neuroanatômica envolvidos primariamente nos sintomas agudos.

- A acetilcolina e núcleo basal de Meynert
- B acetilcolina e sistema reticular ascendente
- C noradrenalina e *locus ceruleus*
- D serotonina e núcleos da Rafe
- E dopamina e trato nigro-estriatal

QUESTÃO 48

Em relação a esse caso clínico, assinale a opção correta.

- A Amitriptilina 25 a 50 mg ao deitar está indicada para controle da agitação e da insônia.
- B A taxa de mortalidade para pacientes portadores desse diagnóstico é de até 50% em um ano.
- C O uso de antipsicóticos típicos é contraindicado pelo risco de sintomas extrapiramidais.
- D Mesmo que haja dor ou dispneia importantes, os opiáceos devem ser evitados pelo risco de depressão respiratória e tolerância.
- E A prescrição de rivastigmina ou donepezil associada ao tratamento da doença clínica seria a abordagem inicial indicada.

QUESTÃO 49

Assinale a opção que apresenta um sintoma presente tanto na intoxicação por *Cannabis* como na intoxicação por cocaína, segundo o DSM-IV-TR.

- A apetite aumentado
- B boca seca
- C taquicardia
- D convulsões
- E conjuntivas hiperêmicas

QUESTÃO 50

Um paciente de setenta anos de idade tem histórico de déficit cognitivo progressivo há cerca de dezoito meses. Após descartar a hipótese de demências reversíveis, é diagnosticada demência de Alzheimer leve a moderada.

Com relação esse caso clínico, assinale a opção que apresenta o tratamento de primeira escolha.

- A memantina dose inicial de 5mg com aumento ao longo de quatro semanas até a dose de 10 mg de 12/12 horas
- B donepezil 5 mg ao dia com aumento para 10 mg/dia após 1 mês
- C galantamina 8 mg ao deitar com reavaliação em 3 meses e aumento para 16 mg ao deitar
- D tacrina de 80 a 160 mg/dia divididas em 4 tomadas diárias
- E rivastigmina com dose escalonada até 12 mg/dia tomada em dose única

QUESTÃO 51

Acerca dos aspectos farmacológicos das medicações usadas no tratamento da demência de Alzheimer, assinale a opção correta.

- A** Pacientes em uso de rivastigmina devem ser monitorados regularmente para elevações nos níveis das transaminases.
- B** A memantina é um agonista competitivo do receptor NMDA do glutamato e exerce fraca inibição da acetilcolinesterase.
- C** A rivastigmina é um inibidor reversível da acetilcolinesterase com atividade adicional sobre receptores dopamínicos e serotoninérgicos.
- D** A galantamina é um inibidor fracamente competitivo da acetilcolinesterase e promove modulação alostérica de receptores nicotínicos.
- E** O donepezil é um inibidor pseudo-reversível da acetilcolinesterase, também com ação sobre a butirilcolinesterase.

QUESTÃO 52

A respeito da eletroconvulsoterapia, assinale a opção correta.

- A** Benzodiazepínicos, antidepressivos tricíclicos e antipsicóticos típicos não devem ser utilizados concomitantemente a esse procedimento porque modificam o limiar convulsivo.
- B** Aumento da pressão intracraniana e risco de hemorragia cerebral estão entre suas contraindicações absolutas.
- C** Sua eficácia tem sido relatada no tratamento de transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), *delirium* e síndrome neuroléptica maligna.
- D** A ECT é o tratamento de escolha da depressão refratária e apresenta taxa de resposta de até 30% nesses casos.
- E** A ECT é eficaz no tratamento da mania aguda e pode ser usada associada ao lítio em pacientes refratários a essa abordagem farmacológica.

QUESTÃO 53

Assinale a opção que indica o antipsicótico que apresenta a maior incidência de aumento de peso.

- A** clozapina
- B** pimozida
- C** ziprazidona
- D** quetiapina
- E** olanzapina

QUESTÃO 54

Um paciente de cinquenta e cinco anos de idade, com histórico de trinta anos de esquizofrenia paranoide, desenvolveu sintomas progressivos de discinesia tardia nos últimos dez anos, quando em uso de risperidona 3 mg ao dia.

Considerando o caso clínico relatado, assinale a opção que apresenta a melhor indicação terapêutica nesse caso.

- A** trocar a risperidona por clozapina em dose terapêutica
- B** reduzir a dose da risperidona para 1mg ao dia
- C** substituir a risperidona por outro antipsicótico atípico como olanzapina ou quetiapina
- D** manter a dose da risperidona e associar um anticolinérgico como biperideno
- E** manter a risperidona em monoterapia, pois a discinesia tardia é parte da história natural da esquizofrenia paranoide de longa data

QUESTÃO 55

Um paciente de sessenta e cinco anos, do sexo masculino, trabalhador da indústria aposentado, tem apresentado história de déficit cognitivo de início abrupto no último ano e curso deteriorante em degraus. Além dos sintomas cognitivos, tem apresentado sinais neurológicos focais como reflexos tendinosos profundos exagerados, resposta plantar extensora, anormalidade da marcha e fraqueza de uma das extremidades.

Com relação ao caso clínico apresentado, assinale a opção que apresenta o diagnóstico mais provável.

- A** demência decorrente da doença de Pick
- B** demência decorrente da hidrocefalia de pressão normal
- C** demência decorrente da doença de Parkinson
- D** demência vascular
- E** demência de Alzheimer

QUESTÃO 56

Acerca da avaliação do estado mental em crianças, assinale a opção correta.

- A** Temas persistentes em jogos e fantasias raramente refletem o humor da criança.
- B** A ideação suicida não faz parte do exame mental de crianças em fase escolar.
- C** Crianças em idade escolar devem ser capazes de recordar cinco objetos após cinco minutos e repetir cinco números em ordem direta e três números em ordem inversa.
- D** A criança usa uma linguagem mais objetiva e clara do que o adulto.
- E** Prejuízo na orientação pode sugerir lesão orgânica, baixa inteligência ou distúrbio de pensamento, entretanto a idade deve ser levada em conta.

QUESTÃO 57

Um exame complementar útil para avaliação da inteligência de crianças é o teste de QI. Segundo o DSM IV, pode-se classificar os níveis de retardo mental de acordo com a pontuação obtida nesse teste. Assinale a opção que apresenta um dos níveis dessa classificação.

- A** retardo mental de gravidade inespecificada: quando existe forte suspeita de retardo mental, mas a inteligência da pessoa pode ser testada por outros instrumentos padronizados
- B** retardo mental leve: QI entre 65-70 a aproximadamente 80
- C** retardo mental moderado QI entre 40-45 a 55- 60
- D** retardo mental severo: QI entre 25-30 a 40-45
- E** retardo mental profundo: QI abaixo de 20 ou 25

QUESTÃO 58

Em relação ao uso de psicofármacos em crianças, assinale a opção correta.

- A** O metilfenidato apresenta relação significativa entre a concentração sérica e a resposta clínica.
- B** Não existe nenhum antipsicótico liberados pelo FDA (Food and Drug Administration) para uso em crianças menores de doze anos de idade.
- C** O diazepam é o benzodiazepínico mais estudado em crianças.
- D** As crianças, se comparadas a adultos, tem menor metabolização hepática.
- E** As crianças, se comparadas a adultos, tem maior filtragem glomerular.

QUESTÃO 59

Com relação ao abuso sexual em crianças, assinale a opção correta.

- A** A minoria dos abusos sexuais em crianças é causada por pessoas dentro da família ou próximas.
- B** Sintomas depressivos geralmente são apresentados por crianças que sofreram abuso sexual.
- C** A minoria dos casos é de incesto pai-filha.
- D** As vítimas de abuso não terão mais chance de desenvolver transtorno depressivo ou ansioso na idade adulta se comparadas às não vítimas.
- E** A idade mais comum é entre doze e quinze anos de idade.

QUESTÃO 60

Acerca dos exames complementares em psiquiatria, assinale a opção correta.

- A** O SPECT é um exame mais sofisticado e mais recente do que o PET.
- B** O uso do carbonato de lítio não pode levar a alterações nos hormônios tireoidianos.
- C** O eletroencefalograma é útil e faz parte dos exames de rotina obrigatórios.
- D** A ressonância nuclear magnética pode ser estrutural ou funcional.
- E** A tomografia computadorizada é um exame exclusivamente funcional.

QUESTÃO 61

Sabe-se que alguns antipsicóticos tem capacidade de prolongar o intervalo QT no eletrocardiograma. Fazendo uma comparação entre os antipsicóticos em relação ao aumento do intervalo QT, assinale a opção correta.

- A** A tioridazina aumenta menos do que a quetiapina.
- B** A ziprazidona aumenta menos do que a clorpromazina.
- C** A ziprasidona aumenta menos do que a olanzapina.
- D** A ziprazidona aumenta menos do que a tioridazina.
- E** A tioridazina aumenta menos do que a clozapina.

QUESTÃO 62

A respeito do tratamento farmacológico da esquizofrenia, assinale a opção correta.

- A** As principais vantagens dos antipsicóticos antigos, da primeira fase, são o custo e o conhecimento prático.
- B** O uso contínuo de antipsicóticos não reduz significativamente o risco de uma recaída.
- C** Os antipsicóticos atípicos representaram um grande avanço em relação aos típicos e não há possibilidade de causarem efeitos colaterais graves potencialmente letais.
- D** Os antipsicóticos atípicos não apresentam risco de desencadear sintomas parkinsonianos.
- E** Os antipsicóticos de depósito são bastante úteis e apresentam uma posologia mais flexível.

QUESTÃO 63

Acerca das manifestações psiquiátricas no puerpério, assinale a opção correta.

- A** A eletroconvulsoterapia é contraindicada no período inicial do puerpério por poder suprimir amamentação secundariamente.
- B** O *blues* puerperal é bastante frequente e teria sintomas de humor mais graves que a depressão.
- C** Na psicose puerperal podem ocorrer temas como o infanticídio.
- D** Segundo o DSM IV para a definição de depressão pós-parto, o surgimento do episódio depressivo teria que ser em até quatro meses após o parto.
- E** Entre os antidepressivos, a fluoxetina é considerada a melhor opção durante o período de amamentação.

QUESTÃO 64

A respeito da depressão, assinale a opção correta.

- A** Pacientes deprimidos tem significativamente mais chance de desenvolver um infarto agudo do miocárdio.
- B** Estudos demonstram um aumento de linfócitos do tipo natural *killers* em deprimidos.
- C** Tem frequência aproximadamente igual entre mulheres e homens.
- D** A depressão tem uma prevalência maior em pessoas que não tem relações interpessoais íntimas, sendo mais prevalente em solteiros do que em divorciados.
- E** Pacientes após terem acidente vascular cerebral (AVC) não tem mais chance de apresentar episódio depressivo do que a população geral.

QUESTÃO 65

Em relação ao tratamento da depressão, assinale a opção correta.

- A** Todos os pacientes devem continuar o tratamento por, pelo menos, dois anos após a melhora.
- B** A suspensão do tratamento com antidepressivos depois de seis a oito semanas de tratamento leva à recaída em torno de 70% a 80% dos indivíduos.
- C** Cerca de um terço a dois terços das recaídas ocorrem nos primeiros três meses após a suspensão da medicação.
- D** A dose de manutenção do antidepressivo deve ser a mesma da fase aguda, sendo nível de evidência 2.
- E** As psicoterapias, como a TCC, podem ajudar a prevenir recaídas, sendo nível de evidência 3.

QUESTÃO 66

No que concerne à psicopatologia do transtorno bipolar, sabe-se que a atenção está bastante prejudicada na fase de mania. Com relação a essa informação, assinale a opção correta.

- A** Distração é um sinal, não de déficit propriamente, mas de superconcentração ativa da atenção sobre determinados conteúdos ou objetos, com inibição de tudo mais.
- B** Distraibilidade é estado patológico que se exprime por uma maior facilidade para se fixar ou se manter em qualquer coisa que implique esforço produtivo.
- C** Tenacidade é a incapacidade de fixar atenção sobre determinada área ou objeto.
- D** O sistema reticular ativador ascendente não está intimamente ligado ao processo de atenção.
- E** A porção medial do giro do cíngulo é importante para o processo de controle da atenção realizado pelas estruturas frontais.

QUESTÃO 67

No que se refere à ansiedade, assinale a opção correta.

- A** Pacientes com ansiedade, teriam um sistema nervoso autônomo (SNA) com diminuição do tônus simpático e resposta excessiva e estímulos moderados.
- B** Os dois neurotransmissores mais envolvidos com a ansiedade são dopamina e o GABA.
- C** A estimulação do *locus ceruleus* em animais bloqueia resposta de medo e a ablação dessa área produz a resposta de medo.
- D** Não se consegue induzir ataques de pânico em humanos experimentalmente.
- E** O papel do GABA, nos transtornos de ansiedade, não é apoiado pela eficácia irrefutável dos benzodiazepínicos.

QUESTÃO 68

Constitui característica do transtorno de personalidade histriônica,

- A** obstinação.
- B** perfeccionismo.
- C** prudência.
- D** rigidez excessiva.
- E** afetividade superficial.

QUESTÃO 69

No que se refere aos transtornos dissociativos, assinale a opção correta.

- A** Na fuga dissociativa a pessoa refere experiências de sentir-se desligado do seu próprio corpo ou como se fosse um observador externo.
- B** O transtorno dissociativo de identidade pode se desenvolver em crianças de até três anos de idade.
- C** A maioria dos estudos utilizando a escala de experiência dissociativa demonstra uma maior prevalência desses transtornos em mulheres.
- D** É muito raro fazer o diagnóstico diferencial do transtorno dissociativo de identidade com a esquizofrenia.
- E** Na fuga dissociativa, a perturbação predominante consiste em uma viagem súbita realizada pelo paciente, sem se recordar do trajeto ou motivo da mesma, normalmente, dentro da visão psicodinâmica, para um local muito desejado inconscientemente.

QUESTÃO 70

Com relação aos transtornos somatoformes, assinale a opção correta.

- A** Dentro da concepção psicodinâmica, a produção do sintoma surge como uma forma de reestruturação do ego.
- B** No transtorno dismórfico corporal, uma importante anomalia física causa uma preocupação acentuadamente excessiva.
- C** Alguns pacientes com transtorno doloroso persistente sofrem de alexitimia.
- D** Pacientes com esses diagnósticos costumam responder bem ao tratamento farmacológico.
- E** No transtorno de somatização, a prevalência é igual entre os sexos.

QUESTÃO 71

Inclui-se entre as características fundamentais do transtorno de personalidade dissocial

- A** comportamento facilmente modificado pelas experiências adversas, inclusive pelas punições.
- B** tendência a adotar um comportamento autodestrutivo, compreendendo tentativas de suicídio e gestos suicidas.
- C** boa empatia para com os outros.
- D** baixa tolerância à frustração e um alto limiar de descarga da agressividade.
- E** desvio considerável entre o comportamento e as normas sociais estabelecidas.

QUESTÃO 72

A respeito das medicações que podem ser utilizadas no tratamento da anorexia nervosa, assinale a opção que apresenta aquela que, entre outras ações, aumenta o apetite.

- A** sertralina
- B** fluoxetina
- C** gabapentina
- D** topiramato
- E** ciproheptadina

QUESTÃO 73

Em relação às características do sono, assinale a opção correta.

- A** Quimicamente os neurônios aminérgicos, colinérgicos e histaminérgicos estão mais associados ao sono.
- B** Durante o sono REM ocorrem cerca de 50 % do total dos sonhos do tempo total de sono.
- C** Latência de sono REM é o tempo entre adormecer e entrar na primeira a fase não-REM 1.
- D** O sono REM é responsável por 30 a 40 % do tempo total de sono.
- E** O núcleo supraquiasmático, localizado no hipotálamo posterior é uma estrutura de fundamental importância para a regulação do sono.

QUESTÃO 74

Acerca dos transtornos de estresse pós-traumático, assinale a opção correta.

- A** Sintomas persistentes de excitabilidade aumentada não estão entre os principais critérios diagnósticos, segundo o DSM IV.
- B** A duração da perturbação é superior a um mês, segundo o DSM IV.
- C** Se a doença surge após quatro meses do evento agressor, é classificada como de início tardio, segundo o DSM IV.
- D** A psicoterapia psicodinâmica não tem indicação nesses casos.
- E** Os antipsicóticos estão entre as medicações de primeira escolha para o seu tratamento.

QUESTÃO 75

A respeito dos fatores etiológicos associados aos transtornos de personalidade, assinale a opção correta.

- Ⓐ Níveis mais altos de ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) em indivíduos que tentam suicídio e em pacientes impulsivos e agressivos.
- Ⓑ Traços de personalidade estariam associados a uma fixação a estágios psicosssexuais do desenvolvimento. Por exemplo, caráter oral é passivo e dependente em função de estar fixado ao estágio oral do desenvolvimento, quando predomina a independência para obtenção de alimentos.
- Ⓒ Um aumento de enzima monoaminoxidase (MAO) plaquetária está associada a um tempo maior associado à atividades sociais.
- Ⓓ Pessoas com traços impulsivos podem apresentar níveis diminuídos de testosterona, 17-estradiol e estrona.
- Ⓔ Pessoas portadoras desses transtornos podem apresentar movimentos oculares de perseguição lenta, traços de introversão, baixa autoestima e transtorno de personalidade esquizotípica.

QUESTÃO 76

Com relação aos transtornos de identidade de gênero, assinale a opção correta, segundo o DSM IV.

- Ⓐ O tratamento do transtorno de identidade de gênero é um problema complexo, mas normalmente bem sucedido se o objetivo for o de reverter o transtorno.
- Ⓑ O transexualismo, segundo o DSM IV, é o desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto. Esse desejo se acompanha em geral de um sentimento de mal estar ou de inadaptação por referência a seu próprio sexo anatômico, mas raramente tem a ideiação de submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a um tratamento hormonal, a fim de tornar seu corpo tão conforme quanto possível ao sexo desejado.
- Ⓒ Na síndrome de Turner o indivíduo (geralmente XXY) tem aparência masculina.
- Ⓓ A hiperplasia adrenal congênita virilizante consiste em um excesso de andrógenos agindo sobre o feto. Quando ocorre no sexo feminino, os andrógenos fetais excessivos da glândula adrenal levam a uma androgenização da genitália externa.
- Ⓔ Na síndrome de Klinefelter um cromossomo sexual está ausente (XO).

QUESTÃO 77

Em relação aos transtornos mentais da infância e adolescência, assinale a opção correta.

- Ⓐ A síndrome de Rett é um transtorno mental muito raramente diagnosticado em meninas.
- Ⓑ A síndrome de Rett ocorre, habitualmente, entre três e seis meses de idade.
- Ⓒ A síndrome de Asperger se diferencia do autismo essencialmente por não se acompanhar de retardo ou deficiência de linguagem ou do desenvolvimento cognitivo.
- Ⓓ A pica é um transtorno alimentar que consiste no consumo persistente de substâncias não nutritivas por um período de pelo menos três meses. A substância típica ingerida tende a variar com a idade. Bebês e crianças mais jovens tipicamente comem tinta, reboco, cordões, cabelos ou tecidos. Crianças mais velhas podem comer fezes de animais, areia, insetos, folhas ou pedregulhos.
- Ⓔ A síndrome de Landau-Kleffner, é raramente acompanhada de anormalidades paroxísticas no eletroencefalograma (EEG). Usualmente, o início se dá entre os três e os sete anos de idade, com perda das habilidades de linguagem receptiva e expressiva no espaço de dias ou de semanas.

QUESTÃO 78

Acerca do transtorno factício, assinale a opção correta.

- Ⓐ As principais terapias psiquiátricas apresentam boa eficácia no seu tratamento.
- Ⓑ O transtorno factício consiste na produção ou simulação não intencional de sinais e(ou) sintomas físicos e(ou) psicológicos.
- Ⓒ No transtorno factício, a motivação para o comportamento consiste em, obrigatoriamente, assumir o papel do enfermo.
- Ⓓ Incentivos externos para o comportamento podem estar ou não presentes.
- Ⓔ Não existe o transtorno factício por procuração.

QUESTÃO 79

Assinale a opção correta referente ao transtorno obsessivo-compulsivo.

- Ⓐ A idade média de início é por volta de trinta anos de idade.
- Ⓑ Pessoas solteiras e casadas são igualmente afetadas.
- Ⓒ No PET verifica-se uma atividade especialmente diminuída nos lobos frontais, gânglios da base e cíngulo.
- Ⓓ As obsessões consomem, segundo o DSM IV, mais do que duas horas por dia.
- Ⓔ Tem uma prevalência estimada de 2 a 3 % da população.

QUESTÃO 80

Assinale a opção correta relativa à esquizofrenia,.

- Ⓐ Carlsson e Lindqvist, relatando um aumento do ácido homovanílico em decorrência do tratamento antipsicótico, propuseram a hipótese dopaminérgica.
- Ⓑ Eugen Bleuler criou o termo *dementia precox*, que salientava o aspecto deteriorante da doença.
- Ⓒ Emil Krapelin criou o termo esquizofrenia, substituindo *dementia precox*.
- Ⓓ Kurt Schneider criou as bases das classificações atuais.
- Ⓔ A fraca relação simbiótica entre mãe e filho, a desintegração do ego e o fracasso dos mecanismos de defesa do ego são alguns dos fatores psicanalíticos associados à etiologia dessa doença.