

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca da organização das ações e serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens a seguir.

- 51 A priorização dos atendimentos no SUS é feita com base em alguns critérios, entre os quais se incluem a gravidade do risco individual e coletivo e o tempo de espera ao atendimento.
- 52 O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS é circunscrito aos pacientes residentes na região de saúde, sendo garantido até a capacidade instalada da rede regionalizada e hierarquizada.
- 53 A organização dos serviços de saúde deve garantir o acesso às ações de saúde de atenção básica e de média complexidade; o acesso às ações de alta complexidade, por sua vez, devem ser garantidos pela área de saúde suplementar.
- 54 Apesar de solucionarem a maioria dos problemas de saúde, as ações de saúde de atenção primária são menos complexas que as de média e de alta complexidade, uma vez que são desenvolvidas mediante serviço clínico menos ampliado e tecnologias de baixa complexidade e densidade.
- 55 Todos os municípios são obrigados a ter serviços de atenção primária em saúde, devendo esses serviços ordenar o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde.

Considerando a legislação básica do SUS, bem como o planejamento e a gestão no SUS, julgue os itens seguintes.

- 56 O planejamento em saúde deve responder às exigências constitucionais e legais quanto à elaboração de planos plurianuais (PPA), lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e lei orçamentária anual (LOA).
- 57 Os sistemas de informação em saúde devem ser estruturados, a fim de garantir o monitoramento adequado das doenças não transmissíveis, dado que os sistemas utilizados na atualidade constituem-se apenas de bases amostrais complementadas por informações de prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares.
- 58 As funções dos membros dos conselhos de saúde do SUS são de relevância pública, podendo estes serem dispensados de suas atividades laborais quando em exercício das atividades de controle social.
- 59 Os direitos relativos à saúde são garantidos pela seguridade social, que compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- 60 De acordo com os princípios da descentralização e do comando único no SUS, os municípios devem ser os principais executores das ações e serviços de saúde, devendo a gestão do sistema ser realizada pelo Ministério da Saúde, que contém o comando único do SUS.

Com relação à vigilância em saúde e à estratégia de saúde da família, julgue os itens que seguem.

- 61 O acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em saúde e de atender a todos os que procuram os serviços mediante uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar respostas mais adequadas aos usuários.
- 62 O Brasil é reconhecido internacionalmente como um dos países com os melhores programas de imunização do mundo, responsável pelo atingimento de altos índices de cobertura vacinal, sendo todos os segmentos populacionais abrangidos de forma universal.
- 63 Quatro de cada cinco mortes desencadeadas por doenças crônicas ocorrem em pacientes habitantes de países de baixa e média renda, o que contraria a ideia de que as doenças crônicas afetam principalmente os países de alta renda.
- 64 As doenças crônicas, que afetam principalmente os indivíduos do sexo masculino e as pessoas de idade avançada, determinaram as mudanças nas pirâmides populacionais dos últimos anos no Brasil.
- 65 Na estratégia de saúde da família, a consulta de enfermagem é uma das atribuições específicas do profissional de enfermagem, sendo permitido a este profissional solicitar exames complementares e prescrever medicamentos apenas na ausência do profissional médico da equipe.

Em 2006, por meio da Portaria/GM n.º 399, foram apresentadas pelo Ministério da Saúde as diretrizes do Pacto pela Saúde, cujas dimensões envolviam a vida, o fortalecimento e a gestão do SUS. Uma das prioridades desse programa diz respeito à questão do envelhecimento populacional. Dessa forma, essa preocupação foi atendida por meio da Política de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa e Envelhecimento, publicada em 2010. Com relação a esse assunto, julgue os itens subsequentes.

- 66 Com base nas diretrizes da Política de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa e Envelhecimento, várias ações estratégicas vêm sendo desenvolvidas, como as oficinas estaduais de prevenção de osteoporose e de queda e fratura em pessoas idosas, cujo objetivo principal é a redução do número de internações por fratura de fêmur em idosos.
- 67 Apenas a população a partir de sessenta anos de idade e acompanhada pelo Programa de Saúde da Família pode receber a vacina contra *Influenza*.
- 68 A referida política prevê que, além de adequarem os currículos e materiais didáticos, as instituições de ensino superior devem ter disciplinas sobre o processo de envelhecimento, que diferenciem a senescência de doença ou incapacidade, a fim de divulgar medidas de prevenção e promoção de saúde.

Um dos principais tratamentos utilizados para o combate ao câncer é a quimioterapia antineoplásica, uma modalidade de tratamento sistêmico da doença. Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir.

- 69 Os efeitos tóxicos apresentados nos pacientes submetidos ao tratamento quimioterápico relacionam-se à não especificidade dos agentes antineoplásicos, pois estes agem sobre todas as células com alta taxa de proliferação no organismo humano e não apenas sobre as células cancerosas.
- 70 Um aspecto importante a ser observado em pacientes submetidos à quimioterapia é o período de NADIR, definido pelo tempo transcorrido entre a aplicação da droga e o aparecimento do menor valor de contagem de células sanguíneas. Este tempo varia de acordo com o medicamento que o paciente recebe. A via de administração e a velocidade de administração da medicação não interferem no tempo de NADIR.
- 71 Um evento comum durante o tratamento antineoplásico é a toxicidade gastrointestinal, frequentemente manifestada por náuseas e vômitos. Para reduzir essas reações, utiliza-se um arsenal de drogas antieméticas que, geralmente, são associadas a altas doses de glicocorticoide, como a dexametasona, devido a sua ação inibitória sobre a prostaglandina.
- 72 Os quimioterápicos oferecem risco à saúde de quem os manuseia, portanto, a ANVISA, em 2002, publicou a RDC n.º 220 que apresenta diretrizes para o manuseio seguro de quimioterápicos antineoplásicos. De acordo com essa resolução, são necessários os seguintes equipamentos para o preparo de quimioterápicos: cabine de segurança biológica classe II B2, luvas de látex de punho longo sem talco e estéreis, avental de manga longa, máscara cirúrgica e óculos.
- 73 Os resíduos produzidos em serviços de quimioterapia devem ser descartados adequadamente. O material utilizado no preparo e administração de quimioterápicos deve ser acondicionado em recipiente padronizado, fechado, de consistência rígida e identificado com símbolo de resíduo tóxico. A ANVISA recomenda, ainda, que esses resíduos sejam neutralizados ou incinerados.
- 74 Há vários tipos de quimioterapia; entre elas, a quimioterapia paliativa tem o objetivo de curar e retardar o surgimento dos sintomas relacionados à doença.

Atualmente, os Estados-membros da Organização Mundial de Saúde (OMS) vêm desenvolvendo ações que visam à segurança cirúrgica, que, no Brasil, são coordenadas pela ANVISA. As diretrizes são descritas no manual Cirurgias Seguras Salvam Vidas. Com relação à segurança do paciente durante procedimentos cirúrgicos, julgue os próximos itens.

- 75 A fim de evitar retenção inadvertida de instrumentos no interior de feridas operatórias, as equipes envolvidas em procedimentos perioperatórios devem adotar critérios de contagem. Ressalta-se que os sistemas de contagem que utilizam identificação por radiofrequência devem ser evitados, pois podem gerar danos à saúde do paciente.
- 76 Outro ponto importante para a segurança cirúrgica e, conseqüentemente, para a segurança do paciente, é a demarcação da região do corpo a ser operada. Recomenda-se a participação ativa do paciente nesse processo e a utilização de símbolos para sinalização dessa região, como a seta.
- 77 Antes de iniciar a incisão cirúrgica, deve-se realizar a pausa cirúrgica, que visa identificar o paciente, o procedimento e o local da cirurgia. Dessa forma, assegura-se o correto posicionamento do paciente e a disponibilidade dos equipamentos especiais que poderão ser necessários durante o procedimento.
- 78 A octenidina a 0,1% tem sido recomendada para a realização da antissepsia pré-cirúrgica da pele. O dicloreto de octenidina destrói rapidamente tanto bactérias gram positivas quanto gram negativas, tendo potencial de destruir, inclusive, o vírus HIV e o vírus da hepatite B.

---

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), por meio da Resolução COFEN n.º 358/2009, passou a exigir que o processo de enfermagem seja realizado de modo deliberado e sistemático. Com relação a esse assunto, julgue os itens seguintes.

- 79 Os julgamentos, as decisões e as ações desenvolvidas durante o processo de enfermagem devem ser fundamentados na melhor evidência disponível.
- 80 O processo de enfermagem se inicia na investigação e perfaz outras etapas até a avaliação. Se os diagnósticos formulados forem precisos e os resultados apropriados, não será necessário retomar a avaliação.
- 81 O processo de enfermagem é composto de coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Essas etapas são realizadas de forma independente, cíclica e não linear.

No Brasil, as taxas de amamentação ainda são baixas, principalmente as taxas de amamentação exclusiva. O enfermeiro é um profissional importante na equipe de saúde que pode, por meio da educação em saúde, auxiliar na mudança dessa situação. Acerca de nutrição infantil, julgue os próximos itens.

- 82** A alimentação complementar, que deve ser iniciada após o sexto mês de vida do bebê, deve prover quantidade suficiente de água, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais por meio de alimentos seguros.
- 83** As crianças que não puderem ser amamentadas, a exemplo de crianças cujas mães são portadoras do vírus HIV, devem ser alimentadas exclusivamente com leite de vaca não modificado e, aos quatro meses de idade, serem alimentadas com papa salgada.
- 84** Denomina-se aleitamento materno predominante o período em que a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água, como suco de frutas, infusões e água adoçada.
- 85** O preparo das mamas para amamentação deve ser iniciado no período pré-natal, sendo recomendada a realização de manobras para aumentar e fortalecer os mamilos, como esticar os mamilos com os dedos, esfregá-los utilizando uma toalha mais áspera e o uso de conchas para alongar os mamilos.

No início do século XX, a política de saúde da mulher no Brasil era orientada apenas para atender demandas relacionadas à gravidez e ao parto. Nesse mesmo século, na década de 80, a política nacional já previa assistência à mulher em todo o seu ciclo de vida, além das necessidades identificadas a partir do perfil populacional das mulheres. Com relação à saúde da mulher no Brasil, julgue os itens consecutivos.

- 86** Uma forma de identificar precocemente o aparecimento do câncer de colo de útero é a realização do exame citopatológico do esfregaço cervical. Esse exame pode ser requisitado nos serviços de atenção primária por todas as mulheres que já iniciaram vida sexual ou com idade entre vinte e cinquenta anos.
- 87** O tipo de câncer mais incidente na população feminina é o câncer de mama. O Instituto Nacional de Câncer recomenda que o rastreamento desse câncer seja realizado em todas as mulheres com idade entre cinquenta e sessenta e nove anos, mediante o exame anual clínico das mamas e a realização de mamografia a cada dois anos.
- 88** De acordo com o Programa Nacional de Humanização do Parto e Nascimento, as gestantes têm assegurada a realização da primeira consulta de pré-natal até o terceiro mês de gestação e a consulta de puerpério até quarenta e dois dias após o nascimento do bebê.
- 89** Exames de urina e o teste VDRL (*venereal disease research laboratory*) devem ser realizados na primeira consulta de pré-natal e na trigésima semana de gestação.
- 90** Dois tipos de vacinas contra o papilomavírus (HPV) estão disponíveis para imunização: a bivalente, que abrange os sorotipos 16 e 18, e a quadrivalente, que oferece proteção contra os subtipos 6, 11, 16 e 18. É recomendado que a vacinação ocorra entre os nove e onze anos de idade.

Julgue os itens subsecutivos, relativos a atendimentos a pacientes em emergências relacionados a doenças dos sistemas respiratório e circulatório, em emergências psiquiátricas, com insuficiência hepática e em emergências ambientais.

- 91** Os procedimentos de socorro inicial ao paciente que sofreu picada de cobra são: deitar a vítima; remover itens, como anéis, correntes e cintos; fornecer calor; limpar e cobrir a ferida; imobilizar a região do corpo afetada e aplicar gelo e torniquete.
- 92** A patologia inflamatória que acomete brônquios, bronquíolos e parênquima pulmonar, com local de predominância variável em cada indivíduo, é denominada doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), cujo tratamento consiste em oxigenoterapia, corticoterapia sistêmica, antibioticoterapia e uso de broncodilatadores.
- 93** Nas emergências relativas ao sistema circulatório, a sistematização da assistência de enfermagem é considerada uma rotina preconizada, que vem sendo implementada continuamente, não havendo, portanto, a necessidade de aprofundamento e validação dos diagnósticos empregados no atendimento a esses pacientes.
- 94** Nas emergências psiquiátricas, para que ocorra o atendimento médico, os pacientes oriundos de prisões ou sob guarda devem ser algemados no leito, contudo essa avaliação e cuidado são dispensáveis no caso de pacientes com contensões nas mãos e nos tornozelos.
- 95** Pacientes com cirrose hepática possuem risco aumentado de sangramento e hemorragia devido à produção diminuída de protrombina e à capacidade diminuída do fígado de síntese dos fatores necessários à coagulação sanguínea. O uso de grades laterais acolchoadas no leito, aplicação de pressão nos sítios de injeção e prevenção das lesões por objetos pontiagudos são precauções que devem ser observadas no atendimento a esses pacientes.

Com relação à estrutura organizacional do serviço de emergência pré-hospitalar e hospitalar, julgue os itens seguintes.

- 96** As ambulâncias classificadas como tipo D são as de suporte avançado, destinadas ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco, em emergências pré-hospitalares e(ou) em transporte inter-hospitalar, que necessitam de cuidados médicos intensivos.
- 97** A estrutura do serviço de emergência hospitalar deve ter disponível, como recursos mínimos, em funcionamento ininterrupto, o serviço de radiologia, o laboratório de análises clínicas, o centro cirúrgico, a unidade de terapia intensiva, a unidade de transfusão, a farmácia básica para urgência e a unidade de transporte equipada.
- 98** É atribuição do enfermeiro julgar a gravidade de caso que esteja sendo comunicado por telefone e decidir a conduta a ser seguida pelo comunicante.

Julgue os itens seguintes, relativos à assistência de enfermagem e ao tratamento de distúrbio hidroeletrólítico e acidobásico.

- 99** O tratamento de acidose metabólica é variável e abrange a eliminação das causas de hipóxia, reposição hídrica e volêmica, normalização do débito cardíaco e correção de hipotensão arterial.
- 100** A reposição de volume por via endovenosa, após estabilização do quadro, e a reposição de eletrólitos, por via arterial, tratam a desidratação ocasionada por perda de sódio, potássio, lítio, proteínas e magnésio.

Julgue o item abaixo, relativo ao suporte básico de vida em emergência.

- 101** O desfibrilador externo automático, apesar de não possibilitar a checagem do ritmo cardíaco, é importante nos estabelecimentos públicos, pois é de acesso rápido e pode auxiliar no salvamento de vidas.

Pacientes com insuficiência renal devem possuir acessos vasculares temporários ou permanentes, em períodos que podem variar de algumas horas até meses. Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir.

- 102** A localização da punção na veia subclávia deve ser evitada, pois esse procedimento está associado a maior incidência de complicações relativas à colocação, entre elas o pneumotórax, o hemotórax, a ascite e a perfuração da artéria subclávia.
- 103** O acesso temporário é estabelecido pela inserção percutânea de um cateter em uma veia de grande calibre, que pode ser a jugular interna ou a femoral.

Julgue os itens subsecutivos, referentes a doação, captação e transplantes de órgãos.

- 104** Nos transplantes de medula óssea, exige-se, para garantia de sucesso no procedimento, baixa compatibilidade imunológica entre doadores e receptores, o que ocorre geralmente entre irmãos.
- 105** Caso todos os órgãos de um doador estejam viáveis para transplante, vinte e cinco pessoas, no máximo, poderão ser beneficiadas.

Acerca da central de material e dos processos de esterilização de produtos para a saúde, julgue os itens a seguir.

- 106** Na definição do tempo de estocagem de itens estéreis, é necessário que sejam considerados os tipos de invólucros e as características de estocagem.
- 107** As recomendações para diluições de soluções limpantes e desinfetantes, número de enxágues, método de montagem, desmontagem, limpeza, enxágue, secagem e inspeção de artigos devem ser incluídas nas rotinas e nos procedimentos de uma central de material e esterilização.
- 108** A esterilização a vapor, processo no qual o vapor saturado encontra-se a uma pressão inferior à atmosférica, é realizada em autoclaves.
- 109** O processo de esterilização por gases, utilizado em superfícies expostas não porosas e impermeáveis, apresenta a vantagem de dispensar aquecimento e diluição em água.

Acerca do gerenciamento de enfermagem em serviços de saúde, julgue os itens que se seguem.

- 110** Nas instituições de saúde, os enfermeiros não desenvolvem a função de supervisão.
- 111** O processo de auditoria em enfermagem traz benefícios aos pacientes como, por exemplo, assistência de melhor qualidade por meio de serviço oferecido de maneira mais segura e eficaz.
- 112** A avaliação de desempenho profissional e individualizada embora não seja recente é uma prática comum na enfermagem e nas organizações de saúde, muito embora seja recente.
- 113** O recrutamento e a seleção de pessoas são processos complexos, atrelados a propostas, políticas e objetivos organizacionais, ao mercado de trabalho, à situação social, política e econômica vigente e às necessidades individuais.
- 114** O aumento de gastos no setor saúde é atribuído, entre outros fatores, ao envelhecimento da estrutura etária da população, à extensão de cobertura, ao avanço tecnológico, à baixa produtividade dos serviços e à falta de capacitação administrativa.
- 115** No dimensionamento do pessoal de enfermagem, o enfoque quantitativo é prioritário e mais relevante que o qualitativo.

A respeito das responsabilidades e dos deveres dispostos no código de ética dos profissionais de enfermagem, julgue os itens subsecutivos.

**116** Em caso de interrupção das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria, é suspensa a assistência de enfermagem.

**117** É dever do profissional de enfermagem respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, exceto em situações de morte e pós-morte.

Acerca das associações de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, julgue o próximo item.

**118** A Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN) tem como objetivo o desenvolvimento cultural da profissão, sendo facultativa a filiação para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e estudantes de graduação em enfermagem.

Com relação aos conceitos e critérios diagnósticos das infecções hospitalares, julgue os itens abaixo.

**119** Infecções de recém-nascidos associadas com bolsa rota superior a vinte e quatro horas são consideradas comunitárias.

**120** Paciente proveniente de um hospital que se interna com infecção em outro hospital é considerado portador de infecção comunitária de ambos os hospitais.



**cespeUnB**

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos